Marcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda

MATEMATYKA 2

Zbiór zadań do liceów i techników



ZAKRES PODSTAWOWY

Marcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda

MATEMATYKA 2

Zbiór zadań do liceów i techników

ZAKRES PODSTAWOWY

OFICYNA EDUKACYJNA
KRZYSZTOF PAZDRO

Spis treści

1. Przekształcenia wykresów funkcji

Wektor w układzie współrzędnych – podstawowe informacje 7
Przesunięcie równoległe. Przesunięcie równoległe wzdłuż osi *OX* 10
Przesunięcie równoległe wzdłuż osi *OY* 13
Symetria osiowa. Symetria osiowa względem osi *OX* i *OY* 20
Symetria środkowa. Symetria środkowa względem punktu (0, 0) 25
Zastosowanie wykresów funkcji do rozwiązywania równań i nierówności .. 27
Test sprawdzający do rozdziału 1. 28
Zadania powtórzeniowe do rozdziału 1. 31

2. Równania i nierówności z wartością bezwzględną

Wartość bezwzględna liczby rzeczywistej 34
Odległość między liczbami na osi liczbowej.
Geometryczna interpretacja wartości bezwzględnej na osi liczbowej 36
Proste równania z wartością bezwzględną 38
Proste nierówności z wartością bezwzględną 40
Test sprawdzający do rozdziału 2. 42
Zadania powtórzeniowe do rozdziału 2. 43

3. Funkcja kwadratowa

Przypomnienie wiadomości o funkcji kwadratowej z klasy 1. 45
Związek między wzorem funkcji kwadratowej w postaci ogólnej,
a wzorem funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej 47
Miejsce zerowe funkcji kwadratowej.
Wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej 49
Szkicowanie wykresów funkcji kwadratowych. Odczytywanie
własności funkcji kwadratowej na podstawie wykresu 53
Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej na podstawie jej własności 56
Najmniejsza oraz największa wartość funkcji kwadratowej
w przedziale domkniętym 58
Badanie funkcji kwadratowej – zadania optymalizacyjne 60
Równania kwadratowe 63
Równania prowadzące do równań kwadratowych 65
Nierówności kwadratowe 66
Zadania prowadzące do równań i nierówności kwadratowych 69
Test sprawdzający do rozdziału 3. 72
Zadania powtórzeniowe do rozdziału 3. 73

4. Geometria płaska – okręgi i koła

Powtórzenie wiadomości z geometrii z klasy 1. 76
Okrąg. Położenie prostej i okręgu 82
Wzajemne położenie dwóch okręgów 84
Koła i kąty 85

Twierdzenie o stycznej i siecznej 88
Symetralne boków trójkąta. Okrąg opisany na trójkącie 90
Dwusieczne kątów trójkąta. Okrąg wpisany w trójkąt 92
Test sprawdzający do rozdziału 4. 96
Zadania powtórzeniowe do rozdziału 4. 98

5. Trygonometria
Trygonometria kąta ostrego – powtórzenie wiadomości z klasy 1. 101
Sinus, cosinus, tangens i cotangens dowolnego kąta płaskiego 103
Podstawowe tożsamości trygonometryczne 105
Wybrane wzory redukcyjne 108
Test sprawdzający do rozdziału 5. 109
Zadania powtórzeniowe do rozdziału 5. 111

6. Geometria analityczna
Odcinek w układzie współrzędnych 113
Równanie kierunkowe prostej 114
Równanie ogólne prostej 117
Równanie okręgu 119
Wyznaczanie w układzie współrzędnych punktów wspólnych prostych, okręgów i parabol 121
Zastosowanie układów równań do rozwiazywania zadań z geometrii analitycznej 123
Test sprawdzający do rozdziału 6. 124
Zadania powtórzeniowe do rozdziału 6. 126

7. Geometria płaska – rozwiązywanie trójkątów, pole trójkąta, pole koła
Twierdzenie sinusów 128
Twierdzenie cosinusów 129
Zastosowanie twierdzenia sinusów i twierdzenia cosinusów do rozwiązywania zadań 131
Pole figury płaskiej 132
Pole trójkąta, cz. 1 134
Pole trójkąta, cz. 2 137
Pola trójkątów podobnych 140
Pole koła, pole wycinka koła 143
Zastosowanie pojęcia pola w dowodzeniu twierdzeń 145
Test sprawdzający do rozdziału 7. 146
Zadania powtórzeniowe do rozdziału 7. 148

8. Wielomiany
Wielomiany jednej zmiennej rzeczywistej 151
Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów 153
Równość wielomianów 155
Wzory skróconego mnożenia stopnia 3. Wzór na $a^n - b^n$ 156
Zastosowanie wzorów skróconego mnożenia w dowodzeniu 158

Podzielność wielomianów 159
Dzielenie wielomianu przez dwumian liniowy. Schemat Hornera 161
Pierwiastek wielomianu. Twierdzenie Bezouta 163
Pierwiastki wymierne wielomianu 166
Rozkładanie wielomianów na czynniki 167
Równania wielomianowe 169
Zadania prowadzące do równań wielomianowych 171
Test sprawdzający do rozdziału 8. 173
Zadania powtórzeniowe do rozdziału 8. 174

Odpowiedzi do zadań 177

Wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych 232

Symbolem $\mathcal{D}$ zostały oznaczone zadania na dowodzenie.

1. Przekształcenia wykresów funkcji

Wektor w układzie współrzędnych – podstawowe informacje

1.1. W prostokątnym układzie współrzędnych narysuj podane wektory. Początek każdego wektora obierz dowolnie.

a) $\vec{a}=[5, 0]$ b) $\vec{b}=[-3, 0]$ c) $\vec{c}=[0, 1]$ d) $\vec{d}=[0, -4]$

e) $\vec{e}=[-1, 3]$ f) $\vec{f}=[2, -5]$ g) $\vec{g}=[-3, -1]$ h) $\vec{h}=[2, 4]$

1.2. Odczytaj z rysunku współrzędne wektorów:



1.3. Oblicz współrzędne wektora $\overrightarrow{AB}$, jeśli:

a) $A(-2, 3), B(4, 0)$ b) $A\left(0, -\sqrt{3}\right), B\left(2, 2\sqrt{3}\right)$

c) $A\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right), B(1, 3)$ d) $A(-4, 8), B\left(5\frac{1}{2}, -6\right)$

1.4. Oblicz współrzędne wektorów $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{CB}$ jeśli: $A(-2, -3)$ $B(1, -4), C(-4, 5)$.

1.5. Oblicz długość wektorów:

a) $\vec{u}=[-5, 12]$ b) $\vec{v}=\left[4\frac{1}{2}, 6\right]$ c) $\vec{p}=[-11, -60]$ d) $\vec{s}=\left[2, -\sqrt{5}\right]$

1.6. Oblicz długość wektora $\overrightarrow{AB}$, jeśli:

a) $A(2, 3); B(-1, 5)$

b) $A(4, 0); B(6, -1)$

c) $A(-4, -2); B(20, 5)$

d) $A\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right); B(1, -2)$

1.7. Wyznacz współrzędne punktu B, jeśli:

a) $A(0, 4)$; $\overrightarrow{AB}=[-3, 5]$

b) $A(-2, 5)$; $\overrightarrow{AB}=[1, 8]$

c) $A(4, -3)$; $\overrightarrow{AB}=[0, -6]$

d) $A\left(\sqrt{2}, 2\sqrt{2}\right)$; $\overrightarrow{AB}=\left[3\sqrt{2}, -\sqrt{2}\right]$

1.8. Wyznacz współrzędne punktu A, jeśli:

a) $B(-1, 6)$; $\overrightarrow{AB}=[4, -1]$

b) $B(2, -9)$; $\overrightarrow{AB}=[-3, 2]$

c) $B\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{6}\right)$; $\overrightarrow{AB}=\left[\frac{1}{2}, -4\right]$

d) $B\left(\sqrt{3}, -5\right)$; $\overrightarrow{AB}=\left[2\sqrt{3}, 0\right]$

1.9. Dane są punkty $A(-1, -3), B(-4, 3), C(2, 0), D(2, -9), E(-1, 6)$. Sprawdź, które z wektorów $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AE}$, $\overrightarrow{CE}$ są równe, a które przeciwne.

1.10. Na odcinku AB wyznacz punkt P tak, aby wektory $\overrightarrow{AP}$ i $\overrightarrow{PB}$ były sobie równe.

a) $A(-3, 2), B(5, 6)$

b) $A(-4, 5), B(1, 0)$

1.11. Dane są punkty A i B. Wyznacz współrzędne środka S odcinka AB trzema sposobami: 1) ze wzorów; 2) z równości wektorów $\overrightarrow{AS}$ i $\overrightarrow{SB}$; 3) z informacji, że wektory $\overrightarrow{SA}$ i $\overrightarrow{SB}$ są przeciwne.

a) $A(-10, 4), B(6, -2)$

b) $A(-2, 5), B(4, -3)$

c) $A(-2, 4), B(0, 12)$

d) $A(-4, -2), B(-3, -5)$

1.12. Punkt S jest środkiem odcinka AB. Wyznacz punkt B, jeśli:

a) $A(-4, 3), S(0, 1)$

b) $A(-6, 2), S(3, -1)$

c) $A(-2, 4), \overrightarrow{AS} = [1, -3]$

d) $A(4, 1), \overrightarrow{SA} = [6, 2]$

1.13. Punkt S jest punktem wspólnym odcinka AB i jego symetralnej. Wyznacz współrzędne punktu A, jeśli:

a) $S(-2, 1)$ $\overrightarrow{SB} = [5, -4]$

b) $S(1, -1)$, $\overrightarrow{BS} = [3, 7]$

1.14. Dane są cztery różne punkty A, B, C, D. Jeśli wektory $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{CD}$ są równe, to co można powiedzieć o wektorach $\overrightarrow{CA}$ i $\overrightarrow{DB}$?

1.15. Punkt S jest punktem przecięcia przekątnych AD, EB i FC sześciokąta foremnego $ABCDEF$. Z danych na rysunku odcinków utwórz wektory, które są równe wektorowi:

a) $\overrightarrow{AB}$

b) $\overrightarrow{BC}$

c) $\overrightarrow{ES}$



1.16. Wierzchołki trójkąta ABC mają współrzędne: $A(-4, -2)$, $B(5, -1)$, $C(1, 3)$. Oblicz długości boków trójkąta ABC. Sprawdź, czy trójkąt ABC jest prostokątny.

1.17. Dany jest trójkąt o wierzchołkach $A(-2, -3)$, $B(1, 4)$, $C(-1, 3)$.

a) Oblicz obwód trójkąta ABC.

b) Oblicz długość środkowej BD.

1.18. Dane są punkty A, B, C, D. Sprawdź, czy czworokąt $ABCD$ jest równoległobokiem. Następnie oblicz jego obwód.

a) $A(-2, 1)$, $B(-1, -1)$, $C(2, 5)$, $D(1, 7)$

b) $A(2, -5)$, $B(7, 0)$, $C(2, 5)$, $D(0, 3)$

1.19. Punkty $A(-3, -1)$, $B(1, 2)$, $C(2, 5)$ są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku $ABCD$.

a) Oblicz współrzędne wierzchołka D.

b) Oblicz współrzędne punktu S przecięcia się przekątnych.

c) Oblicz długości przekątnych równoległoboku.

1.20. Oblicz współrzędne wierzchołków C i D równoległoboku $ABCD$, wiedząc, że $A(-4, 4)$, $B(-2, -1)$, a przekątne AC i BD przecinają się w punkcie $S(-1, 3)$. Oblicz długości boków tego równoległoboku.

1.21. W trójkącie ABC dane są: $A(-5, 2)$, $C(1, 5)$. Wiedząc, że $\overrightarrow{CD} = [-2, -6]$, gdzie D to środek boku AB, oblicz współrzędne wierzchołka B oraz długość boku AB.

Przesunięcie równoległe. Przesunięcie równoległe wzdłuż osi OX

1.22. Wyznacz współrzędne punktu A_1, będącego obrazem punktu A w przesunięciu równoległym o wektor $\vec{u}$, jeśli:

a) $A(9, -1)$, $\vec{u} = [-8, 3]$ b) $A(-3, 5)$, $\vec{u} = [6, 0]$ c) $A(4, 7)$, $\vec{u} = [1, 3]$

1.23. Obrazem punktu B w przesunięciu równoległym o wektor $\vec{u}$ jest punkt B_1. Wyznacz współrzędne punktu B, jeśli:

a) $B_1(1, 2)$, $\vec{u} = [-5, 0]$ b) $B_1(3, -2)$, $\vec{u} = [-7, 1]$ c) $B_1(5, 1)$, $\vec{u} = [4, 6]$

1.24. Funkcja f jest opisana za pomocą tabeli:

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	0	1	2	0	1	2

Wykonaj tabelę, opisującą funkcję h, której wykres powstanie w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji f:

a) o 3 jednostki w prawo b) o 2 jednostki w lewo.

Przeanalizuj dziedziny i zbiory wartości funkcji f i h.

1.25. Funkcja f jest opisana za pomocą tabeli: $f(x)$

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-10	-5	0	5	10

Przedstaw za pomocą tabelki funkcję g, opisaną wzorem:

a) $g(x) = f(x - 9)$ b) $g(x) = f(x + 53)$.

1.26. Podaj, o ile jednostek, i w którą stronę należy przesunąć wykres funkcji f wzdłuż osi OX, aby otrzymać wykres funkcji:

a) $y = f(x-4)$ b) $y = f(x+6)$ c) $y = f(x+5)$ d) $y = f(x-10)$.
W każdym przypadku podaj współrzędne wektora przesunięcia.

1.27. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f. Naszkicuj wykresy funkcji $g(x) = f(x-4)$ oraz $h(x) = f(x+1)$. Odczytaj z wykresu dziedzinę funkcji f, g oraz h.



1.28. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f. Naszkicuj wykresy funkcji $g(x) = f(x+3)$ oraz $h(x) = f(x-2)$. Odczytaj z wykresu miejsca zerowe funkcji f, g oraz h.



1.29. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f. Naszkicuj wykresy funkcji $g(x) = f(x+2)$ oraz $h(x) = f(x-5)$. Odczytaj z wykresu wartości funkcji f dla argumentów: -2, 0 oraz 4. Podaj wartoś wyrażenia:

a) $g(-4) \cdot g(-2) + g(2)$

b) $h(3) \cdot \left[h(5) - h(9)\right]$.



1.30. Podaj wzór funkcji g, której wykres otrzymamy po przesunięciu równoległym wykresu funkcji f wzdłuż osi OX:

a) o 3 jednostki w lewo, jeśli $f(x) = \sqrt{x}$

b) o 2 jednostki w prawo, jeśli $f(x) = x^2$

c) o 5 jednostek w prawo, jeśli $f(x) = -\frac{1}{2}x$

d) o 1 jednostkę w lewo, jeśli $f(x) = |x|$

e) o 1 jednostkę w lewo, jeśli $f(x) = x^3$

f) o 3 jednostki w prawo, jeśli $f(x) = \frac{1}{x}$.

W każdym przypadku naszkicuj wykres funkcji g oraz podaj współrzędne wektora przesunięcia.

1.31. Podaj współrzędne wektora $\vec{u}$, wiedząc, że w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji f o wektor $\vec{u}$ otrzymano wykres funkcji g, jeśli:

a) $f(x) = 2x^2$ i $g(x) = 2(x-5)^2$

b) $f(x) = \sqrt{x}$ i $g(x) = \sqrt{x+10}$

c) $f(x) = \frac{2}{x}$ i $g(x) = \frac{2}{x-3}$

d) $f(x) = 0{,}5x^3$ i $g(x) = 0{,}5(x+8)^3$

e) $f(x) = -x^3$ i $g(x) = -(x-1)^3$

f) $f(x) = |x|$ i $g(x) = |x-4|$

1.32. Naszkicuj wykres funkcji $g(x) = (x-3)^2$, określonej w zbiorze $\boldsymbol{R}$. Odczytaj z wykresu:

a) wartość funkcji g dla argumentu 1,

b) maksymalne przedziały monotoniczności funkcji g.

1.33. Naszkicuj wykres funkcji $g(x) = \sqrt{x+2}$.

a) Podaj dziedzinę funkcji g.

b) Podaj miejsce zerowe funkcji g.

1.34. Naszkicuj wykres funkcji g, opisanej wzorem $g(x) = \frac{1}{x-1}$.

a) Określ dziedzinę funkcji g.

b) Oblicz współrzędne punktu, w którym wykres funkcji g przecina oś OY.

c) Podaj maksymalne przedziały, w których funkcja g jest malejąca.

1.35. Funkcję f określa wzór $f(x) = x^3$, gdzie $x \in \langle -2, 2 \rangle$. Wykres funkcji g powstaje w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji f o wektor $\vec{u} = [-2, 0]$.

a) Podaj wzór funkcji g.

b) Naszkicuj wykresy funkcji f i g w jednym układzie współrzędnych.

c) Porównaj miejsce zerowe funkcji g z miejscem zerowym funkcji f.

1.36. Na rysunku obok znajduje się wykres funkcji $f(x) = |x|$, gdzie $x \in \langle -5, 3 \rangle$. Funkcję g określa wzór $g(x) = f(x-4)$.

a) Wyznacz dziedzinę funkcji g.

b) Podaj maksymalne przedziały monotoniczności funkcji g.



1.37. Dziedziną funkcji f jest zbiór $D_f = \langle -8, 7 \rangle$. Podaj dziedzinę funkcji g, jeśli:

a) $g(x) = f(x + 2)$
b) $g(x) = f(x - 10)$
c) $g(x) = f(x - 137)$
d) $g(x) = f(x + 2009)$

1.38. Miejscami zerowymi funkcji f są liczby -4, 0 oraz 6, a jej zbiorem wartości przedział liczbowy $\langle -3, 5 \rangle$. Podaj miejsca zerowe oraz zbiór wartości funkcji g, jeśli $g(x) = f(x + 8)$.

1.39. Punkty $(-2, 5)$, $(3, 1)$, $(4, -6)$ należą do wykresu funkcji f. Podaj trzy punkty, które należą do wykresu funkcji, określonej wzorem:

a) $g(x) = f(x - 15)$ b) $h(x) = f(x + 21)$ c) $k(x) = f(x - 7) + x$

1.40. Dany jest wzór funkcji f i współrzędne wektora $\vec{u}$. Wyznacz wzór funkcji g, której wykres otrzymamy po przesunięciu równoległym wykresu funkcji f o wektor $\vec{u}$.

a) $f(x) = x^2 + 1$, $\vec{u} = [5, 0]$
b) $f(x) = 2x - 1$, $\vec{u} = [-3, 0]$
c) $f(x) = x^2 - 3x$, $\vec{u} = [-1, 0]$
d) $f(x) = (x+1)(x-5)$, $\vec{u} = [4, 0]$

Przesunięcie równoległe wzdłuż osi OY

1.41. Znajdź obrazy następujących figur w przesunięciu równoległym o podany wektor.

a)



b)



c)



d)



1.42. Funkcja f jest opisana za pomocą tabeli:

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	4	3	2	0	1	2

Wykonaj tabelę, opisującą funkcję h, której wykres powstanie w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji f:

a) o 2 jednostki do góry

b) o 7 jednostek do dołu.

Porównaj dziedziny i zbiory wartości funkcji f i h.

1.43. Funkcja f jest opisana za pomocą tabeli:

x	-3	-2	0	1	6	28
$f(x)$	-4	-1	2	9	11	81

Opisz za pomocą tabelki funkcję określoną wzorem:

a) $g(x) = f(x) + 6$

b) $g(x) = f(x) - 21$

1.44. O jaki wektor należy przesunąć wykres funkcji f, aby otrzymać wykres funkcji g?

a)



b)



c)



d)



1.45. Podaj, o ile jednostek i w którą stronę należy przesunąć równolegle wykres funkcji f wzdłuż osi OY, aby otrzymać wykres funkcji g, jeśli:

a) $g(x) = f(x) - 4$

b) $g(x) = f(x) + 2$

c) $g(x) = f(x) + 8$

d) $g(x) = f(x) - 3$

W każdym przypadku podaj współrzędne wektora przesunięcia.

1.46. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f. Naszkicuj wykresy funkcji $g(x) = f(x) - 1$ oraz $h(x) = f(x) + 4$. Odczytaj z wykresu wartość funkcji f dla argumentu (-2). Oblicz wartość wyrażenia $3 \cdot g(-2) - 8 \cdot h(-2)$.



1.47. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f. Naszkicuj wykresy funkcji $g(x) = f(x) + 5$ oraz $h(x) = f(x) - 2$. Odczytaj z rysunku współrzędne punktu, w którym wykres funkcji f przecina oś OY. Oblicz wartość wyrażenia $g(0) \cdot h(0)$.



1.48. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f. Naszkicuj wykresy funkcji $g(x) = f(x) + 2$ oraz $h(x) = f(x) - 5$. Odczytaj współrzędne punktów, w których wykresy funkcji f, g oraz h przecinają oś OY. Podaj miejsca zerowe funkcji f, g oraz h (o ile takie istnieją).



1.49. Podaj wzór funkcji g, której wykres otrzymamy po przesunięciu równoległym wykresu funkcji f wzdłuż osi OY:

a) o 5 jednostek do góry, jeśli $f(x) = -2x + 1$

b) o 3 jednostki do dołu, jeśli $f(x) = \sqrt{x}$

c) o 7 jednostek do dołu, jeśli $f(x) = 3x^2$

d) o 4 jednostki do góry, jeśli $f(x) = |x|$

e) o 2 jednostki w dół, jeśli $f(x) = \frac{4}{x}$

f) o 3 jednostki do góry, jeśli $f(x) = \frac{1}{5}x^3$.

W każdym przypadku podaj współrzędne wektora przesunięcia.

1.50. Dany jest wzór funkcji f i wektor $\vec{u}$. Podaj wzór funkcji g, której wykres otrzymamy po przesunięciu równoległym wykresu funkcji f o wektor $\vec{u}$, jeśli:

a) $f(x) = -4\sqrt{x}$, $\vec{u} = [0, 4]$

b) $f(x) = 3x^2$, $\vec{u} = [0, -1]$

c) $f(x) = \frac{5}{x}$, $\vec{u} = [0, 2]$

d) $f(x) = -\frac{1}{2}|x|$, $\vec{u} = [0, -8]$.

1.51. W prostokątnym układzie współrzędnych naszkicuj wykres funkcji g, opisanej wzorem $g(x) = \frac{1}{x} + 2$. Następnie podaj:

a) miejsce zerowe funkcji g,

b) zbiór wartości funkcji g,

c) przedziały monotoniczności funkcji g.

1.52. W prostokątnym układzie współrzędnych naszkicuj wykres funkcji g, opisanej wzorem $g(x) = x^2 - 1$. Odczytaj z wykresu:

a) miejsca zerowe funkcji g,

b) zbiór wartości funkcji g,

c) maksymalny przedział, w którym funkcja g jest malejąca.

1.53. W prostokątnym układzie współrzędnych naszkicuj wykres funkcji g, opisanej wzorem $g(x) = \sqrt{x} + 3$. Odczytaj z wykresu:

a) argument, dla którego wartość funkcji g wynosi 5,

b) wartość funkcji g dla argumentu 9,

c) zbiór wszystkich wartości, jakie funkcja g przyjmuje dla argumentów z przedziału $\langle 0, 4)$.

1.54. Funkcję f określa wzór $f(x) = |x|$, gdzie $x \in (-5, 4)$. Wykres funkcji g powstaje w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji f o wektor $\vec{u} = [0, -4]$.

a) Podaj wzór funkcji g.

b) Naszkicuj wykresy funkcji f i g w jednym układzie współrzędnych.

c) Podaj najmniejszą wartość funkcji f oraz najmniejszą wartość funkcji g.

1.55. Na rysunku obok znajduje się wykres funkcji $f(x) = x^3$, gdzie $x \in \langle -1, 2 \rangle$. Funkcję g określa wzór $g(x) = f(x) - 1$.

a) Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji g.

b) Wyznacz współrzędne punktu przecięcia wykresu funkcji g z osią OY.



1.56. Zbiorem wartości funkcji f jest przedział liczbowy $\langle -4, 6)$. Wyznacz zbiór wartości funkcji g, określonej wzorem:

a) $g(x) = f(x) - 12$ b) $g(x) = f(x) + 30$

c) $g(x) = f(x) - 212$ d) $g(x) = f(x) + 2345$

1.57. Punkty $(-3, 1)$, $(2, -4)$ należą do wykresu funkcji f. Podaj dwa punkty, które należą do wykresu funkcji, określonej wzorem:

a) $g(x) = f(x) - 6$ b) $h(x) = f(x) + 21$ c) $k(x) = f(x) - 7 + x$

1.58. Dany jest wzór funkcji f i współrzędne wektora $\vec{u}$. Wyznacz wzór funkcji g, której wykres otrzymamy w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji f o wektor $\vec{u}$.

a) $f(x) = x^2 + 1$, $\vec{u} = [0, -5]$

b) $f(x) = 2x - 1$, $\vec{u} = [0, 1]$

c) $f(x) = (x + 1)^2$, $\vec{u} = [0, 2]$

1.59. Wykres funkcji liniowej $f(x) = 2x$ przesunięto równolegle wzdłuż osi OX o wektor $\vec{u} = [-3, 0]$ i otrzymano wykres funkcji g.

a) O jaki wektor $\vec{v}$ można przesunąć równolegle wykres funkcji f wzdłuż osi OY, aby otrzymać wykres funkcji g? Przeprowadź odpowiednie obliczenia. Następnie naszkicuj wykresy funkcji f i g w jednym układzie współrzędnych i zaznacz wektory przesunięcia.

b) Czy przesuwając równolegle wykres funkcji $f(x) = x^2$ raz o wektor $\vec{u} = [-3, 0]$ i drugi raz o wektor $\vec{v}$ otrzymamy wykres tej samej funkcji?

1.60. Wykres funkcji liniowej $f(x) = \frac{-x}{2}$ przesunięto równolegle wzdłuż osi OY o wektor $\vec{u} = [0, -2]$ i otrzymano wykres funkcji g. O jaki wektor $\vec{v}$ można przesunąć równolegle wykres funkcji f wzdłuż osi OX, aby otrzymać wykres funkcji g? Przeprowadź odpowiednie obliczenia. Następnie naszkicuj wykresy funkcji f i g w jednym układzie współrzędnych i zaznacz wektory $\vec{u}$ i $\vec{v}$, zaczepione w punkcie $O(0, 0)$.

1.61. Funkcja f jest opisana za pomocą tabelki:

x	-4	-3	0	5	12	40	100
$f(x)$	-10	-8	-5	1	2	25	400

Opisz za pomocą tabelki funkcję g określoną wzorem:

a) $g(x) = f(x - 1) + 5$

b) $g(x) = f(x + 3) + 12$

c) $g(x) = f(x - 15) - 100$

d) $g(x) = f(x + 100) - 256$

1.62. Podaj współrzędne wektora $\vec{u}$, o jaki należy przesunąć wykres funkcji f, aby otrzymać wykres funkcji g, jeśli:

a) $g(x) = f(x - 2) + 4$

b) $g(x) = f(x + 1) + 5$

c) $g(x) = f(x + 5) - 3$

d) $g(x) = f(x - 7) - 2$

e) $g(x) = f\left(x - \sqrt{3}\right) + 10$

f) $g(x) = f(x + 4) - \sqrt{2}$.

1.63 Wykres funkcji f przesuń równolegle o wektor $\vec{u}$. Napisz wzór funkcji g, której wykres otrzymałeś, jeśli:

a) $f(x) = \sqrt{x}$, $\vec{u} = [1, 2]$

b) $f(x) = x^2$, $\vec{u} = [-2, 3]$

c) $f(x) = |x|$, $\vec{u} = [4, -5]$

d) $f(x) = \frac{1}{x}$, $\vec{u} = [1, -3]$.

1.64. Podaj współrzędne wektora $\vec{u}$, o jaki należy przesunąć wykres funkcji f, aby otrzymać wykres funkcji g, jeśli:

a) $f(x) = |x|$, $g(x) = |x - 1| + 8$

b) $f(x) = x^3$, $g(x) = (x + 20)^3 - 4$

c) $f(x) = x^4$, $g(x) = (x + 3)^4 - 1$

d) $f(x) = \frac{1}{2}x^2$, $g(x) = \frac{1}{2}(x - 1)^2 + 4$

e) $f(x) = 3\sqrt{x}$, $g(x) = 3\sqrt{x+2} + 6$

f) $f(x) = \frac{4}{x}$, $g(x) = \frac{4}{x-5} - 7$.

1.65. Naszkicuj wykres funkcji:

a) $y = (x + 2)^2 - 4$

b) $y = |x + 3| + 1$

c) $y = \sqrt{x-1} - 2$

d) $y = \frac{1}{x-2} + 1$

e) $y = (x + 1)^3 - 1$

f) $y = \frac{x+4}{2} + 3$.

1.66. Na rysunku obok dany jest wykres funkcji f. Funkcję g określa wzór: $g(x) = f(x + 2) + 5$. Wyznacz:

a) przedziały monotoniczności funkcji g

b) wartość największą i wartość najmniejszą funkcji g oraz dla jakich argumentów są one przyjmowane

c) wartość wyrażenia: $g(-6) \cdot g(-2) + g(0) \cdot g(3)$.



1.67. Dana jest dziedzina i zbiór wartości funkcji f. Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji g, jeśli:

a) $D_f = (-\infty, 3\rangle$, $ZW_f = (-4, 1\rangle$, $g(x) = f(x + 5) + 2$

b) $D_f = \langle -2, 8\rangle$, $ZW_f = \langle 1, 9\rangle$, $g(x) = f(x - 7) - 10$

c) $D_f = \mathbf{R} - \{5\}$, $ZW_f = (-2, +\infty)$, $g(x) = f(x + 6) - 5$

d) $D_f = (-8, 1)$, $ZW_f = (-\infty, 6\rangle$, $g(x) = f(x - 3) + 4$.

1.68. Podaj wzór funkcji g, której wykres otrzymamy, przesuwając równolegle wykres funkcji f o wektor $\vec{u}$, jeśli:

a) $f(x) = x^2 - x + 3$, $\vec{u} = [-4, -5]$

b) $f(x) = \frac{x}{x+2}$, $\vec{u} = [3, 1]$

c) $f(x) = -3x^2 + 5$, $\vec{u} = [-1, 2]$

d) $f(x) = 2(x + 1)(x - 1)$, $\vec{u} = [-2, 7]$.

Symetria osiowa. Symetria osiowa względem osi OX i OY

1.69. Znajdź obrazy danych figur w symetrii osiowej względem prostej k.

a)



b)



c)



d)



1.70. Zapoznaj się z poniższą definicją, a następnie wykonaj ćwiczenia.

„Prostą k *nazywamy* ***osią symetrii*** *figury* F *wtedy, gdy obrazem figury* F *w symetrii względem prostej* k *jest ta sama figura* F*, czyli* $S_k(F) = F$.
Figury, które mają oś symetrii nazywamy figurami ***osiowosymetrycznymi****”.*

1) Poniżej przedstawione są figury osiowosymetryczne. Ile osi symetrii ma każda z nich

a)

b)

c)

d)

e)



f)



2) Podaj przykład figury, która ma sześć osi symetrii.
3) Podaj przykład figury, która nie jest osiowosymetryczna.
4) Ile osi symetrii ma trójkąt:
   - różnoboczny
   - równoramienny, który nie jest równoboczny
   - równoboczny?

1.71. Funkcja f jest opisana za pomocą tabelki:

a)

x	−42	−30	6	15	17	2012
$f(x)$	−14	−12	15	6	90	143

b)

x	−23	−15	15	64	198	200
$f(x)$	112	−10	6	−15	90	143

Przedstaw za pomocą tabelki funkcję g, jeśli $g(x) = -f(x)$.

1.72. Na rysunkach jest przedstawiony wykres funkcji f. Naszkicuj wykres funkcji g, określonej wzorem $g(x) = -f(x)$. Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji g.

a)



b)



c)



d)



1.73. Napisz wzór funkcji g, której wykres otrzymamy po przekształceniu wykresu funkcji f przez symetrię osiową względem osi OX.

a) $f(x) = 3x - 2$ b) $f(x) = -5x + 8$ c) $f(x) = x^3 + 8$

d) $f(x) = 1 - x^2$ e) $f(x) = |x| - 15$ f) $f(x) = \sqrt{x} + 7$

1.74. Dana jest funkcja f. Napisz wzór funkcji, której wykres jest symetryczny do wykresu funkcji f względem osi OX. Naszkicuj wykresy obu funkcji w jednym układzie współrzędnych.

a) $f(x) = -4$ b) $f(x) = x - 3$ c) $f(x) = x^2$

d) $f(x) = x^3$ e) $f(x) = \sqrt{x+2}$ f) $f(x) = x^2 - 1$

1.75. Dana jest dziedzina i zbiór wartości funkcji f. Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji g, określonej wzorem $g(x) = -f(x)$.

a) $D_f = \langle -4, 3), ZW_f = (-1, 5\rangle$ b) $D_f = \mathbf{R} - \{3\}, ZW_f = \langle -4, +\infty)$

1.76. Funkcja f jest opisana za pomocą tabelki:

a)

x	−10	−6	−4	−3	1	2	7
$f(x)$	−5	−4	−1	0	2	5	13

b)

x	−46	−26	0	1	17	28	67
$f(x)$	−5	46	−7	−23	−22	11	13

Przedstaw za pomocą tabelki funkcję określoną wzorem $g(x) = f(-x)$.

1.77. Na podstawie wykresu funkcji f naszkicuj wykres funkcji g, określonej wzorem $g(x) = f(-x)$. Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji g.

a)



b)



c)



d)



1.78. Dany jest wzór funkcji f. Napisz wzór funkcji h, której wykres jest symetryczny względem osi OY do wykresu funkcji f. Podaj dziedzinę funkcji h. Naszkicuj wykresy obu funkcji w jednym układzie współrzędnych, jeśli:

a) $f(x) = x + 2$, gdzie $x \in \langle -4, 2 \rangle$

b) $f(x) = \frac{1}{x}$, gdzie $x \in (-\infty, 0)$

c) $f(x) = -2$, gdzie $x \in \langle -5, 1)$

d) $f(x) = x^3 - 2$, gdzie $x \in \langle -1, 2 \rangle$

e) $f(x) = \sqrt{x}$, gdzie $x \in \langle 0, 4 \rangle$

f) $f(x) = (x+1)^2$, gdzie $x \in \langle -3, 1)$.

1.79. Wykres funkcji g powstał w wyniku przekształcenia wykresu funkcji f przez symetrię osiową względem osi OY. Napisz wzór funkcji g i podaj jej dziedzinę, jeśli:

a) $f(x) = 5x - 4$

b) $f(x) = \sqrt{x} + 2$

c) $f(x) = |x + 3|$

d) $f(x) = \frac{1}{x+6}$

e) $f(x) = \sqrt{x-4}$

f) $f(x) = \frac{2x}{1-x}$

1.80. Dana jest dziedzina i zbiór wartości funkcji f. Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji g, określonej wzorem $g(x) = f(-x)$.

a) $D_f = \langle -4, 3), ZW_f = (-1, 5\rangle$ b) $D_f = \mathbf{R} - \{3\}, ZW_f = \langle -4, +\infty)$

1.81. Naszkicuj wykres funkcji:

a) $f(x) = -|x| - 2$ b) $f(x) = (-x)^3 + 1$ c) $f(x) = -(x^3 + 1)$

d) $f(x) = -\sqrt{x+4}$ e) $f(x) = \sqrt{-x+4}$ f) $f(x) = (-x + 2)^2$.

1.82. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f. Dla każdej z funkcji $g(x) = f(-x)$ oraz $h(x) = -f(x)$, podaj:

a) zbiór argumentów, dla których ta funkcja przyjmuje wartości ujemne

b) maksymalne przedziały, w których ta funkcja jest rosnąca

c) największą wartość tej funkcji

d) współrzędne punktu przecięcia wykresu tej funkcji z osią OY.



1.83. Funkcja f ma trzy miejsca zerowe: -5, 1, 6 oraz wiadomo, że $f(0) = 4$ i $f(3) = -2$. Podaj miejsca zerowe funkcji g i współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji g z osią OY, jeśli:

a) $g(x) = f(-x)$ b) $g(x) = -f(x)$ c) $g(x) = -f(x + 3)$.

1.84. Napisz wzór funkcji, której wykres otrzymamy w wyniku przekształcenia wykresu funkcji $f(x) = (x - 1)^3$ przez symetrię względem:

a) osi OX b) osi OY.

1.85. Napisz wzór funkcji, której wykres otrzymamy w wyniku przekształcenia wykresu funkcji $f(x) = \dfrac{3-x}{2x}$ przez symetrię względem:

a) osi OX b) osi OY.

Symetria środkowa. Symetria środkowa względem punktu (0, 0)

1.86. Znajdź obraz danej figury w symetrii środkowej względem punktu O, jeśli:

a)



b)



c)



d)



1.87. Zapoznaj się z poniższą definicją, a następnie wykonaj ćwiczenia.

*„Punkt O nazywamy **środkiem symetrii** figury F wtedy, gdy obrazem figury F w symetrii środkowej względem punktu O jest ta sama figura, czyli* $S_O(F) = F$. *Figury, które mają środek symetrii nazywamy **figurami środkowosymetrycznymi**."*

1) Wśród poniższych figur znajdują się figury środkowosymetryczne. Wskaż je.

a)



trójkąt równoboczny

b)

prosta

c)



romb

d)

2) Podaj przykład figury geometrycznej, która ma jeden środek symetrii, i figury geometrycznej, która ma nieskończenie wiele środków symetrii.
3) Narysuj dwie figury, które mają jednocześnie oś symetrii i środek symetrii.

1.88. Funkcja f jest opisana za pomocą tabelki:

a)

x	−4	−3	0	8	11	30	45
$f(x)$	−20	−8	−6	2	5	31	80

b)

x	−17	−12	10	26	103	115	170
$f(x)$	−2	−11	−90	27	24	1	−80

Opisz funkcję g za pomocą tabelki, jeśli $g(x) = -f(-x)$.

1.89. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f. Naszkicuj wykres funkcji g, określonej wzorem $g(x) = -f(-x)$. Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji g.

a)



b)



c)



d)



1.90. Wykres funkcji g jest symetryczny do wykresu funkcji f względem punktu $(0,0)$. Naszkicuj wykresy funkcji f oraz g we wspólnym układzie współrzędnych. Napisz wzór funkcji g i podaj jej dziedzinę, jeśli:

a) $f(x) = x + 4$, gdzie $x \in \langle -3, 0)$

b) $f(x) = \sqrt{x}$, gdzie $x \in \langle 0, 4)$

c) $f(x) = x^2$, gdzie $x \in \langle -1, 3\rangle$

d) $f(x) = \frac{1}{x}$, gdzie $x \in \langle 1, 4\rangle$

e) $f(x) = -1$, gdzie $x \in \langle -5, 6\rangle$

f) $f(x) = |x|$, gdzie $x \in \langle -4, 2)$.

1.91. Na rysunku obok jest przedstawiony wykres funkcji f. Funkcję g określa wzór: $g(x) = -f(-x)$. Podaj:

a) zbiór wartości funkcji g

b) miejsce zerowe funkcji g

c) wartość wyrażenia $g(-3) \cdot g(3) - g(4)$

d) maksymalne przedziały, w których funkcja g jest malejąca.



1.92. Dana jest dziedzina i zbiór wartości funkcji f. Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji g, określonej wzorem $g(x) = -f(-x)$.

a) $D_f = \langle -3, 7), ZW_f = (0, 4\rangle$

b) $D_f = (-1, 5), ZW_f = \langle -6, 2\rangle$

c) $D_f = (-\infty, 9\rangle, ZW_f = \mathbf{R} - \{-8\}$

d) $D_f = \left(-4, \sqrt{2}\right), ZW_f = \langle -1, +\infty)$

1.93. Dany jest wzór funkcji f. Napisz wzór funkcji g, której wykres otrzymamy przekształcając wykres funkcji f przez symetrię środkową względem punktu $O(0, 0)$. Oblicz miejsca zerowe i współrzędne punktu przecięcia wykresu funkcji g z osią OY (o ile istnieją).

a) $f(x) = -4x + 7$

b) $f(x) = 3$

c) $f(x) = x^2 - 1$

d) $f(x) = x^3 + 8$

e) $f(x) = \sqrt{x} - 1$

f) $f(x) = 3(x - 2)(x + 1)$

Zastosowanie wykresów funkcji do rozwiązywania równań i nierówności

1.94. Odczytaj z wykresu funkcji $f(x) = (x + 2)^2$ argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartość 1. Następnie rozwiąż algebraicznie równanie $(x + 2)^2 = 1$.

1.95. Odczytaj z wykresu funkcji $f(x) = \sqrt{-x}$ argument, dla którego funkcja f przyjmuje wartość 2. Następnie rozwiąż algebraicznie równanie $\sqrt{-x} = 2$.

1.96. Naszkicuj wykres funkcji $f(x) = |x - 2| - 3$. Następnie podaj zbiór rozwiązań równania $f(x) = -2$.

1.97. Korzystając z wykresu odpowiedniej funkcji rozwiąż równanie:

a) $|x| = x$

b) $\frac{1}{x-5} = -1$

c) $(x + 2)^3 = -8$

1.98. Korzystając z wykresów odpowiednich funkcji rozwiąż równanie:

a) $x^2 - 2 = -x$ b) $(x-3)^2 = x - 1$ c) $-\frac{1}{x} + 1 = |x - 1|$

1.99. Korzystając z wykresów odpowiednich funkcji rozwiąż równanie:

a) $x^3 = |x - 2|$ b) $2 - x^2 = |x|$ c) $\sqrt{x+2} = \sqrt{x-6} + 2$

1.100. Naszkicuj wykres funkcji $f(x) = \frac{1}{x+3}$. Odczytaj z wykresu zbiór rozwiązań nierówności $f(x) < 1$.

1.101. Naszkicuj wykres funkcji $f(x) = \sqrt{-x}$. Odczytaj z wykresu zbiór rozwiązań nierówności $f(x) < 2$.

1.102. Naszkicuj wykres funkcji $f(x) = (x-2)^2 - 3$. Odczytaj z wykresu zbiór rozwiązań nierówności $f(x) \geq 1$.

1.103. Naszkicuj w jednym układzie współrzędnych wykresy funkcji $f(x) = -\sqrt{-x}$ oraz $g(x) = |x| - 2$.

a) Podaj argument, dla którego funkcje f i g przyjmują tę samą wartość.

b) Rozwiąż nierówność $f(x) > g(x)$.

1.104. Korzystając z wykresów odpowiednich funkcji rozwiąż nierówność:

a) $x^3 > x$ b) $\sqrt{x-2} \leq 5 - \frac{1}{2}x$ c) $\sqrt{-x} \geq x + 2$

1.105. Korzystając z wykresów odpowiednich funkcji rozwiąż nierówność:

a) $-|x| < \frac{1}{2}x - 3$ b) $\frac{-1}{x+1} \geq (x+1)^2$ c) $\frac{1}{x-4} - 1 > -|x-5|$

Test sprawdzający do rozdziału 1.

1. Środek odcinka AB ma współrzędne $(13, -2)$. Jeśli $A(-7, 4)$, to:

A. $B(3, 1)$ B. $B(10, -6)$ C. $B(23, 8)$ D. $B(33, -8)$

2. Wektorem przeciwnym do wektora $\vec{a} = [4, -5]$ jest wektor o współrzędnych:

A. $\left[\frac{1}{4}, -\frac{1}{5}\right]$ B. $\left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{5}\right]$ C. $[5, -4]$ D. $[-4, 5]$

3. Długość wektora $\vec{b} = [-3, 4]$ jest równa:

A. 7 B. 5 C. 4 D. 3

4. Jeśli $A(9, -2)$ i $\overrightarrow{AB} = [-6, 7]$, to punkt B ma współrzędne:

A. $(-3, -5)$ B. $(3, 5)$ C. $(5, 3)$ D. $(3, -5)$

5. Dany jest wektor $\vec{u} = [3, -2]$. Wskaż wektor, który nie jest równoległy do wektora $\vec{u}$.

A. $\vec{a} = \left[\frac{3}{4}, -\frac{1}{2}\right]$ B. $\vec{b} = [-3, 2]$ C. $\vec{c} = [57, -38]$ D. $\vec{d} = [-2, 3]$

6. W wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji $f(x) = \sqrt{x}$ o 4 jednostki do góry otrzymamy wykres funkcji:

A. $g(x) = \sqrt{x} + 4$ B. $g(x) = \sqrt{x} - 4$

C. $g(x) = \sqrt{x+4}$ D. $g(x) = \sqrt{x-4}$

7. Wykres funkcji $f(x) = |x + 5| + 1$ powstaje w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji $y = |x|$ o wektor:

A. $\vec{u} = [5, 1]$ B. $\vec{u} = [5, -1]$ C. $\vec{u} = [-5, 1]$ D. $\vec{u} = [-5, -1]$

8. Na rysunku obok przedstawiony jest wykres funkcji $y = f(x)$.



Wykres funkcji $g(x) = f(x - 3)$ przedstawiony jest na rysunku:

A.



B.



C.



D.



9. W wyniku przekształcenia wykresu funkcji $f(x) = -x^2 + 3x + 2$ przez symetrię względem osi OX otrzymujemy wykres funkcji, określonej wzorem:

A. $y = x^2 + 3x + 2$ B. $y = x^2 - 3x - 2$ C. $y = -x^2 - 3x + 2$ D. $y = x^2 - 3x + 2$

10. Na rysunku obok przedstawiony jest wykres funkcji $y = f(x)$.



Wykres funkcji określonej wzorem $g(x) = -f(-x)$ znajduje się na rysunku:

A.



B.



C.



D.



11. Dziedziną funkcji f jest przedział $\langle -3, 2)$. Wykres funkcji f przekształcono przez symetrię osiową względem osi OY i otrzymano wykres funkcji g. Dziedziną funkcji g jest przedział:

A. $\langle -2, 3)$ B. $(-2, 3\rangle$ C. $\langle -3, 2)$ D. $(-3, 2\rangle$

12. Zbiorem wartości funkcji f jest przedział $\langle -5, 1)$. Wykres funkcji f przekształcono przez symetrię osiową względem osi OX i otrzymano wykres funkcji g. Wskaż zbiór wartości funkcji g.

A. $\langle -5, 1)$ B. $(-5, 1\rangle$ C. $(-1, 5\rangle$ D. $\langle -1, 5)$

13. Funkcja $y = f(x)$ ma dwa miejsca zerowe: -3 oraz 1. Miejscami zerowymi funkcji $y = f(x + 1)$ są liczby:

A. -2 oraz 2 B. -4 oraz 0 C. -2 oraz 0 D. -4 oraz 2

14. Na rysunku obok znajduje się wykres funkcji f, określonej w przedziale $\langle -1, 8\rangle$. Wskaż zbiór rozwiązań równania $-f(x + 1) = 2$.



A. $\{-1\}$ B. $\{3, 5\}$

C. $\{2, 4\}$ D. $\{4, 6\}$

15. Wykres funkcji f jest przedstawiony w zadaniu 14. Wskaż zbiór rozwiązań nierówności $f(-x) + 1 > 0$.

A. $(2, 6)$ B. $\langle -1, 2)\cup(6, 8\rangle$ C. $\langle -8, -6)\cup(-2, 1\rangle$ D. $(0, 8)$

Zadania powtórzeniowe do rozdziału 1.

16. Dany jest punkt $B(4, -3)$ oraz wektor $\overrightarrow{AB} = [-2, 5]$. Oblicz:

a) współrzędne punktu A,

b) współrzędne punktu C, jeśli $\overrightarrow{AC} = -3\overrightarrow{AB}$.

17. W trójkącie ABC dane są: $A(-7, -1)$, $B(5, 1)$ oraz $\overrightarrow{BD} = [-9, 1]$, gdzie D to środek boku AC. Oblicz współrzędne punktu D oraz długość boku AC.

18. W trójkącie ABC dane są: $A(-5, 2)$, $B(3, -4)$, $C(1, 5)$. Wyznacz współrzędne punktu D tak, aby figura $ABCD$ była równoległobokiem.

D 19. Dane są punkty: $A(0, -3)$, $B(4, -1)$, $C(5, 3)$, $D(-3, -1)$. Korzystając z własności wektorów wykaż, że czworokąt $ABCD$ jest trapezem.

20. Funkcja f jest określona wzorem $f(x) = -x^2 + 10$. Wykres funkcji g powstał w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji f o 3 jednostki w lewo.

a) Napisz wzór funkcji g.

b) Do wykresu funkcji g należy punkt $(-2, a)$. Oblicz a.

21. Wykres funkcji liniowej $f(x) = 3x + 5$ przesunięto o 2 jednostki w prawo i otrzymano wykres funkcji g.

a) Podaj wzór funkcji g.

b) O jaki wektor można przesunąć wykres funkcji g wzdłuż osi OY, aby otrzymać wykres funkcji f?

D 22. Wykres funkcji $f(x) = -2x^2$ przesunięto równolegle o wektor $\vec{v} = [1, 4]$ i otrzymano wykres funkcji g. Wykaż, że $g(x) = -2x^2 + 4x + 2$.

23. Funkcja liniowa f jest określona wzorem $f(x) = -2x + 3$. Napisz wzór funkcji:

a) g, której wykres jest symetryczny do wykresu funkcji f względem osi OX,

b) h, której wykres jest symetryczny do wykresu funkcji f względem osi OY,

c) k, której wykres jest symetryczny do wykresu funkcji f względem punktu $O(0, 0)$.

24. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji $y = f(x)$.

a) Naszkicuj wykres funkcji $y = g(x)$, gdzie $g(x) = -f(x)$.

b) Podaj zbiór rozwiązań równania $g(x) = -2$.



25. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji $y = f(x)$.

a) Naszkicuj wykres funkcji $y = g(x)$, gdzie $g(x) = f(-x)$.

b) Podaj maksymalne przedziały, w których funkcja g jest rosnąca.



26. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji $y = f(x)$.



a) Naszkicuj wykres funkcji $y = g(x)$, gdzie $g(x) = f(x + 2) - 1$.

b) Podaj zbiór rozwiązań nierówności $g(x) < 0$.

27. Dziedziną funkcji f jest zbiór $D_f = \langle -4, 8\rangle$, a jej zbiorem wartości jest zbiór $ZW_f = \langle -1, +\infty)$. Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji:

a) $y = f(-x)$ b) $y = -f(x)$ c) $y = f(x + 3) - 4$

28. Naszkicuj wykres funkcji $f(x) = \frac{x}{2} + 1$, gdzie $x \in \langle -2, 0) \cup (0, 2\rangle$.

a) Podaj wzór funkcji g, której wykres otrzymamy w wyniku przekształcenia wykresu funkcji f przez symetrię środkową względem punktu $O(0, 0)$.

b) Na podstawie wykresu funkcji g rozwiąż nierówność $g(x) \leq -1$.

29. Rozwiąż graficznie równanie:

a) $\frac{1}{x+5} = -x - 3$ b) $(x - 1)^2 = 2x - 2$ c) $-|x| = x^2 - 6$

30. Rozwiąż graficznie nierówność:

a) $-x^3 \geq \sqrt{-x}$ b) $|x - 2| > x^2$ c) $\frac{-4}{x+1} \leq x + 6$

31. Podaj dwa kolejne przekształcenia, które można wykonać, aby z wykresu funkcji $f(x) = \sqrt{x}$ otrzymać wykres funkcji:

a) $g(x) = 7 - \sqrt{x}$ b) $h(x) = \sqrt{7 - x}$ c) $k(x) = -\left(\sqrt{-x} + 7\right)$

32. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f.



a) Naszkicuj wykres funkcji g, określonej wzorem $g(x) = f(-x) + 1$.

b) Podaj dziedzinę funkcji g.

c) Podaj zbiór wartości funkcji g.

d) Oblicz wartość wyrażenia $[g(-4) + g(5)] \cdot [g(-3) - g(1)]$.

2. Równania i nierówności z wartością bezwzględną

Wartość bezwzględna liczby rzeczywistej

2.1. Oblicz:

a) $\left|-2\frac{1}{2}\right| + \left|1\frac{1}{2}\right|$

b) $\left|-2\frac{1}{3}+1\frac{1}{3}\right|$

c) $|-2{,}6| - |-3{,}3|$

d) $\left|\sqrt{2}-3\right|$

e) $\left|2-\sqrt{5}\right|$

f) $\left|-2\sqrt{3}+\sqrt{12}\right|$

2.2. Oblicz wartość danego wyrażenia. Oceń, jaką liczbą – wymierną czy niewymierną – jest wynik obliczeń.

a) $2\sqrt{3}-\left|3-2\sqrt{3}\right|$

b) $2\pi - |2\pi - 7|$

c) $\left|3-\sqrt{2}\right|-\left|\sqrt{2}+1{,}3\right|$

d) $\left|\sqrt{2}-\sqrt{3}\right|+\left|2\sqrt{2}-\sqrt{3}\right|$

e) $|3-\pi| - |\pi - 3|$

f) $\left|1-\sqrt{3}\right|+\left|-1+\sqrt{3}\right|$

2.3. Oblicz wartość danego wyrażenia. Oceń, jaką liczbą – wymierną czy niewymierną – jest wynik obliczeń.

a) $3\left|1-\sqrt{6}\right|-3\sqrt{6}$

b) $\left|1-\sqrt{2}\right|\cdot\left|-\sqrt{2}\right|$

c) $\left|1{,}8-\sqrt{3}\right|+(-1)\left|\sqrt{3}-3\right|$

d) $-|-8| - |8-\pi^2|$

2.4. Oblicz wartość wyrażenia:

a) $\left|\left(\sqrt{6}-\sqrt{5}\right)\left(\sqrt{5}+\sqrt{6}\right)\right|-3\cdot\left(\sqrt{20}-2\cdot\left|\sqrt{5}-2\right|\right)$

b $\left(\left|\sqrt{75}-4\sqrt{3}\right|-\left|\sqrt{27}-\sqrt{108}\right|+1\right)\cdot\left(1+2\sqrt{3}\right)$

c) $\left|4\sqrt{2}-3\sqrt{8}+5\right|\cdot\left|-2\sqrt{2}-5\right|$

d) $\left|3\sqrt{5}-2\sqrt{125}+10\right|\cdot\left|7\sqrt{5}-10\right|$

2.5. Oblicz wartość wyrażenia:

a) $\frac{|\sqrt{12}-5|}{|\sqrt{3}-2|}+|4-\sqrt{3}|$

b) $\frac{|4-2\sqrt{5}|\cdot|\sqrt{20}-4|}{|-4(4\sqrt{5}-9)|}$

c) $\frac{|(\sqrt{6}-2\sqrt{3})\cdot(2\sqrt{3}-\sqrt{6})|}{2\sqrt{2}-3}$

d) $\frac{|(\sqrt{5}-2\sqrt{2})(\sqrt{5}+2\sqrt{2})|}{|\sqrt{5}-1|\cdot|1-\sqrt{5}|}+\frac{3}{6+2\sqrt{5}}$

2.6. Oblicz wartość wyrażenia:

a) $2a\cdot|a-3|$, jeśli $a=-4$

b) $|2a-3|\cdot(3+2a)$, jeśli $a=-\sqrt{3}$

2.7. Oblicz wartość wyrażenia:

a) $|-1-|2-b||+b$, jeśli $b=3$

b) $b-|-b+1|$, jeśli $b=\sqrt{2}$

2.8. Oblicz wartość wyrażenia $||a^2-200|-3a|+2a$ w przypadku, gdy:

a) $a=-10$

b) $a=\sqrt[3]{20\cdot3^3+2\cdot3^4+5\cdot3^5+2\cdot3^6}$

2.9. Zapisz podane wyrażenie bez użycia symbolu wartości bezwzględnej.

a) $|a-2|$, jeśli $a\in\langle 2,+\infty)$

b) $|3+a|$, jeśli $a\in(-\infty,-3)$

c) $|3a-2|$, jeśli $a\in\langle 1,+\infty)$

d) $|4-8a|$, jeśli $a\in\langle 1,+\infty)$

2.10. Zapisz podane wyrażenie bez użycia symbolu wartości bezwzględnej:

a) $|-2a|\cdot|a-1|$, jeśli $a\in(-\infty,-1)$

b) $|1+2a|+|-3a|$, jeśli $a\in(-\infty,-2)$

c) $2a-|3-|a||$, jeśli $a\in(4,+\infty)$

d) $|2a|-|1-|a||$, jeśli $a\in(-\infty,-3)$

2.11. Napisz wzór funkcji f bez użycia symbolu wartości bezwzględnej. Następnie naszkicuj wykres funkcji f w układzie współrzędnych.

a) $f(x)=x-|x|$

b) $f(x)=2|x+3|$

c) $f(x)=3-|3-3x|$

d) $f(x)=-\left|1-\frac{1}{3}x\right|+2$

2.12. Napisz wzór funkcji f bez użycia symbolu wartości bezwzględnej. Następnie naszkicuj wykres funkcji f w układzie współrzędnych.

a) $f(x)=x\cdot|x|$

b) $f(x)=\frac{|2x|}{x}+1$

c) $f(x)=|0{,}5x-1|+x$

d) $f(x)=x-|4+x|$

D 2.13. Wykaż, że wartość podanego wyrażenia jest stała.

a) $|a-3|-|a-2|$, jeśli $a \in (-\infty, 0)$

b) $|4-a|+|2+a|$, jeśli $a \in (-2, 4)$

c) $|a-3|-|a+4|$, jeśli $a \in (3, +\infty)$

d) $|a+1|-|a+5|$, jeśli $a \in (-\infty, -5)$

D 2.14. Wykaż, że jeśli a jest liczbą ujemną i b jest liczbą dodatnią, to $|-3a+4b|-2|3b-a| = -a-2b$.

D 2.15. Wykaż, że jeśli liczby x i y są ujemne, to $|2x+y| \cdot |-2x-y| - |4x^2+y^2| = 4xy$.

D 2.16. Wykaż, że jeśli $a > b > 0$, to $2(b^2-|ab|)+|b-a| \cdot |a+b| > 0$.

2.17. Oblicz:

a) $\left|1+\log_{\frac{1}{3}} 9\right| - \left|5+8^{\frac{1}{3}}\right| \cdot \left|-2\log_2 4 - \left(\frac{1}{3}\right)^{-2}\right|$

b) $2-\left|2\log_5 25 - 81^{\frac{3}{4}}\right| - \left|\left(1-\sqrt{3}\right)\left(1+\sqrt{3}\right)\right|$

c) $\left|-3\log_{\frac{1}{2}} 0{,}25 - \sqrt[3]{216}\right| - \left|0{,}75^{-\frac{1}{2}} - \sqrt{3}\right| \cdot \sqrt{3}$

d) $\left|3^{\log_3 2} - 5\right| \cdot 16^{\frac{3}{4}} - 0{,}5^{-3} \left|-\log_{81} 9\right|$

Odległość między liczbami na osi liczbowej. Geometryczna interpretacja wartości bezwzględnej na osi liczbowej

2.18. Dane są liczby a i b. Wyznacz na osi liczbowej liczbę c równoodległą od liczb a i b. Jaka jest odległość d liczby c od liczb a i b?

a) $a = -2$ i $b = 4$

b) $a = -2$ i $b = 5$

c) $a = -8{,}4$ i $b = 1{,}5$

d) $a = 3\frac{1}{3}$ i $b = 87\frac{5}{6}$

e) $a = -3\sqrt{7}$ i $b = -29\sqrt{7}$

f) $a = -9+4\sqrt{5}$ i $b = 5-2\sqrt{5}$

2.19. Wyznacz liczby, które znajdują się na osi liczbowej w odległości d od liczby a, jeśli:

a) $a = 2,\ d = 3$
b) $a = -2,\ d = 5$
c) $a = -7,\ d = 26$
d) $a = \sqrt{2},\ d = 3$
e) $a = -3,\ d = \pi + 1$
f) $a = 1 + \sqrt{3},\ d = 4 - \sqrt{3}$

2.20. Zaznacz na osi liczbowej i zapisz za pomocą przedziału zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, których:

a) odległość na osi liczbowej od liczby 1 jest mniejsza od 5 lub równa 5,
b) odległość na osi liczbowej od liczby 3 jest mniejsza od 4,
c) odległość na osi liczbowej od liczby -2 jest większa od 3 lub równa 3,
d) odległość na osi liczbowej od liczby -5 jest większa od 2,
e) odległość na osi liczbowej od liczby 6 jest nie mniejsza niż 1,
f) odległość na osi liczbowej od liczby -4 jest nie większa niż 5.

2.21. Zapisz odległość na osi liczbowej między danymi liczbami, używając znaku wartości bezwzględnej. Następnie oblicz tę odległość.

a) -4 i -28
b) $-14\frac{2}{3}$ i $16\frac{2}{3}$
c) π i $2\sqrt{3}$
d) $-2\sqrt{2}$ i $4\sqrt{2} + 3$
e) $\sqrt{3} - 1$ i $\sqrt{3} + 7$
f) $1 - 2\sqrt{3}$ i $4 + 2\sqrt{3}$

2.22. Zapisz poniższe zdanie, używając symbolu wartości bezwzględnej.

a) Odległość liczby x od liczby 0 jest równa 8.
b) Odległość liczby y od liczby 5 jest równa 1.
c) Odległość liczby (-3) od liczby a jest równa 4.
d) Odległość liczby z od liczby 8 jest mniejsza od 3.
e) Odległość liczby p od liczby -2 jest większa od 7.
f) Odległość liczby k od liczby -1 jest nie większa od 5.
g) Odległość liczby 7 od liczby m jest nie mniejsza od 2.

2.23. Wyznacz odległość między danymi liczbami a i b w zależności od m, jeśli:

a) $a = 12 - 3m$, $b = 5m - 4$ i $m \in (-\infty, 2\rangle$
b) $a = \frac{12m}{5} - 9$, $b = 6 - 3{,}6m$ i $m \in \langle 3, +\infty)$
c) $a = m^2 + 5m - 6$, $b = (m + 3)^2$ i $m \in (0, +\infty)$
d) $a = (m - 4)^2$, $b = -8m - 17$ i $m \in \boldsymbol{R}$.

Proste równania z wartością bezwzględną

2.24. Sprawdź, które z podanych liczb są rozwiązaniami równania:

a) $2|x| = 6$ 0, –3, 3

b) $|x + 3| = 7$ –4, –10, 4

c) $|x - 2| = -6$ 0, –4, 2

d) $|x + 5| = 0$ 0, 3, –5

2.25. Rozwiąż równanie:

a) $|x| = \frac{1}{5}$

b) $|x| = -2$

c) $3|x| = \sqrt{18}$

d) $5|x| + 10\sqrt{3} = 0$

e) $-\frac{|x|}{3} + 1 = 1$

f) $\frac{3|x|+1}{2} = 5$

2.26. Rozwiąż dane równanie, korzystając z odległości między liczbami na osi liczbowej.

a) $|x - 2| = 3$

b) $|x + 1| = 4$

c) $|3 - x| = 0$

d) $|2 + x| = 1$

e) $|x - 5| = 2$

f) $|-4 + x| = 5$

2.27. Rozwiąż dane równanie, korzystając z odległości między liczbami na osi liczbowej.

a) $|9 + x| = 0$

b) $|3 - x| = 8$

c) $|16 + x| = 5$

d) $|x - 21| = 3$

e) $|-1 - x| = 7$

f) $|-2 - x| = -2$

2.28. Zapisz równanie z niewiadomą x typu $|x - a| = b$, które:

a) ma jedno rozwiązanie, równe 11,

b) ma jedno rozwiązanie, równe –19,

c) jest sprzeczne,

d) ma dwa rozwiązania: –8 i 8,

e) ma dwa rozwiązania: –3 i 7,

f) ma dwa rozwiązania: 3π i -7π.

2.29. Zapisz równanie z niewiadomą x typu $|x - a| = b$, którego zbiorem rozwiązań jest zbiór:

a) $\{-\sqrt{6}, \sqrt{6}\}$

b) $\{2-\sqrt{3}, 2+\sqrt{3}\}$

c) $\{-3\sqrt{5}\}$

d) $\{5, 17\}$

e) $\left\{-8\frac{1}{2}, 3\frac{1}{2}\right\}$

f) $\left\{-2\frac{1}{3}, 5\frac{2}{3}\right\}$

2.30. Rozwiąż algebraicznie równanie:

a) $|x-1|=2$ b) $|x-4|=0$ c) $|-x-1|=4$

d) $|2+x|=3$ e) $|x-3|+7=0$ f) $1-|x+5|=0$

2.31. Rozwiąż algebraicznie równanie:

a) $|x-1{,}2|-6{,}8=0$ b) $|3{,}4-x|=0{,}6$ c) $-|2{,}5+x|=0$

d) $7|-x-5|=-21$ e) $0{,}2|x-1|=0{,}4$ f) $-0{,}1|-3-x|=-1$

2.32. Rozwiąż algebraicznie równanie:

a) $\frac{3|x-2|}{4}=1{,}5$ b) $\frac{|x+2{,}4|+1{,}2}{3}=1$ c) $\frac{5|3+x|-1{,}2}{8}=0$

d) $\frac{4-|-x+2|}{3}=4{,}8$ e) $\frac{|3-x|-5{,}3}{2}=8$ f) $\frac{6-2|-x-1|}{3}=-4$

2.33. Rozwiąż równanie:

a) $|x-\sqrt{2}|+3=\sqrt{2}$ b) $3|2\sqrt{5}-x|=21-9\sqrt{5}$

c) $\frac{|x-2\sqrt{3}|-1}{3}=2-\sqrt{3}$ d) $0{,}2|-x-5\sqrt{2}|=\frac{1}{5}+\sqrt{2}$

e) $\frac{|\sqrt{2}-x|+\sqrt{2}}{3}=1$ f) $\frac{|x+2\sqrt{3}|-2}{\sqrt{3}}=4$

2.34. Rozwiąż równanie:

a) $|3x+7|=2$ b) $|25x-3|=122$ c) $|9-4x|=21$

d) $|1-2x|=13$ e) $|-8x+5|=11$ f) $|-2-5x|=16$

2.35. Rozwiąż równanie graficznie, szkicując wykres odpowiedniej funkcji.

a) $|x+4|=2$ b) $|3-x|=1$ c) $|1+x|-4=0$

d) $-|x-1|=5$ e) $|2x-6|=0$ f) $|0{,}5x+1|=2$

2.36. Dane są zbiory:

$$A=\{x: x\in \boldsymbol{R} \wedge 3|2-x|=4-|x-2|\}$$

$$B=\{x: x\in \boldsymbol{R} \wedge |x+5|=2|-5-x|\}$$

$$C=\{x: x\in \boldsymbol{R} \wedge 2(|x+1|-3)=|1+x|-2\}.$$

a) Wypisz elementy zbiorów A, B, C.

b) Wyznacz zbiory: $(B\cup C)\cap A$, $(A-C)\cup B$, $C-A-B$.

Proste nierówności z wartością bezwzględną

2.37. Sprawdź, która z liczb podanych obok nierówności spełnia tę nierówność, jeśli:

a) $|5-x| \leq 2$ 0, 3, 6, 7

b) $|x+1| > 5$ $-9, -4, -1, 6$

c) $|x-4| > 0$ $-2, 3\frac{1}{2}, 4, 5$

d) $|-x-2| \leq 0$ $-3, -2, 0, 1$

2.38. Podaj zbiór rozwiązań nierówności:

a) $|x| \leq 0$ b) $|x+1| > 0$ c) $-|x| \leq 9$ d) $2|x| < -4$

2.39. Podaj przykład nierówności z wartością bezwzględną, której zbiorem rozwiązań jest:

a) zbiór pusty

b) zbiór jednoelementowy

c) zbiór liczb rzeczywistych

d) zbiór $\boldsymbol{R} - \{3\}$

2.40. Rozwiąż nierówność, korzystając z odległości między liczbami na osi liczbowej.

a) $|x| < 4$ b) $|x| \geq 6$ c) $|x| > 9$

d) $|x| \leq 2$ e) $|x| - 5 \leq 3$ f) $2|x| - 2\sqrt{3} > 0$

2.41. Rozwiąż nierówność, korzystając z odległości między liczbami na osi liczbowej.

a) $|x-4| < 3$ b) $|x+1| \leq 2$ c) $|x-2| > 0$

d) $4 - |1-x| \geq 0$ e) $|3-x| - 1 \leq 0$ f) $|5+x| - 2 > 0$

2.42. Rozwiąż nierówność, korzystając z odległości między liczbami na osi liczbowej.

a) $|x+1| - 2 > 0$ b) $1 - |x-1| \leq 0$ c) $-3|x| + 8 > 2$

d) $0 < 4 - |x-4|$ e) $-|9-x| \geq -3$ f) $3 - 3|6+x| < 0$

2.43. Zapisz nierówność z wartością bezwzględną, jeśli dany jest jej zbiór rozwiązań.

a) $(-9, 9)$ b) $\left(-\infty, -\sqrt{3}\right) \cup \left(\sqrt{3}, +\infty\right)$ c) $(-4, 12)$

d) $(-\infty, -4\rangle \cup \langle 2, +\infty)$ e) $(-\infty, 5) \cup (7, +\infty)$ f) $\langle 0, 10\rangle$

g) $\langle -9, 5\rangle$ h) $(2-\sqrt{3}, 2+\sqrt{3})$ i) $(-2\pi, 4\pi)$.

2.44. Korzystając z wykresu odpowiedniej funkcji rozwiąż graficznie nierówność:

a) $|x-5| > 1$ b) $|x+3| \leq 2$ c) $|4+x| \geq 3$

d) $|2x-4| \leq 0$ e) $|0{,}5x-1| > 2$ f) $-|2(x+1)| > -4$

2.45. Rozwiąż algebraicznie nierówność:

a) $|x + 1{,}4| - 8{,}4 \leq 0$ b) $0 > 1{,}4 - |2{,}6 - x|$ c) $|0{,}25 + x| \geq 1{,}25$

d) $10|x - 1{,}3| < 18$ e) $|0{,}3x + 1| \leq 0$ f) $-2|x - 0{,}3| + 3 > 0$

2.46. Rozwiąż algebraicznie nierówność:

a) $|x-\sqrt{2}|<1$ b) $|\sqrt{3}+x|\geq 2\sqrt{3}$ c) $|-x-\sqrt{5}|\leq 0$

d) $|3-x|<2-\sqrt{6}$ e) $|x-\sqrt{2}+1|>1$ f) $|x+\sqrt{3}+5|<4$

2.47. Rozwiąż algebraicznie nierówność:

a) $|3x + 13| \leq 100$ b) $|12x - 2| < 50$ c) $|4 - 5x| > 13$

d) $|17 - 6x| \geq 5$ e) $1 - |2x - 7| \leq 0$ f) $3 - |2 - 5x| > 0$

2.48. Rozwiąż nierówność:

a) $0{,}7 \cdot |x-0{,}1|>0$ b) $3|x+2|+1\frac{5}{7}<0$ c) $-2\left|5-\frac{x}{3}\right|+1\frac{1}{3}>0$

d) $2 + |-6x + 5| > 1$ e) $3 - |-9x + 8| \geq 3$ f) $|x - 2| \geq 1 + \sqrt{5}$

2.49. Zbiór A jest zbiorem rozwiązań nierówności $3 - |x + 3| > 0$, zaś zbiór B – zbiorem rozwiązań nierówności $|x + 4| \geq 1$.

a) Wypisz wszystkie liczby parzyste należące do zbioru A.

b) Podaj przykład liczby wymiernej, która nie należy do zbioru B.

c) Wyznacz zbiory: $A \cap B$ i $B - A$.

2.50. Zbiór A jest zbiorem rozwiązań nierówności $4 - 2|x| > 0$, zaś zbiór B – zbiorem rozwiązań nierówności $|x + 1| - 2 \leq 0$.

a) Zaznacz na osi liczbowej zbiory A i B.

b) Wypisz wszystkie liczby naturalne należące do zbioru $A \cup B$.

c) Podaj przykład liczby niewymiernej należącej do zbioru $B - A$.

d) Wyznacz zbiór $A' \cap B'$.

2.51. Wyznacz wszystkie liczby całkowite spełniające jednocześnie dwie nierówności:

a) $|x - 2| < 3$ i $3 - |x| > 0$ b) $|x + 1| \geq 4$ i $|x - 2| - 4 < 0$

c) $|x - 1{,}2| \leq 4$ i $-2 + |x| \leq 0$ d) $2|x - 0{,}4| < 5$ i $|x + 0{,}1| - 0{,}4 \leq 0$

2.52. Rozwiąż nierówność podwójną:

a) $|x - 2| < 3 < |x - 1| + 1$ b) $2 - |x + 1| \leq 2|1 + x| \leq 4$

Test sprawdzający do rozdziału 2.

1. Wartość wyrażenia $\frac{\left|\sqrt{3}-2\right|\cdot\left|-2-\sqrt{3}\right|}{2}$ jest równa:

A. $-0{,}5$ B. $\frac{7-4\sqrt{3}}{2}$ C. $2\sqrt{3}+\frac{7}{2}$ D. $0{,}5$

2. Jeśli $x \in (-6, 2)$, to wyrażenie $|2x-4|-3|x+6|$ można zapisać w postaci:

A. $x-14$ B. $-x+10$ C. $-5x-14$ D. $-5x-2$

3. Wiadomo, że $a<0$ i $b>0$. Wobec tego wyrażenie $|b-3a|\cdot|a-3b|$ jest równe:

A. $3a^2-10ab+3b^2$ B. $3(a^2+b^2)$ C. $-10ab$ D. $10ab-3(a^2+b^2)$

4. Liczbą równoodległą od liczb $\sqrt[3]{27}-3\sqrt{2}$ i $\sqrt{50}-7$ na osi liczbowej jest liczba:

A. $2(\sqrt{2}-1)$ B. $5-4\sqrt{2}$ C. $\sqrt{2}-4$ D. $\sqrt{2}-2$

5. Odległość między liczbami $\sqrt{5}+2$ i $\sqrt{5}-17$ na osi liczbowej jest równa:

A. 4 B. 19 C. $2+\sqrt{5}$ D. 18

6. Wskaż liczbę, która spełnia równanie $|4-5x|-2x=|x|$.

A. 1 B. 0 C. -1 D. 2

7. Wskaż równanie sprzeczne.

A. $|-3-x|=0$ B. $|x+3|+1=0$ C. $|7-x|=1$ D. $|-2-x|=4$

8. Wskaż równanie, którego rozwiązaniami są liczby 8 i -12:

A. $|-x-2|=10$ B. $|x+2|=6$ C. $|x-2|=10$ D. $|2-x|=6$

9. Zbiór $(-\infty, -15)\cup(21, +\infty)$ jest zbiorem rozwiązań nierówności:

A. $|x+3|>18$ B. $|2x-6|>15$ C. $|x-6|>15$ D. $|x-3|>18$

10. Najmniejszą liczbą pierwszą należącą do zbioru rozwiązań nierówności $|2-x|\leq 1$ jest liczba:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

Zadania powtórzeniowe do rozdziału 2.

11. Oblicz wartość wyrażenia dla podanej obok wartości zmiennej:

a) $\left|2-a\left|a-4\right|\right|+1\frac{7}{9}$ $\quad a=0,3^{-1}$

b) $15+\left|5-b\right|\cdot\left|10-b\right|-\left|2b-6\right|\cdot\left|30-b\right|$ $\quad b=\sqrt{33^2+44^2}$

12. Oblicz wartość wyrażenia: $\dfrac{\left|\sqrt{48}-3\sqrt{3}\right|\cdot\left|1-\sqrt{3}\right|}{\left|\sqrt{5}-2\right|\cdot\left|-2-\sqrt{5}\right|}-\left|\sqrt{3}-2\right|$.

D 13. Wykaż, że:

a) $\left|3\sqrt{5}-5\sqrt{2}\right|\cdot\left|5\sqrt{2}-3\sqrt{5}\right|+\left|35+30\sqrt{10}\right|=130$

b) $\left|0,75\cdot\log_3 81+\log_{\frac{1}{2}}128\right|-\log_5\left|2,8-27\frac{4}{5}\right|=2$

14. Zapisz w najprostszej postaci wyrażenie:

a) $8-|3-x|-|-2x-4|$, jeśli $x\in\langle -2, 3\rangle$

b) $|3a-1|\cdot|1-3b|-9|ab|-1$, jeśli $a<0$ i $b<0$

15. Rozwiąż algebraicznie równanie:

a) $|x-4|=5$ b) $|2-x|+1=0$ c) $|-x-3|=0$

16. Korzystając z odległości na osi liczbowej rozwiąż równanie:

a) $2|x+7|=6$ b) $|-x-4|=9$

17. Korzystając z odległości na osi liczbowej rozwiąż nierówność:

a) $|x-3|\geq 8$ b) $1-|x+13|>-4$

18. Rozwiąż graficznie:

a) równanie $2|x+5|=6$ b) nierówność $|x+2|\leq 5$

19. Rozwiąż algebraicznie nierówność:

a) $|2-x|>1$ b) $|x+5|\leq 0$

c) $|-x-1|>0$ d) $|-x-7|\geq -7$

20. Rozwiąż nierówność podwójną:

a) $\frac{3x-14}{4} \leq 1 \leq |x-3|$

b) $1 < |4+x| \leq 6$

21. Wyznacz zbiory $A \cup B$, $A \cap B$, $A - B$ oraz $B - A$ wiedząc, że:

A – zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność $8 - |x + 2| > 3$

B – zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność $|x - 1| - 2 \geq 0$

D 22. Wykaż, że jeśli x jest liczbą rzeczywistą ujemną, zaś y jest liczbą rzeczywistą dodatnią, to $|4x - 3| \cdot (y - x) - 3|x - y| + y^2 = (2x - y)^2$.

D 23. Wykaż, że jeśli x i y są liczbami rzeczywistymi ujemnymi, to

$$\frac{9|x^2 - y| - (3x - 2y)^2 + 4|y|^2}{3} = |3y| + 4|xy|$$

24. Rozwiąż:

a) równanie $\frac{|x-7|}{9} = \frac{|7-x|}{3}$

b) nierówność $8 - 6|-x - 1| - |x + 1| \geq 4 - 5|1 + x|$

3. Funkcja kwadratowa

Przypomnienie wiadomości o funkcji kwadratowej z klasy 1.

3.1. Zapisz podany wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej $f(x) = ax^2 + bx + c$. Następnie wypisz współczynniki a, b, c.

a) $f(x) = (x - 1)(2x + 3) - 4x$

b) $f(x) = 5 - 2(x + 4)^2$

c) $f(x) = -3\left[(x - 2)(2x + 3) + 6\right]$

d) $f(x) = (1 - 2x)^2 + 4(x - 1) + 3$

3.2. Napisz wzór funkcji kwadratowej $y = ax^2$ wiedząc, że do jej wykresu należy punkt:

a) $A\left(3\sqrt{2}, 12\right)$

b) $B(2, -4)$

c) $C\left(-2, 8\sqrt{5}\right)$.

3.3. Wyznacz współczynniki b, c we wzorze funkcji kwadratowej $f(x) = x^2 + bx + c$ wiedząc, że do wykresu funkcji f należą punkty:

a) $A(4, 9)$, $B(-3, -12)$

b) $A(-1, 6)$, $B(4, -4)$.

3.4. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, jeśli do wykresu tej funkcji należą punkty:

a) $A(-2, 9)$, $B(0, 4)$, $C(4, 6)$

b) $A(1, 6)$, $B(-2, -3)$, $C(0, 9)$.

3.5. Napisz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, której wykres otrzymamy przesuwając równolegle wykres funkcji:

a) $y = \frac{1}{3}x^2$ o 5 jednostek w lewo wzdłuż osi OX,

b) $y = -2x^2$ o 3 jednostki w prawo wzdłuż osi OX,

c) $y = \frac{2}{5}x^2$ o 4 jednostki w górę wzdłuż osi OY,

d) $y = -x^2$ o 2 jednostki w dół wzdłuż osi OY.

3.6. Napisz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, wiedząc, że jej wykres otrzymamy przesuwając równolegle wykres funkcji $y = -\frac{1}{4}x^2$:

a) o 2 jednostki w prawo wzdłuż osi OX i o 3 jednostki w dół wzdłuż osi OY,
b) o 1 jednostkę w lewo wzdłuż osi OX i o 5 jednostek w dół wzdłuż osi OY,
c) o 3 jednostki w lewo wzdłuż osi OX i o 4 jednostki w górę wzdłuż osi OY,
d) o 5 jednostek w prawo wzdłuż osi OX i o 2 jednostki w górę wzdłuż osi OY.

3.7. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej. Podaj współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji f oraz współrzędne punktu wspólnego paraboli i osi OY. Naszkicuj wykres tej funkcji.

a) $f(x) = -(x + 3)^2$ b) $f(x) = 2(x - 1)^2 + 1$ c) $f(x)=\frac{1}{2}x^2-4$

d) $f(x)=\frac{1}{2}(x+3)^2-2$ e) $f(x)=\frac{1}{4}(x-1)^2$ f) $f(x)=-\frac{1}{4}(x-2)^2-1$

3.8. Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. Podaj zbiór wartości funkcji f, maksymalne przedziały monotoniczności tej funkcji i równanie osi symetrii jej wykresu.

a) $f(x)=-\frac{1}{2}x^2+3$ b) $f(x) = x^2 - 5$ c) $f(x)=\frac{2}{3}(x+4)^2$

d) $f(x) = -2(x - 1)^2 + 7$ e) $f(x)=\frac{1}{4}(x+5)^2-3$ f) $f(x)=-\frac{1}{3}(x-2)^2-4$

3.9. Dany jest wierzchołek W paraboli, będącej wykresem funkcji kwadratowej f oraz punkt A należący do tej paraboli. Wyznacz wzór funkcji f w postaci kanonicznej, a następnie doprowadź go do postaci ogólnej.

a) $W(2, 0), A(5, -3)$ b) $W(3, 1), A(1, 2)$

c) $W(-1, 3), A(0, 1)$ d) $W\left(2\frac{1}{2}, -3\frac{1}{8}\right), A(5, 0)$

e) $W(-1, -1), A(2, -4)$ f) $W(-4, 0), A\left(-7, 1\frac{4}{5}\right)$

3.10. Wykres funkcji kwadratowej f jest symetryczny względem prostej $x + 3 = 0$ i przecina oś OY w punkcie o rzędnej 10. Podaj argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartość 10.

3.11. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej wiedząc, że zbiorem wartości tej funkcji jest przedział $(-\infty, 4\rangle$ oraz dla argumentów -2 i 8 funkcja przyjmuje tę samą wartość, równą -1.

3.12. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej wiedząc, że funkcja f jest rosnąca w przedziale $\langle -1, +\infty)$ i malejąca w przedziale $(-\infty, -1\rangle$, zbiorem wartości tej funkcji jest przedział $\langle -2, +\infty)$, a jej wykres przechodzi przez początek układu współrzędnych.

3.13. Funkcja kwadratowa f dla argumentu -3 przyjmuje najmniejszą wartość, równą 5. Wiedząc, że do wykresu tej funkcji należy punkt $A(-2, 10)$, wyznacz wzór funkcji f w postaci kanonicznej.

3.14. Funkcja kwadratowa f dla argumentu 2 przyjmuje największą wartość, równą 4. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej wiedząc, że jej wykres przecina oś OY w punkcie o rzędnej 1.

D 3.15. Dana jest funkcja kwadratowa $f(x) = x^2$, gdzie $x \in \boldsymbol{R}$. Wykaż, że dla każdej liczby całkowitej k:

a) różnica $f(k) - f(k-1)$ jest liczbą całkowitą nieparzystą

b) różnica $f(k+3) - f(k+1)$ jest liczbą podzielną przez 4.

Związek między wzorem funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, a wzorem funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej

3.16. Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. Sprowadź ten wzór do postaci ogólnej.

a) $f(x) = 4(x-3)^2 - 20$ b) $f(x) = \frac{1}{2}(x+4)^2 - 6$ c) $f(x) = -5(x-1)^2 + 1$

3.17. Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej. Sprowadź ten wzór do postaci kanonicznej, stosując wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy lub kwadrat różnicy.

a) $f(x) = x^2 - 2x$ b) $f(x) = -2x^2 + 6x + 1$ c) $f(x) = -x^2 + 2x + 8$

d) $f(x) = 3x^2 - 24x + 50$ e) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x + \frac{1}{2}$ f) $f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + 2x + 2$

3.18. Oblicz wyróżnik funkcji kwadratowej f, jeśli:

a) $f(x) = -3x^2 + 6x - 3$ b) $f(x) = -\frac{3}{4}x^2 - 7x$ c) $f(x) = (1-4x)(1+4x)$

d) $f(x) = 3(x-1)x + 1$ e) $f(x) = (3x-2)^2$ f) $f(x) = \frac{x^2 - 6(x-4)}{2}$

3.19. Oblicz współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f, stosując poznane wzory. Napisz wzór funkcji f w postaci kanonicznej.

a) $f(x) = 2x^2 + 3x$ b) $f(x) = x^2 - 4$ c) $f(x) = -x^2 + 10x - 25$

d) $f(x) = x^2 - 6x + 5$ e) $f(x) = 4x^2 - x + 1$ f) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2x - 3$

3.20. Prosta k jest osią symetrii paraboli, będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Oblicz współczynnik b we wzorze tej funkcji.

a) $f(x) = 4x^2 - bx + 2$, k: $x = 0$ b) $f(x) = -x^2 + bx + 12$, k: $x = 5$

c) $f(x) = \frac{1}{3}x^2 + bx - 1$, k: $x = -3$ d) $f(x) = -5x^2 + bx - 4$, k: $x = -\frac{1}{2}$

3.21. Dany jest wyróżnik funkcji kwadratowej $y = ax^2 + bx + c$ i wierzchołek W paraboli, będącej wykresem tej funkcji. Wyznacz współczynniki a, b, c.

a) $\Delta = 12$, $W(4, 3)$ b) $\Delta = -8$, $W\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ c) $\Delta = 120$, $W(0, -5)$

d) $\Delta = 36$, $W(-1, 3)$ e) $\Delta = -48$, $W(2, -3)$ f) $\Delta = -1$, $W\left(\frac{3}{10}, \frac{1}{20}\right)$

3.22. Oblicz współczynnik a we wzorze funkcji kwadratowej f oraz współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji f i osi OY.

a) $f(x) = a(x + 2)^2 - 7$, $\Delta = -84$ b) $f(x) = ax^2 - \sqrt{3}$, $\Delta = 24$

c) $f(x) = a(x - 3)^2 + 5$, $\Delta = -10$ d) $f(x) = a(4 - x)^2 - 2$, $\Delta = -8$

e) $f(x) = a(-5 - x)^2 - 1$, $\Delta = \frac{4}{5}$ f) $f(x) = a(-x - 1)^2 - 8$, $\Delta = 128$

3.23. Doprowadź wzór funkcji kwadratowej f do postaci kanonicznej. Podaj współrzędne punktu przecięcia paraboli będącej wykresem funkcji f z osią OY i współrzędne punktu A, symetrycznego do niego względem osi symetrii tej paraboli. Naszkicuj wykres funkcji f.

a) $f(x) = x^2 - 6x + 5$ b) $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 - 4x - 7$

c) $f(x) = 2x^2 - 8x + 9$ d) $f(x) = -\frac{1}{3}x^2 + \frac{8}{3}x - 6$

e) $f(x) = -2x^2 - 6x$ f) $f(x) = \frac{1}{4}x^2 + 2x + 1$

3.24. Wyznacz zbiór wartości funkcji kwadratowej f nie szkicując jej wykresu.

a) $f(x)=\frac{1}{2}x^2-10x+50$

b) $f(x)=-8x^2+7$

c) $f(x)=-\frac{1}{3}x^2+2x+3$

d) $f(x)=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}x$

3.25. Podaj maksymalne przedziały monotoniczności funkcji kwadratowej f nie szkicując jej wykresu.

a) $f(x)=\frac{2}{3}x^2-4x-4$

b) $f(x)=-\frac{1}{4}x^2+5x-25$

c) $f(x)=\frac{3}{4}x^2-9x$

d) $f(x)=-\frac{4}{5}x^2-12x+19$

3.26. Ile jest takich funkcji kwadratowych, których zbiorem wartości jest przedział $\langle -4, +\infty)$, wyróżnik jest równy 16, a wykres przecina oś OY w punkcie $A(0, 5)$?

a) Podaj wzory tych funkcji w postaci kanonicznej.

b) Naszkicuj wykresy tych funkcji w jednym układzie współrzędnych.

c) Podaj równanie prostej względem której wykresy tych funkcji są symetryczne.

Miejsce zerowe funkcji kwadratowej. Wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej

3.27. Dany jest wzór funkcji kwadratowej $y=a(x-p)^2+q$, $a\neq 0$. Podaj, na podstawie wartości a i q, liczbę miejsc zerowych tej funkcji.

a) $y=3(x-1)^2+4$

b) $y=-\frac{1}{2}(x+3)^2+5$

c) $y=(x+8)^2-2$

d) $y=\frac{1}{4}(x-4)^2+1$

e) $y=-(x+5)^2$

f) $y=-2(x+1)^2-6$

3.28. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej. Wyznacz miejsca zerowe tej funkcji, o ile istnieją.

a) $f(x)=-\frac{1}{2}x^2+4$

b) $f(x)=2(x-3)^2$

c) $f(x)=9x^2-81$

d) $f(x)=(x+2)^2-36$

e) $f(x)=(x-1)^2+5$

f) $f(x)=-2(x+1)^2+8$

3.29. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej. Wyznacz miejsca zerowe tej funkcji, o ile istnieją.

a) $f(x)=\frac{1}{2}(x+5)^2-8$ b) $f(x)=-\frac{3}{4}x^2+1$ c) $f(x)=3(x-7)^2-27$

d) $f(x)=100x^2-25$ e) $f(x)=(x+4)^2$ f) $f(x)=-2-2x^2$

3.30. Podaj miejsca zerowe funkcji:

a) $y=(x+2)(x-7)$ b) $y=3(2x-8)x$ c) $y=-4(x+5)^2$

d) $y=(x-8)\left(x\sqrt{3}+\sqrt{6}\right)$ e) $y=(2-2x)(x-3)$ f) $y=3\left(4-x+\sqrt{2}\right)^2$

3.31. Dany jest wzór funkcji kwadratowej. Wyznacz miejsca zerowe tej funkcji, o ile istnieją.

a) $y=4x^2-8x$ b) $y=20-4x^2$ c) $y=\frac{1}{2}x^2+12x$

d) $y=x^2+10x+25$ e) $y=\frac{4}{5}x^2+5$ f) $y=-x^2+2x-1$

3.32. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej f, o ile istnieją, jeśli:

a) $f(x)=9x^2+6x+1$ b) $f(x)=\frac{3}{4}x^2-3x$ c) $f(x)=(5x-4)^2$

d) $f(x)=-(x+1)^2-9$ e) $f(x)=\frac{1}{2}x^2+8x+32$ f) $f(x)=\frac{3}{4}x^2-3x+3$

3.33. Oceń na podstawie wartości wyróżnika, ile miejsc zerowych ma funkcja kwadratowa:

a) $y=-3x^2+9x+1$ b) $y=-2x^2-6x-7$ c) $y=9x^2+12x+4$

d) $y=2\sqrt{2}x^2-4x+\sqrt{2}$ e) $y=-2x^2-\sqrt{3}x-1$ f) $y=9x^2+x-16$

3.34. Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej. Oblicz wyróżnik i wyznacz miejsca zerowe tej funkcji, o ile istnieją.

a) $y=-2x^2-8x+10$ b) $y=3x^2+2x-1$ c) $y=-\frac{1}{2}x^2-4x-8$

d) $y=x^2+2x+6$ e) $y=\frac{1}{4}x^2+\frac{3}{2}x-4$ f) $y=-\frac{2}{3}x^2-\frac{4}{3}x+2$

3.35. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej. Oblicz wyróżnik i wyznacz miejsca zerowe tej funkcji, o ile istnieją.

a) $f(x) = -x^2 + 5x - 4$ b) $f(x) = 2x - 3x^2$ c) $f(x) = -4x^2 - 1$

d) $f(x) = 3x^2 + 7x + 4$ e) $f(x) = 0{,}5x^2 - 6x + 8$ f) $f(x) = 2x^2 - 10x + 3$

3.36. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f w postaci iloczynowej. Podaj wzór tej funkcji w postaci ogólnej.

a) $f(x) = -\frac{1}{4}(x-2)(x+10)$ b) $f(x) = 8x(x - 12)$

c) $f(x) = \frac{3}{5}(x+5)^2$ d) $f(x) = -5(x + 3)(x - 8)$

e) $f(x) = -2\left(x-\sqrt{3}\right)\left(x+\sqrt{3}\right)$ f) $f(x) = -(x - 4)(x - 4)$

3.37. Dany jest współczynnik a i miejsca zerowe funkcji kwadratowej. Zapisz wzór tej funkcji w postaci iloczynowej.

a) $a = \sqrt{2}$ $x_1 = -4$, $x_2 = \frac{1}{2}$ b) $a = -3$ $x_1 = -2$, $x_2 = 0$

c) $a = \frac{1}{3}$ $x_0 = 7$ d) $a = -\frac{1}{3}$ $x_1 = 4$, $x_2 = 8$

e) $a = 7$ $x_0 = -2$ f) $a = \frac{2}{3}$ $x_1 = 1 - \sqrt{2}$, $x_2 = 1 + \sqrt{2}$

3.38. Zapisz wzór funkcji kwadratowej f w postaci iloczynowej, o ile istnieje.

a) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 6x + 10$ b) $f(x) = \frac{2}{5}x^2 - 1{,}6x$

c) $f(x) = -2x^2 + 3x - 7$ d) $f(x) = -4x^2 + 40x - 36$

e) $f(x) = \frac{1}{8}x^2 - x + 2$ f) $f(x) = \frac{5}{7}x^2 - 2\frac{6}{7}x - 15$

3.39. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f w postaci iloczynowej. Oblicz współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji f.

a) $f(x) = -5(x - 6)(x + 4)$ b) $f(x) = \frac{1}{2}(x-8)(x+8)$

c) $f(x) = 4x(x + 10)$ d) $f(x) = -\frac{1}{3}(x-9)(x-3)$

3.40. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f w postaci iloczynowej. Podaj wzór funkcji f w postaci kanonicznej.

a) $f(x) = (x - 1)(x + 5)$

b) $f(x) = 2\sqrt{3}x(x + 4)$

c) $f(x) = 2\left(x - \sqrt{6}\right)^2$

d) $f(x) = -\frac{1}{2}(x + 6)(x - 6)$

e) $f(x) = \frac{3}{5}(x - 1)(x + 5)$

f) $f(x) = -\frac{2}{3}(x - 3)(x - 4)$

3.41. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej. Sprowadź wzór tej funkcji do postaci iloczynowej, o ile istnieje.

a) $f(x) = (x - 1)^2 - 4$ b) $f(x) = -1(x + 3)^2 + 9$ c) $f(x) = 4(x - 5)^2 - 16$

d) $f(x) = -9(x + 2)^2 + 36$ e) $f(x) = 2(x - 3)^2 + 4$ f) $f(x) = -\frac{1}{2}(x + 7)^2 - 1$

3.42. Na podstawie danych punktów wyróżnionych na wykresie funkcji kwadratowej f, wyznacz wzór tej funkcji w postaci iloczynowej. Następnie podaj jej wzór w postaci ogólnej i w postaci kanonicznej.

a)



b)



c)



d)



D 3.43. Wykaż, że dla dowolnej liczby a różnej od 0 i dowolnej liczby rzeczywistej c funkcja kwadratowa $f(x) = ax^2 + (a + c)x + c$ ma co najmniej jedno miejsce zerowe.

D 3.44. Wykaż, że jeśli suma wszystkich współczynników we wzorze funkcji $f(x) = ax^2 + bx + c$ jest równa zeru, to funkcja ma co najmniej jedno miejsce zerowe.

D 3.45. Wykaż, że jeśli $a \in \mathbf{R} - \{1\}$, to funkcja kwadratowa $f(x) = (a-1)x^2 + 2ax + a + 1$ ma dwa miejsca zerowe, z których jedno jest równe -1.

Szkicowanie wykresów funkcji kwadratowych. Odczytywanie własności funkcji kwadratowej na podstawie wykresu

3.46. Naszkicuj wykres funkcji kwadratowej f i omów własności tej funkcji poprzez odpowiedzi na następujące pytania:

1) Jaka jest dziedzina funkcji?
2) Jaki jest zbiór wartości funkcji ?
3) Czy funkcja f ma miejsce zerowe? Jeśli tak, to jakie?
4) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne?
5) W jakich przedziałach funkcja jest rosnąca, a w jakich malejąca?
6) Czy funkcja przyjmuje wartość największą, czy najmniejszą? Jeśli tak, to dla jakiego argumentu?

a) $f(x) = x^2 + 1$ b) $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 2$ c) $f(x) = 3x^2 - 6x$

d) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + 2\frac{1}{2}$ e) $f(x) = -x^2 + 2x - 2$ f) $f(x) = -x^2 - 6x - 9$

3.47. Naszkicuj wykres funkcji kwadratowej f i omów jej własności, jeśli:

a) $f(x) = 2(x-1)(x+1)$ b) $f(x) = -(x-1)(x-5)$

c) $f(x) = \frac{1}{4}x^2 + x + 1$ d) $f(x) = -\frac{1}{2}(x+1)^2 + 4{,}5$

e) $f(x) = \frac{1}{2}(x+1)^2 - 2$ f) $f(x) = -2x(x-2)$.

3.48. Naszkicuj we wspólnym układzie współrzędnych wykresy funkcji f i g. Następnie rozwiąż graficznie równanie $f(x) = g(x)$.

a) $f(x) = (x+2)^2$, $g(x) = 1$ b) $f(x) = -(x-1)^2 - 1$, $g(x) = -5$

c) $f(x) = \frac{1}{2}(x-4)(x+2)$, $g(x) = -x - 2$ d) $f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + x$, $g(x) = x - 1$

3.49. Naszkicuj we wspólnym układzie współrzędnych wykres funkcji kwadratowej f i wykres funkcji liniowej g. Następnie rozwiąż graficznie nierówność, podaną obok wzorów funkcji i g.

a) $f(x) = -x^2 - 6x - 9$, $g(x) = x + 1$, $f(x) \geq g(x)$

b) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 3$, $g(x) = -2x - 3$, $f(x) > g(x)$

c) $f(x) = \frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{2}x + 3\frac{1}{4}$, $g(x) = \frac{3}{4}x + 1\frac{1}{4}$, $f(x) < g(x)$

3.50. Naszkicuj we wspólnym układzie współrzędnych wykresy funkcji kwadratowych f i g. Następnie rozwiąż graficznie nierówność, podaną obok wzorów tych funkcji.

a) $f(x) = -x^2 - 4x$, $g(x) = x^2 + 2x + 4$, $g(x) \geq f(x)$

b) $f(x) = -\frac{1}{4}x^2 - x - 2$, $g(x) = x^2 + 4x + 3$, $f(x) < g(x)$

c) $f(x) = x^2 - 3x - 4$, $g(x) = x^2 + 3x - 4$, $f(x) \geq g(x)$

3.51. Ustal znaki współczynników a, b, c we wzorze funkcji kwadratowej $f(x) = ax^2 + bx + c$, na podstawie szkicu wykresu tej funkcji w układzie współrzędnych.

a) 

b) 

c) 

d) 

3.52. Naszkicuj wykres funkcji $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x, \text{ jeśli } x \in (-\infty, 3) \\ -x + 6, \text{ jeśli } x \in \langle 3, +\infty) \end{cases}$ i na jego podstawie:

a) wyznacz przedziały, w których funkcja f jest malejąca

b) podaj miejsca zerowe tej funkcji

c) odczytaj zbiór, w którym funkcja przyjmuje wartości ujemne.

3.53. Dana jest funkcja $f(x)=\begin{cases}-2x^2-8x-6, \text{ jeśli } x\in(-\infty, 0)\\ -6, \text{ jeśli } x\in\langle 0, +\infty)\end{cases}$.

a) Naszkicuj wykres funkcji f.

b) Podaj zbiór wartości funkcji f.

c) Oblicz wartość funkcji f dla argumentu -4.

d) Dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości nieujemne?

3.54. Naszkicuj wykres funkcji f i omów jej własności, jeśli:

a) $f(x)=\begin{cases}\frac{3}{4}x+2\frac{1}{4}, \text{ jeśli } x\in(-\infty, 1\rangle\\ x^2-6x+8, \text{ jeśli } x\in(1, +\infty)\end{cases}$

b) $f(x)=\begin{cases}-x+1, \text{ jeśli } x\in(-\infty, 2)\\ -\frac{1}{4}x^2+2x-4, \text{ jeśli } x\in\langle 2, 8\rangle\\ -4, \text{ jeśli } x\in(8, +\infty)\end{cases}$

c) $f(x)=\begin{cases}x^2+4x+5, \text{ jeśli } x\in(-\infty, 0\rangle\\ x^2-6x+5, \text{ jeśli } x\in(0, +\infty)\end{cases}$

d) $f(x)=\begin{cases}-x^2-10x-21, \text{ jeśli } x\in(-\infty, -4)\\ -\frac{3}{4}x, \text{ jeśli } x\in(-4, 0)\\ 0{,}75x^2-3x, \text{ jeśli } x\in\langle 0, +\infty)\end{cases}$

3.55. Dana jest funkcja $f(x)=\begin{cases}-x-3, \text{ jeśli } x\in(-\infty, -4)\\ -\frac{1}{2}x^2-2x+1, \text{ jeśli } x\in\langle -4, 2)\\ \frac{1}{5}x^2-\frac{4}{5}x-4\frac{1}{5}, \text{ jeśli } x\in\langle 2, +\infty)\end{cases}$.

a) Naszkicuj wykres funkcji f.

b) Podaj zbiór wartości tej funkcji.

c) Podaj przedziały monotoniczności funkcji f.

d) Określ znak iloczynu: $f(-2\pi)\cdot f(\sqrt{2}+1)$.

Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej na podstawie jej własności

3.56. Wyznacz współczynniki b i c we wzorze funkcji kwadratowej $f(x)=-\frac{1}{4}x^2+bx+c$ wiedząc, że funkcja f ma tylko jedno miejsce zerowe oraz $f(-4)=f(8)$.

3.57. Wyznacz współczynniki b i c we wzorze funkcji kwadratowej $f(x)=\frac{1}{3}x^2+bx+c$ wiedząc, że miejscami zerowymi funkcji f są liczby 9 oraz -6.

3.58. Funkcja kwadratowa $f(x)=-2x^2+bx+c$ jest rosnąca w przedziale $(-\infty, 1\rangle$ i malejąca w przedziale $\langle 1, +\infty)$. Wiedząc, że $f(-3)=-25$, oblicz współczynniki b i c.

3.59. Funkcja kwadratowa $f(x)=-\frac{1}{2}x^2+bx+c$ ma jedno miejsce zerowe, a jej wykres przecina oś OY w punkcie $P(0, -8)$. Wyznacz wartości współczynników b i c.

3.60. Osią symetrii paraboli, będącej wykresem funkcji kwadratowej $f(x)=3x^2+bx+c$, jest prosta o równaniu $x=-2$. Wiedząc, że najmniejsza wartość funkcji f jest równa -4, oblicz współczynniki b i c.

3.61. Napisz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że przyjmuje ona wartości dodatnie wtedy i tylko wtedy, gdy $x \in (-8, -2)$, a największa wartość tej funkcji jest równa $2\frac{1}{4}$.

3.62. Napisz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej jeśli wiadomo, że funkcja ta przyjmuje wartości ujemne wtedy i tylko wtedy, gdy $x \in (-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$, a do jej wykresu należy punkt $A(1, 12)$.

3.63. Napisz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że do wykresu tej funkcji należy punkt $P(-1, 1)$, zbiorem wartości funkcji f jest przedział $(-\infty, 4\rangle$, a maksymalny przedział, w którym funkcja f jest malejąca, to $\langle -2, +\infty)$.

3.64. Napisz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że dla argumentu 3 funkcja f przyjmuje najmniejszą wartość, równą -2, a jednym z miejsc zerowych tej funkcji jest liczba 1.

3.65. Funkcja kwadratowa f ma tylko jedno miejsce zerowe. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że prosta o równaniu $x - 5 = 0$ jest osią symetrii wykresu tej funkcji, a punkt $A\left(2, -1\frac{4}{5}\right)$ należy do tego wykresu.

3.66. Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f jest przedział $\langle -2, +\infty)$. Wykres funkcji f przecina oś OY w punkcie o rzędnej 30. Napisz wzór tej funkcji w postaci ogólnej wiedząc, że suma jej miejsc zerowych jest równa 16.

3.67. Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f jest przedział $(-\infty, 162\rangle$. Wykres funkcji f przecina oś OY w punkcie $B(0, 90)$, a osią symetrii tego wykresu jest prosta o równaniu $x = 6$. Napisz wzór funkcji f w postaci ogólnej.

3.68. Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej f jest liczba 4, a najmniejsza wartość tej funkcji jest równa –144,5. Napisz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że maksymalny przedział, w którym funkcja jest rosnąca to $\langle -13, +\infty)$.

3.69. Punkt $A(-6, 8)$ należy do wykresu tej funkcji kwadratowej f. Wyznacz wzór funkcji f w postaci ogólnej wiedząc, że $f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in \boldsymbol{R} - \{-2\}$.

3.70. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci iloczynowej wiedząc, że prosta o równaniu $y = 90$ przecina wykres tej funkcji w punktach o odciętych –5 oraz –1, zaś największa wartość tej funkcji jest równa 98.

3.71. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci iloczynowej wiedząc, że suma jej miejsc zerowych jest równa 3, zbiorem wartości funkcji f jest przedział $\left\langle -6\frac{3}{4}, +\infty \right)$, a wykres tej funkcji przecina oś OY w punkcie o rzędnej –6.

3.72. Funkcja kwadratowa f przyjmuje wartości nie większe od 18 wtedy i tylko wtedy, gdy $x \in (-\infty, 0\rangle \cup \langle 6, +\infty)$. Wyznacz wzór tej funkcji w postaci ogólnej wiedząc, że wierzchołek paraboli będącej wykresem tej funkcji należy do prostej o równaniu $y = 24$.

3.73. Funkcja kwadratowa $f(x) = ax^2 + bx + 12\frac{1}{2}$, $a \neq 0$, dla argumentu 3 przyjmuje najmniejszą wartość, równą 8. Wyznacz wartości współczynników a i b.

3.74. Średnia arytmetyczna miejsc zerowych funkcji kwadratowej $f(x) = ax^2 + bx$, $a \neq 0$, jest równa 3. Rzędna wierzchołka paraboli, będącej wykresem funkcji f, wynosi 36. Wyznacz wartości współczynników a i b.

3.75. Funkcja kwadratowa $f(x) = ax^2 + bx + c$ ma dwa miejsca zerowe 2 oraz 3. Wyznacz wartości współczynników a, b, c wiedząc, że ich suma jest równa -4.

Najmniejsza oraz największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym

3.76. Na poniższym rysunku przedstawiony jest wykres funkcji kwadratowej f. Odczytaj z wykresu najmniejszą oraz największą wartość funkcji f w podanym przedziale.

a) $\langle 1, 4 \rangle$



b) $\langle 3, 4 \rangle$



c) $\langle -4, -2 \rangle$



d) $\langle 0, 3 \rangle$



3.77. Naszkicuj wykres funkcji f. Odczytaj z wykresu najmniejszą oraz największą wartość funkcji f w podanym przedziale, jeśli:

a) $f(x) = -x^2 + 2x + 5$, $x \in \langle 0, 3 \rangle$

b) $f(x) = 1\frac{3}{4} + \left(x + 1\frac{1}{2}\right)^2$, $x \in \langle -1, 0 \rangle$

c) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 2$, $x \in \langle 2, 4 \rangle$

d) $f(x) = -\frac{1}{2}x(x+2)$, $x \in \langle -4, -2 \rangle$.

3.78. Nie szkicując wykresu funkcji kwadratowej, oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji f w podanym przedziale, jeśli:

a) $f(x)=-\frac{1}{3}x^2+2$, $x\in\langle 0, 3\rangle$

b) $f(x)=-\frac{3}{4}(x-1)^2+5$, $x\in\left\langle\frac{1}{2}, 2\right\rangle$

c) $f(x)=\frac{2}{3}x^2+4x+5$, $x\in\langle -2, -1\rangle$

d) $f(x)=\sqrt{3}(x-2)(x+8)$, $x\in\langle -2, 1\rangle$

e) $f(x)=\frac{1}{4}(x-5)(x+5)$, $x\in\langle -1, \sqrt{2}\rangle$

f) $f(x)=\frac{1}{5}(x-4)^2+9$, $x\in\left\langle\frac{1}{2}, 1\right\rangle$.

3.79. Funkcja kwadratowa f opisana jest wzorem $f(x) = -3x^2 - 12x + 96$.

a) Czy funkcja f ma wartość najmniejszą, czy największą? Ile ta wartość wynosi i dla jakiego argumentu jest przyjmowana?

b) Bez obliczania wartości funkcji uzasadnij, że $f\left(\sqrt{3}\right)<f\left(-\sqrt{3}\right)$.

c) Oblicz największą oraz najmniejszą wartość tej funkcji w przedziale $\langle -4, -3\rangle$.

3.80. Funkcja kwadratowa f ma następujące własności: $f(-3) = 0$ oraz $f(-1) = f(5) = 3$.

a) Czy funkcja kwadratowa ma wartość najmniejszą, czy największą? Dla jakiego argumentu ta wartość jest przyjmowana?

b) Podaj najmniejszą i największą wartość funkcji f w przedziale $\langle 5, 7\rangle$.

3.81. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że w przedziale $\langle 1, 2\rangle$ funkcja f przyjmuje największą wartość równą 5, a jej wykresem jest parabola o wierzchołku $W(3, 2)$.

3.82. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że funkcja f przyjmuje wartości ujemne wtedy i tylko wtedy, gdy $x \in (-2, 4)$, a największa wartość funkcji f w przedziale $\langle 3, 6\rangle$ jest równa 4.

3.83. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że jej zbiorem wartości jest przedział $(-\infty, 6\rangle$, największa wartość funkcji f w przedziale $\langle -7, -5\rangle$ jest równa 4, a osią symetrii wykresu tej funkcji jest prosta o równaniu $x + 3 = 0$.

3.84. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że jej miejscami zerowymi są liczby 1 i –3, a najmniejsza wartość funkcji f w przedziale $\langle -2, 0\rangle$ jest równa –8.

3.85. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że funkcja f ma tylko jedno miejsce zerowe, $f(2) = f(10)$ oraz największa wartość funkcji f w przedziale $\langle 8, 9\rangle$ jest równa -2.

3.86. Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej f jest liczba 2, a największa wartość funkcji f w przedziale $\langle 10, 12\rangle$ jest równa 10. Wyznacz wzór funkcji f w postaci ogólnej wiedząc, że jej wykres jest symetryczny względem prostej o równaniu $x = 5$.

3.87. Największa wartość funkcji kwadratowej f w przedziale $\langle -3, 0\rangle$ jest równa 4, a najmniejsza wartość w tym przedziale jest równa 1. Wyznacz wzór tej funkcji w postaci ogólnej wiedząc, że maksymalny przedział, w którym funkcja f jest rosnąca, to $(-\infty, -2\rangle$.

3.88. Największa wartość funkcji kwadratowej f w przedziale $\langle -5, -4\rangle$ jest równa -14. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że maksymalny przedział, w którym funkcja jest malejąca to $\langle -1, +\infty)$ oraz $f(1) = -4$.

3.89. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że w przedziale $\langle -5, -3\rangle$ funkcja f przyjmuje największą wartość, równą 3 oraz $f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in \boldsymbol{R} - \{-2\}$.

Badanie funkcji kwadratowej – zadania optymalizacyjne

3.90. Tor lotu piłki przedstawiony na rysunku obok, opisuje wzór: $h(x) = -0{,}25x^2 + 2x$, gdzie $x \in (0, 8)$. Na jaką maksymalną wysokość wzniosła się piłka?



3.91. Funkcja $f(x) = \dfrac{-x^2 + 6x + 21}{2}$ opisuje wydajność pracy robotnika w zależności od czasu pracy x, w ciągu 8-godzinnego dnia pracy. Robotnik rozpoczyna pracę o godzinie 7^{00}. O której godzinie jego wydajność jest największa?

3.92. Pewne ciało w czasie t [s] przebyło drogę S [m], którą opisuje wzór $S(t) = t^2 + 5t + 8$, gdzie $t \in \langle 1, 5\rangle$. Oblicz:

a) długość drogi przebytej przez to ciało w ciągu czterech sekund

b) średnią prędkość ciała.

3.93. Rzucono kamień z prędkością początkową 10 m/s pionowo do góry. Wysokość S [m], jaką osiągnie kamień po t sekundach, określona jest w przybliżeniu funkcją $S(t) = 10t - 5t^2$. Jaką maksymalną wysokość osiągnie ten kamień?

3.94. Liczbę 100 przedstaw w postaci sumy takich dwóch liczb, których suma kwadratów jest najmniejsza.

3.95. Liczbę 30 przedstaw w postaci różnicy takich dwóch liczb, aby suma ich kwadratów była najmniejsza.

3.96. Liczbę 18 przedstaw w postaci sumy dwóch takich składników, aby suma ich sześcianów była najmniejsza.

3.97. Większa część uczniów klasy liczącej 31 osób zachorowała na grypę. Zdrowi uczniowie postanowili wysłać chorym kolegom kartki z pozdrowieniami. Wiedząc, że każdy zdrowy uczeń wysłał do każdego chorego kolegi kartkę, oraz że liczba wysłanych kartek była największa z możliwych, oblicz ilu uczniów zachorowało na grypę.

3.98. Krótszy bok prostokąta o wymiarach 5 cm × 8 cm zwiększamy o x cm, a dłuższy bok zmniejszamy o x cm.

a) Wyznacz wzór funkcji opisującej pole nowego prostokąta w zależności od x; podaj dziedzinę tej funkcji.

b) Dla jakiej długości x pole otrzymanego prostokąta jest największe? Oblicz to pole.

3.99. Z prostokątnego arkusza tektury o wymiarach 20 cm × 30 cm odcięto w rogach kwadraty, których boki mają długość x cm. Następnie po zagięciu powstałych brzegów zbudowano prostopadłościenne (otwarte) pudełko, jak na rysunku poniżej.

a) Wyznacz wzór funkcji opisującej pole powierzchni bocznej tego pudełka w zależności od długości boku wyciętego kwadratu; podaj dziedzinę tej funkcji.

b) Dla jakiej długości x pole powierzchni bocznej pudełka jest największe z możliwych? Oblicz to pole.



3.100. Suma długości podstawy trójkąta i wysokości opuszczonej na tę podstawę wynosi 30 cm. Wyznacz długość podstawy tak, aby pole trójkąta było największe.

3.101. Właściciel gospodarstwa agroturystycznego chce wygrodzić w ogrodzie prostokątny plac zabaw dla dzieci. Dysponuje płotem długości 84 m, a powierzchnia placu ma być możliwie największa. Wyznacz wymiary tego placu zabaw i oblicz jego powierzchnię (w arach).

3.102. Gospodarz chce siatką o długości 12 m wygrodzić na podwórku prostokątny wybieg dla psa, przylegający jednym bokiem do budynku. Jakie wymiary powinien mieć ten wybieg, aby jego pole powierzchni było największe? Oblicz powierzchnię tego największego wybiegu.



3.103. Strona książki ma obwód 68 cm. Oblicz, jakie wymiary powinna mieć strona tej książki, aby zapewnić maksymalną powierzchnię druku, jeśli założymy, że marginesy boczne i dolny będą jednocentymetrowe, zaś margines górny – dwucentymetrowy.

3.104. Z kawałka płótna w kształcie trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych długości 2 m i 1,5 m hafciarka chce wyciąć prostokątną serwetkę w sposób przedstawiony na rysunku obok. Jakie powinny być wymiary serwetki, aby jej pole było największe?



3.105. Z kawałka płótna w kształcie trójkąta równoramiennego o podstawie 4 m i wysokości opuszczonej na tę podstawę równej 3 m hafciarka chce wyciąć prostokątny obrus w sposób przedstawiony na rysunku obok. Jakie powinny być wymiary obrusa, aby jego powierzchnia była największa?



3.106. Na bokach kwadratu o polu 16 cm^2 zaznaczamy punkty K, L, M, N tak, że $|AK| = |DL| = |CM| = |BN|$, jak na rysunku obok.

a) Oznacz literą x długość odcinków AK, DL, CM oraz BN. Napisz wzór funkcji pola czworokąta $KLMN$ w zależności od x. Określ dziedzinę tej funkcji.

b) Jak należy wybrać punkty K, L, M, N, aby pole czworokąta $KLMN$ było najmniejsze?



3.107. Właściciel sklepu kupuje aparaty fotograficzne, płacąc producentowi 1200 zł za sztukę. Następnie sprzedaje miesięcznie 40 sztuk takich aparatów

po 1800 zł za sztukę. Sprzedawca oszacował, że każda obniżka ceny aparatu o 10 zł w jego sklepie zwiększy liczbę sprzedanych aparatów o jedną sztukę. Jaką powinien ustalić cenę, aby jego miesięczny zysk był największy?

3.108. Firma ma 180 lokali użytkowych i zajmuje się wynajmem tych lokali na działalność usługową. Obecnie wszystkie lokale są wynajęte, a miesięczna opłata za wynajem każdego lokalu wynosi 1200 zł. Firma postanowiła zoptymalizować swój miesięczny zysk i wprowadzić podwyżkę. W tym celu oszacowano, że każda podwyżka ceny o 40 zł spowoduje zmniejszenie o 5 liczby wynajmowanych pomieszczeń. Jaką miesięczną cenę wynajmu każdego lokalu powinna ustalić ta firma, aby jej zysk był największy? Ile wynosi ten największy miesięczny zysk?

3.109. Hotel ma 60 pokoi. Opłata za dobę hotelową w każdym pokoju wynosi 320 zł. Właściciel hotelu udziela specjalnej zniżki firmom rezerwującym więcej niż 30 pokoi. Wówczas dobowa opłata za każdy wynajęty pokój jest niższa o 4 złote pomnożone przez liczbę pokoi, które firma rezerwuje ponad liczbę 30.

a) Jaka liczba rezerwowanych przez daną firmę pokoi dawałaby hotelowi największy przychód na dobę?

b) Przy jakiej liczbie wynajętych pokoi właściciel hotelu osiągnie największy zysk, jeśli uwzględni koszt sprzątania i obsługi każdego pokoju, równy 24 złote za dobę?

3.110. Drut długości 2 m trzeba podzielić na dwa kawałki: z jednego powstanie kwadratowa ramka, a z drugiego ramka prostokątna, której długości boków pozostają w stosunku 1 : 3. Jaką długość powinien mieć każdy z tych kawałków drutu, aby suma pól kwadratu i prostokąta była najmniejsza?

Równania kwadratowe

3.111. Rozwiąż równanie:

a) $(x+2)^2=0$ b) $4x^2-7x=0$ c) $3x^2+8=0$

d) $4x^2-12x+9=0$ e) $3x^2-6=0$ f) $(x+3)(x-7)=0$

3.112. Rozwiąż równanie:

a) $81x^2=25$ b) $1-4x^2=0$ c) $\frac{1}{2}(x^2+2)=7$

d) $(x-3)^2=25$ e) $2(x+1)^2=18$ f) $(x-13)^2+1=0$

3.113. Rozwiąż równanie:

a) $2x^2+5x-12=0$ b) $3x^2-7x=20$ c) $9x^2=12x-4$

d) $2(x^2+4)=-3x$ e) $49x^2=4x$ f) $16x^2+25=40x$

3.114. Rozwiąż równanie:

a) $3x^2 + 5x = 2$ b) $5x = 2x^2 + 3$ c) $4x - x^2 = 7$

d) $6(x^2 + 2) = 4(3 - x)$ e) $5x^2 = 2 - 9x$ f) $(2x + 3)^2 = 8x + 8$

3.115. Rozwiąż równanie:

a) $(2x + 6)(5 - x) = 0$ b) $5x(x + 2) - 3x = 0$

c) $x(x - 1) + 3(x - 1) = 0$ d) $(x + 1)^2 - 100 = 0$

e) $4 - (x + 3)^2 = 0$ f) $x(x + 2) = x + 2$

3.116. Rozwiąż równanie:

a) $x(x + 5) = x + 5$ b) $(x + 1)^2 = (x + 1)$

c) $x^2 = (4 - x)(x + 4)$ d) $x(2x - 1) = (1 - 2x)(1 + 2x)$

e) $81 - (3x + 7)^2 = 0$ f) $(2x + 1)(2x + 1) = 4$

3.117. Rozwiąż równanie:

a) $(x + 1)(2x - 3) + (x + 1)x = 0$ b) $(3x - 1)(3x + 1) = 10x^2 + 3$

c) $(5x + 1)^2 = (7x - 2)^2$ d) $(2x - 7)^2 = (4x - 1)^2$

e) $(3x - 1)(4x - 3) = (3x - 1)(2x - 1)$ f) $(2x - 1)^2 - 3x^2 = 6(x - 4)$

3.118. Rozwiąż równanie:

a) $x^2 - (3x - 1)^2 = 56x - 43$ b) $11 - 14x = (2x + 1)^2$

c) $(-2x - 1)(1 + 2x) = 8$ d) $2x^2 + 11x + 21 = (-x + 5)(5 + x)$

e) $(2x - 3)(x + 1) = 1 + (x + 2)(3x - 2)$ f) $(3x - 1)^2 - (2x - 3)^2 + 2(x + 6) = x^2$

3.119. Rozwiąż równanie:

a) $(2x - 3)(2x + 3) = (x + 5)^2 - 9$

b) $2x(x - 3) - (x + 1)(x + 2) = (2x - 3)^2$

c) $(2x - 1)^2 - (4x + 1)(4x - 1) = 4x(1 - 2x)$

d) $(2x + 1)^2 - 9(x - 1)^2 = 4 - x$

e) $(x - 1)^2 + 2(x - 3)^2 = 18 - 10x$

f) $(2x + 5)^2 - (2x - 5)^2 = 3x^2 + 41x - 4$

3.120. Rozwiąż równanie:

a) $8x - 2x(3x - 1) = 2x^2 + 3$ b) $x^2 - 5x + 9 = 63 - (x - 3)(x + 3)$

c) $(2x - 4)(2x + 4) = (3x - 1)^2 - 16$ d) $6 - (1 - x)^2 = (2x - 3)^2 - (3x + 2)^2$

e) $(x^2 - 3x + 1)(x + 2) = x^3 - 2x - 1$ f) $(2x - 3)(3x + 5) = (3 - 2x)(x + 3)$

3.121. Rozwiąż równanie:

a) $(2x + 5)^2 - x(x + 20) = 0$

b) $x(4 - x) = (2x + 3)(x - 2) + 8$

c) $8x(7 - 3x) + 1 = 4(2 - x)(x + 2)$

d) $(4 - x)^2 - (2 + x)^2 = x^2 + 12$

e) $(2x - 1)(2x + 1) + 2 = 9x - 5x(x + 3)$

f) $(x - 6)(6 + x) = (4x + 3)^2 - (2 - x)^2$

3.122. Rozwiąż równanie:

a) $\frac{(x-2)(2-x)}{2} - \frac{x^2-3x}{4} = -2+3x-x^2$

b) $\frac{(3-x)(x+3)}{3} - \frac{(x+2)^2-4}{6} = \frac{5\frac{1}{3}-x}{2}$

c) $\frac{(2x-3)(x+1)}{5} - \frac{(x-1)(x+1)}{2} = x+3$

d) $\frac{(3x-1)^2-4}{3} - \frac{10}{3}x^2 - \frac{5+(2-x)(x+2)}{2} = -x-7$

3.123. Rozwiązaniem danego równania z niewiadomą x jest liczba podana obok tego równania. Oblicz a.

a) $5 + (a^2 - 18)x + 6x^2 = 0;\ 2\frac{1}{2}$

b) $15x^2 + (a^2 + 2a - 2)x = 6;\ -\frac{2}{3}$

3.124. Rozwiąż graficznie równanie:

a) $x^2 + x = 6$

b) $x = (2 - x)^2$

c) $\frac{1}{2}x^2+2=-\frac{1}{2}(x-2)^2+4$

d) $x^2+5x+6=4\frac{1}{4}-\left(x+2\frac{1}{2}\right)^2$

Równania prowadzące do równań kwadratowych

3.125. Rozwiąż równanie:

a) $x^4 = 16x^2$

b) $x^4 - 10x^2 + 25 = 0$

c) $x^4 = 3 - 2x^2$

d) $x^4 + 12x^2 + 35 = 0$

e) $4x^4 + 9 = 37x^2$

f) $x^4 + 2x^2 = 24$.

3.126. Rozwiąż równanie:

a) $x^4 = 5x^2 - 4$

b) $x^4 + 5x^2 = 14$

c) $x^4 - 25x^2 + 144 = 0$

d) $x^4 - 25x^2 = 0$

e) $x^2(x^2 + 8) + 15 = 0$

f) $4x^4 + 3(3x^2 - 1) = -2x^2$.

3.127. Rozwiąż równanie:

a) $4x^2(x^2-2)-2=5(x-1)(x+1)$
b) $(x^2+1)^2=3+x^2-5x^4$
c) $x^2(2x-1)(2x+1)=2-x^2(x^2+10)$
d) $(x^2-x+3)(x^2+2x)=x(6+x^2)$
e) $(x^2-3)^2-24=2x^4-14x^2$
f) $3(x^4+3)=(x^2-1)^2+12x^2$.

3.128. Rozwiąż równanie:

a) $x^4-18x^2=(x^2-9)(2x^2+3)+23$
b) $(x^2+6)(7-x^2)-36=x^4+12x^2$
c) $(2x^2-1)^2-(2x^2+3)^2=x^4+56$
d) $(x^2-1)^2-4(x^2-1)+4=0$
e) $(2x^2+3)(2x^2-3)+10=5x^4$
f) $(x^2-1)^2-(9x^2-4)=5-7x^2$.

3.129. Rozwiąż równanie:

a) $(x^2-4)^2=9(x^2-4)$
b) $(x^2+3)^2-5(x^2+3)+4=0$
c) $(x^2+2x)^2+9=6x^2+12x$
d) $(x^2-8x)^2+5=2(x^2-8x)$
e) $(x^2-x)^2=20x^2-20x$
f) $(x^2+3x-1)^2+7(x^2+3x-1)=-12$.

Nierówności kwadratowe

3.130. Rozwiąż nierówność:

a) $2x^2+1>0$
b) $\frac{x^2}{4}\leq 0$
c) $-3x^2+2x\geq 0$
d) $x^2-25>0$
e) $-x^2-4>0$
f) $x^2\geq x$

3.131. Rozwiąż nierówność:

a) $-3\cdot(x-2)(x+4)>0$
b) $9x^2+1>6x$
c) $x<6x^2$
d) $(2x-1)(2x-1)\geq 0$
e) $x^2+4>x$
f) $(5-x)(x+2)\geq 0$

3.132. Rozwiąż nierówność:

a) $(x-3)^2-4>0$
b) $4x^2-2x\geq 5x^2$
c) $(1+x)(3-2x)\leq 0$
d) $x(x+6)\geq 6x-8$
e) $x^2-3(x-3)<9-3x$
f) $4x(x-1)\leq -1$

3.133. Rozwiąż nierówność:

a) $-4x^2<1$
b) $-2x(5-x)\leq 0$
c) $28x\geq 4x^2+49$
d) $x^2<2-x$
e) $3x^2+1>2{,}5x$
f) $x-7\geq 5x^2$

3.134. Rozwiąż nierówność:

a) $\frac{1}{2}x^2-x\geq 1$
b) $(2x-1)^2>16$
c) $9+25x^2\leq 30x$
d) $(5x+1)^2+4<0$
e) $9x^2+4(3x+1)>0$
f) $9-(2x-1)^2\geq 0$

3.135. Rozwiąż nierówność:

a) $8x - 1 > 16x^2$ b) $2x^2 + 4 \geq 3x$ c) $(2 - x)(x + 3) \leq 0$

d) $(2x - 5)^2 \leq 0$ e) $-1 < -(1 - x)^2$ f) $25x^2 > 4(5x - 1)$

3.136. Rozwiąż nierówność:

a) $(x - 3)(2x + 5) \leq (2x - 6)(2x - 1)$ b) $(2 - 8x)(x + 1) > (1 - 4x)(x + 2)$

c) $(3 - 5x)(2x + 1) < (2x + 1)(3x + 2)$ d) $(2 - 6x)(3x + 9) \geq x^2 - 9$

e) $(x + 5)^2 \geq (2x + 10)^2$ f) $(2x - 3)^2 < (x - 1{,}5)^2$

3.137. Rozwiąż nierówność:

a) $x(x + 6) \leq 3(4x - 3)$ b) $-2x^2 + 5(x + 1) < 2(x + 2) - 3x(x - 1)$

c) $2x(x - 2) - 7 > -4(x + 3)$ d) $8(x - 2) - x(x - 2) \geq -16$

e) $9(1 - x) \geq x^2 - 10x + 3$ f) $1 - 2x(x - 3) < x(5 - 4x)$

3.138. Rozwiąż nierówność:

a) $(3 - 2x)(2x + 3) > 1 - 2x(x + 3)$ b) $(2x - 3)^2 > (x + 2)^2$

c) $x^2 + 6x + 9 \geq (2x - 1)^2$ d) $(2x - 1)(5x + 3) + 13 \leq (3x - 1)^2 + x$

e) $(-x - 5)(5 + x) + 9x \leq 2(x - 1)^2$ f) $2(x - 4)(x + 4) > 3x(2x + 3)$

3.139. Rozwiąż nierówność:

a) $\frac{(x-1)^2-2}{5} - \frac{x+3}{2} > \frac{(x+2)^2-43}{10}$

b) $\frac{(x+3)(2x-1)-(x+2)^2}{3} \leq \frac{x-1}{2} - \frac{3x+2}{3}$

c) $\frac{x-\frac{x^2-4}{2}}{5} \geq \frac{3-\frac{(x+2)^2}{4}}{2} + \frac{1}{8}$

d) $\frac{x^2-2x+3}{3} - \frac{x^2+4}{24} < \frac{(x-1)^2-\frac{x-4}{2}}{3}$

3.140. Rozwiąż graficznie nierówność:

a) $x^2 - 6x + 9 \leq -x + 5$ b) $-x^2 - 1 < -x - 3$ c) $x^2 + 2x - 3 \geq -2x - 3$

d) $x - 8 < x^2 + x - 6$ e) $x^2 + 2x - 3 \leq \frac{1}{5}(x-1)^2$ f) $\frac{1}{9}x(6-x) < (x-3)^2 + 1$

3.141. Podaj przykład nierówności kwadratowej:
a) sprzecznej
b) której zbiorem rozwiązań jest suma przedziałów $(-\infty, -1\rangle \cup \langle 4, +\infty)$
c) której zbiorem rozwiązań jest zbiór $\boldsymbol{R}$
d) której zbiór rozwiązań jest jednoelementowy
e) której zbiorem rozwiązań jest przedział liczbowy $(2, 7)$
f) której zbiorem rozwiązań jest zbiór $\boldsymbol{R} - \{-5\}$.

3.142. Dana jest nierówność kwadratowa $(3x - 4)(2x + a) < 0$ z niewiadomą x. Wyznacz liczbę a, dla której zbiorem rozwiązań tej nierówności jest przedział $\left(1\frac{1}{3}, 4\right)$.

3.143. Dana jest nierówność kwadratowa $(5a - 4x)(x - 1) \geq 0$ z niewiadomą x. Wyznacz liczbę a, dla której zbiorem rozwiązań tej nierówności jest przedział $\langle -3, 1\rangle$.

3.144. Dana jest nierówność kwadratowa $(2x - 3)(6x + 5a) \leq 0$ z niewiadomą x. Wyznacz liczbę a, dla której jedynym rozwiązaniem nierówności jest liczba $1\frac{1}{2}$.

3.145. Wyznacz zbiory A, B, $A \cap B$, $A \cup B$ oraz $B - A$, jeśli:
A – zbiór tych argumentów, dla których funkcja kwadratowa $f(x) = x^2 - 6x + 5$ przyjmuje wartości nieujemne
B – zbiór tych argumentów, dla których funkcja kwadratowa $g(x) = x^2 + 3x$ przyjmuje wartości większe od 4.

3.146. Dane są zbiory:
$A = \{x: x \in \boldsymbol{R} \wedge x^2 \leq 4x\}$; $B = \{x: x \in \boldsymbol{Z} \wedge x^2 - 7x + 4 \geq 3x^2 - 5x\}$.
Wyznacz zbiory: A, B, $A \cup B$, $A \cap B$.

3.147. Wyznacz dziedzinę funkcji f określonej wzorem:

a) $f(x) = \sqrt{2x^2 + x + 8}$

b) $f(x) = \sqrt{4x - 2x^2}$

c) $f(x) = \sqrt{3x^2 + 9x - 12}$

d) $f(x) = \sqrt{-4x^2 + 4x - 1}$

e) $f(x) = \dfrac{5x + 7}{\sqrt{4 - (x+1)^2}}$

f) $f(x) = \dfrac{2x^2 - 3}{\sqrt{25x^2 - 40x + 16}}$.

3.148. Wyznacz wszystkie wartości m, $m \in \boldsymbol{R}$, dla których liczba x należy do podanego przedziału liczbowego, jeśli:

a) $x = m^2 - 4m$, $x \in \langle 5, +\infty)$
b) $x = 5 + 2m - 2m^2$, $x \in (-\infty, -7)$
c) $x = m^2 - 3m$, $x \in (-2, 4)$
d) $x = m^2 + 5m + 1$, $x \in \langle -5, -3 \rangle$

3.149. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, $m \in \boldsymbol{R}$, dla których dziedziną funkcji f jest zbiór liczb rzeczywistych, jeśli:

a) $f(x)=\sqrt{2x^2-mx+2}$
b) $f(x)=\sqrt{3x^2+mx-m-3}$
c) $f(x)=\dfrac{x-3}{\sqrt{x^2+(m-1)x+4}}$
d) $f(x)=\dfrac{x^2+1}{\sqrt{x^2+(m+2)x+m^2}}$.

Zadania prowadzące do równań i nierówności kwadratowych

3.150. Suma kwadratów dwóch liczb różniących się o 4 jest równa 400. Wyznacz te liczby.

3.151. Suma kwadratów trzech kolejnych liczb parzystych jest równa 308. Wyznacz te liczby.

3.152. Suma kwadratów trzech kolejnych liczb nieparzystych wynosi 155. Wyznacz te liczby.

3.153. W liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest o 2 większa od cyfry setek, zaś cyfra jedności o 1 mniejsza od cyfry dziesiątek. Kwadrat cyfry dziesiątek jest równy sumie kwadratów pozostałych cyfr. Wyznacz tę liczbę.

3.154. Suma cyfr pewnej liczby dwucyfrowej jest równa 5. Jeśli tę liczbę pomnożymy przez liczbę dwucyfrową o takich samych cyfrach, ale zapisanych w odwrotnej kolejności, to otrzymamy 736. Wyznacz tę liczbę.

3.155. W trzycyfrowej liczbie naturalnej cyfra setek jest taka sama jak cyfra jedności, zaś cyfra dziesiątek jest o 3 większa od cyfry jedności. Jeżeli tę liczbę zmniejszymy o kwadrat sumy jej cyfr, to otrzymamy 105. Wyznacz tę liczbę trzycyfrową.

3.156. Ile boków ma wielokąt wypukły, w którym liczba przekątnych jest o 117 większa od liczby jego boków?

3.157. Na płaszczyźnie zaznaczono n punktów, z których dowolne trzy nie są współliniowe. Następnie połączono te punkty odcinkami. Ile jest tych punktów, jeśli wyznaczyły one 15 odcinków?

3.158. Do turnieju siatkówki zgłosiły się reprezentacje klas pierwszych pewnego liceum. Klasy rozegrały każda z każdą po jednym meczu. Wszystkich meczów rozegrano 10. Ile klas brało udział w tym turnieju?

3.159. Na jednym z osiedli mieszkaniowych znajduje się rabata kwiatowa w kształcie trójkąta prostokątnego, którego przyprostokątne różnią się o 7 m. Powierzchnia rabaty wynosi 30 m^2. Ile metrów płotka potrzeba na ogrodzenie tej rabaty?

3.160. Robotnik przeciął blachę w kształcie trójkąta prostokątnego wzdłuż wysokości poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego na przeciwprostokątną, dzieląc ją na dwa trójkąty prostokątne. Wspólna przyprostokątna powstałych trójkątów ma długość 1,2 m, zaś drugie przyprostokątne różnią się o 70 cm. Oblicz powierzchnię kawałków blach po rozcięciu.

3.161. Prostokątny obraz bez ramy ma wymiary 82 cm × 36 cm, a wraz z ramą zajmuje powierzchnię 3567 cm^2. Oblicz, jaką szerokość ma rama tego obrazu.

3.162. Park miejski ma kształt rombu, którego obwód wynosi 2 km. Dwie główne alejki spacerowe wyznaczone są przez przekątne rombu, a jedna z nich jest o 200 m dłuższa od drugiej. Oblicz długość tych alejek.

3.163. W pewnym prostokącie jeden z boków skrócono, a drugi wydłużono o p% tak, że pole prostokąta zmniejszyło się o 9%. Oblicz p.

3.164. Drut długości 64 cm podzielono na dwa kawałki. Z jednego kawałka wykonano kwadratową ramkę, a z drugiego ramkę prostokątną, której stosunek długości boków jest równy 3 : 1. Oblicz długości kawałków drutu, wiedząc, że suma powierzchni wyznaczonych przez obie ramki wynosi 112 cm^2.

3.165. Kupiec ma dwie beczki wina dwóch różnych szczepów. Stosunek liczby litrów wina z pierwszej beczki do liczby litrów wina z drugiej beczki jest równy 3 : 2. Litr wina z pierwszej beczki kosztuje tyle złotych, ile jest równe 25% liczby litrów wina, znajdującego się w drugiej beczce. Litr wina z drugiej beczki jest o 10 zł droższy od litra wina z pierwszej beczki. Wiedząc, że łączna wartość win w obu beczkach jest równa 4800 zł, oblicz:

a) ile litrów wina jest w każdej beczce

b) cenę jednego litra każdego z tych win.

3.166. Pewna osoba zapytana, ile ma lat, odpowiedziała: „Jeżeli całkowitą liczbę moich lat pomnożymy przez liczbę o 50 mniejszą i do otrzymanego iloczynu dodamy 624, to otrzymamy liczbę ujemną". Czy na tej podstawie można ustalić, ile lat ma ta osoba?

3.167. Jak dobrać wymiary prostokąta, aby jego pole było nie mniejsze niż 5 nie większe niż 12, a długości boków były liczbami naturalnymi, różniącymi się o 4? Podaj wszystkie możliwości.

3.168. Proste o równaniach $y=\frac{1}{2}x+a+1$ oraz $x = a$, gdzie a jest liczbą rzeczywistą dodatnią, przecinają się w punkcie M i wraz z osiami układu współrzędnych ograniczają trapez prostokątny (zobacz rysunek obok).



a) Napisz wzór funkcji P – określającej pole tego trapezu w zależności od a, gdzie $a \in (0, +\infty)$.

b) Wyznacz liczbę a, dla której pole trapezu jest równe 3.

c) Wyznacz wszystkie wartości a, dla których pole trapezu jest większe od 24 i jednocześnie nie większe od 51.

3.169. Wyznacz wszystkie dwucyfrowe liczby naturalne o sumie cyfr równej 9, które spełniają warunek: iloczyn liczby i jej cyfry jedności jest większy od 144.

3.170. Ile jest wielokątów wypukłych, w których liczba przekątnych jest mniejsza od potrojonej liczby jego boków?

3.171. Przez działkę w kształcie prostokąta o wymiarach 20 m × 40 m ma przebiegać ścieżka w sposób pokazany na rysunku. Powierzchnia ścieżki może stanowić co najwyżej 9,75% całej powierzchni działki. Jaką największą wartość może przyjąć x?



3.172. W kwadrat $ABCD$ o boku 7 cm wpisano kwadrat $MNPR$ tak, że punkty M, N, P, R należą odpowiednio do boków AB, BC, DC oraz AD. Wiedząc, że pole kwadratu $MNPR$ jest równe 25 cm^2, oblicz długości odcinków, na jakie punkty M, N, P, R podzieliły boki kwadratu $ABCD$.



3.173. Obwód trójkąta prostokątnego jest równy 30, a suma kwadratów długości wszystkich boków trójkąta wynosi 338. Wyznacz wysokość poprowadzoną na przeciwprostokątną.

Test sprawdzający do rozdziału 3.

1. Wykresem funkcji kwadratowej $y = 2x^2 - 3$ jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych:

A. $(2, -3)$ B. $(-3, 0)$ C. $(1, -3)$ D. $(0, -3)$

2. Osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej $y = -\frac{1}{4}x^2 + 3x - 8$ jest prosta o równaniu:

A. $x = 6$ B. $y = -6$ C. $x = 1{,}5$ D. $y = 6$

3. Funkcja kwadratowa $y = -2x(x - 8)$ jest rosnąca w przedziale:

A. $\langle 4, +\infty)$ B. $(-\infty, 8\rangle$ C. $(-\infty, 4\rangle$ D. $\langle 8, +\infty)$

4. Wykres funkcji $y = 9 - 2(x + 1)^2$ przecina oś OY w punkcie o rzędnej:

A. 11 B. 10 C. 7 D. 2

5. Wskaż zbiór rozwiązań nierówności $(3 - x)(x + 2) \geq x + 2$.

A. $(-\infty, 2\rangle$ B. $\langle -2, 2\rangle$ C. $\langle -2, +\infty)$ D. $\langle -2, 3\rangle$

6. Suma miejsc zerowych funkcji $y = (x - 1)^2 - 16$ jest równa:

A. 2 B. 8 C. –2 D. –8

7. Najmniejsza wartość funkcji kwadratowej $y = 3(x-2)(x+6)$ jest równa:

A. -48 B. -36 C. -30 D. -12

8. Funkcja kwadratowa f ma dwa miejsca zerowe: $\sqrt{2}$ oraz $-2\sqrt{2}$. Wówczas iloraz $\frac{f(1)}{f(2)}$ jest równy:

A. $\frac{1}{2}-3\sqrt{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$ C. $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ D. $\frac{1}{2}-\frac{3}{4}\sqrt{2}$.

9. Średnia arytmetyczna miejsc zerowych funkcji kwadratowej $y = 2x^2 + bx + c$ jest równa 1, a zbiorem wartości tej funkcji jest przedział $\langle 10, +\infty)$. Zatem:

A. $b + c = 8$ B. $b + c = -8$ C. $b + c = 16$ D. $b + c = -16$

10. Wykres funkcji $y = -x^2 - 5x$ przesunięto równolegle wzdłuż osi OX o 2 jednostki w prawo i otrzymano wykres funkcji f. Zatem funkcję f opisuje wzór:

A. $f(x) = -x^2 - x + 6$ B. $f(x) = -x^2 - x - 14$

C. $f(x) = -x^2 - 9x - 14$ D. $f(x) = -x^2 - x - 4$.

11. Wyróżnik funkcji kwadratowej jest równy 16, a współrzędne wierzchołka wykresu tej funkcji wynoszą $(-1, 4)$. Wskaż miejsca zerowe tej funkcji.

A. -1 i 4 B. 1 i -3 C. -1 i 3 D. 1 i -4

12. Jedynym miejscem zerowym funkcji kwadratowej $f(x) = ax^2 + bx + c$ jest liczba 2, a do wykresu tej funkcji należy punkt $P(-1, 18)$. Zatem współczynnik a we wzorze funkcji f jest równy:

A. $-\frac{1}{2}$ B. 2 C. -2 D. $\frac{1}{2}$

Zadania powtórzeniowe do rozdziału 3.

13. Rozwiąż równania:

a) $-2(x + 10)^2 = 0$ b) $\frac{x\cdot(x-1)}{2} = \frac{x+3}{5}$

c) $(2x^2 - 3)(2x^2 + 3) = 5x^2$ d) $(x^2 - 3x)^2 = 4(x^2 - 3x)$

14. Rozwiąż nierówność:

a) $7-2(x-2)^2 \geq 5x$

b) $2x^2+9 \leq 6\sqrt{2}x$

c) $3x(3x-4) < 4(4-3x)$

d) $\dfrac{x-\dfrac{x^2+2x}{3}}{2} < x+2$

15. Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej $y = 2x^2 - 4x + 5$ w przedziale $\langle -2, 3 \rangle$.

16. Dany jest wzór funkcji kwadratowej $f(x) = -0{,}5x^2 + x + 4$.

a) Napisz wzór funkcji f w postaci kanonicznej.

b) Wyznacz miejsca zerowe funkcji f.

c) Rozwiąż graficznie równanie $f(x) = x + 2$.

17. Wykresem funkcji kwadratowej $f(x) = ax^2 - 6x + c$ jest parabola, której wierzchołek ma współrzędne $(-1, 0)$.

a) Oblicz a i c.

b) Podaj zbiór wartości funkcji, opisanej wzorem $y = 8 - f(x)$.

c) Wyznacz zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości większe, niż funkcja $g(x) = -2x - 2$.

18. Funkcja kwadratowa f ma dwa miejsca zerowe: -3 i 1. Wykres funkcji f przecina oś OY w punkcie o rzędnej $-1\frac{1}{2}$.

a) Wyznacz wzór funkcji f w postaci iloczynowej.

b) Podaj maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f.

c) Jakie miejsca zerowe ma funkcja $y = f(-x) + 1\frac{1}{2}$?

19. Funkcja kwadratowa $f(x) = ax^2 + bx + c$, gdzie $a \neq 0$, przyjmuje wartości ujemne wtedy i tylko wtedy, gdy $x \in (-\infty, -6) \cup (-2, +\infty)$. Największa wartość funkcji f jest równa 1.

a) Podaj równanie osi symetrii wykresu funkcji f.

b) Oblicz a, b, c.

c) Napisz w postaci ogólnej wzór funkcji g, której wykres otrzymamy, przesuwając równolegle wykres funkcji f o 3 jednostki w lewo i 4 jednostki do góry.

20. Ojciec i córka mają razem 100 lat. 15 lat temu iloczyn liczby lat córki i ojca był równy 1029. Ile lat ma obecnie ojciec, a ile córka?

21. Suma cyfr liczby trzycyfrowej wynosi 8, zaś suma kwadratów jej cyfr jest równa 30. Jeśli w liczbie zamienimy cyfry skrajne, to otrzymana liczba będzie o 396 większa od początkowej. Wyznacz tę liczbę trzycyfrową.

22. Na spotkaniu towarzyskim każdy uczestnik spotkania przywitał się z każdym z pozostałych uczestników uściskiem dłoni. Ile co najmniej osób brało udział w tym spotkaniu, jeżeli wymieniono więcej niż 45 uścisków dłoni?

23. Długości przekątnych rombu wyrażają się liczbami pierwszymi, różniącymi się o 2. Wiedząc, że pole tego rombu jest mniejsze od $17\frac{1}{2}$, oblicz jego obwód.

24. W małym zakładzie krawieckim są szyte koszulki, które sprzedaje się do hurtowni po 86 zł za sztukę. Związek między kosztem produkcji $K(x)$, a liczbą x uszytych koszulek w ciągu dnia wyraża wzór $K(x) = 4x^2 - 2x + 84$. Zakład może uszyć dziennie maksymalnie 18 koszulek.

a) Oblicz, ile co najmniej koszulek dziennie powinien szyć ten zakład, aby osiągnął zysk z ich sprzedaży.

b) Oblicz, ile koszulek dziennie powinien szyć ten zakład, aby jego dzienny zysk był największy. Jaka jest wartość największego dziennego zysku?

25. Drut długości 2 m trzeba podzielić na dwa kawałki: z jednego powstanie ramka kwadratowa, a z drugiego ramka prostokątna, której długości boków pozostają w stosunku 2 : 3. Jaką długość powinien mieć każdy z tych kawałków drutu, aby suma pól kwadratu i prostokąta była najmniejsza?

D 26. Wykaż, że jeśli wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji $y = -\frac{1}{2}x^2 + 2bx - 8$ znajduje się w układzie współrzędnych pod osią OX, to $b \in (-2, 2)$.

D 27. Wykaż, że jeśli zbiór wartości funkcji kwadratowej $y = -x^2 + 2kx - 3$ jest przedziałem $(-\infty, 1\rangle$, to $k = -2$ lub $k = 2$.

D 28. Wykaż, że jeśli $a - 2b = 3$, to $a^2 + b^2 \geq \frac{9}{5}$.

D 29. Wykaż, że równanie $2x^2 - (k + 1)x + 2 = 0$ ma rozwiązanie tylko wtedy, gdy $k \in (-\infty, -5\rangle \cup \langle 3, +\infty)$.

D 30. Wykaż, że nierówność $2x^2 + (k + 3)x + 8 > 0$ jest spełniona przez każdą liczbę rzeczywistą x tylko wtedy, gdy $k \in (-11, 5)$.

4. Geometria płaska – okręgi i koła

Powtórzenie wiadomości z geometrii z klasy 1.

4.1. Wyznacz miary dwóch kątów przyległych, jeśli jeden z nich jest cztery razy większy od drugiego.

4.2. Punkt O jest punktem przecięcia dwusiecznych kątów CAB i ABC w trójkącie ABC. Wyznacz miarę kąta wklęsłego AOB, jeśli:

a) $|\sphericalangle BAC| + |\sphericalangle ABC| = 130°$ b) $|\sphericalangle ACB| = 100°$.

4.3. W trójkącie ABC poprowadzono dwusieczne kątów przy wierzchołkach A i B. Kąt rozwarty przecięcia się tych dwusiecznych jest równy 137°. Oblicz miarę kąta ACB.



4.4. Na rysunku obok zaznaczone są kąty zewnętrzne trójkąta α, β, γ. Wiedząc że $\alpha + \gamma = 217°$, oblicz β.



4.5. Dany jest trójkąt ABC oraz prosta k, równoległa do podstawy AB i przechodząca przez wierzchołek C. Na podstawie danych na rysunku poniżej, wyznacz kąty trójkąta ABC.

a)



b)



4.6. Dany jest kąt ostry BAC, $|\sphericalangle BAC| = 39°$, oraz punkt P, leżący na zewnątrz tego kąta. Z punktu P poprowadzono dwie proste: jedną równoległą do ramienia AB, a drugą prostopadłą do ramienia AC. Oblicz miarę kąta ostrego przecięcia się tych prostych.

D 4.7. Wykaż, że w dowolnym trapezie dwusieczne kątów przy tym samym ramieniu są do siebie prostopadłe.

D 4.8. Korzystając z danych na rysunku poniżej wykaż, że czworokąt $ABCD$ jest trapezem.

a)



b)



4.9. Na rysunkach poniżej proste a i b są równoległe. Oblicz x.

a)



b)



c)



d)



e)



f)



4.10. Proste AB i A_1B_1 przecinają się w punkcie O. Proste te przecięto prostymi równoległymi AA_1, BB_1 i CC_1 – jak na rysunku obok.



Oblicz:

a) $|CC_1|$, jeśli $|C_1O| = 4$ cm, $|OA| = 3$ cm, $|AA_1| = 2$ cm

b) $|OC_1|$, jeśli $|OA_1| = 1{,}8$ dm, $|AC_1| = 11{,}2$ dm, $|OC| = 5{,}4$ dm

c) $|OB|$, jeśli $|CC_1| = 4$ dm, $|BB_1| = 56$ cm, $|C_1B| = 12$ dm

d) $|CA_1|$, jeśli $|AA_1| = 2$ cm, $|BB_1| = 5$ cm, $|A_1B_1| = 4{,}5$ cm, $|CC_1| = 4$ cm.

4.11. Czy na rysunku poniżej proste a i b są równoległe? Odpowiedź uzasadnij.

a)



b)



c)



d)



4.12. Wyznacz wszystkie liczby a, $a > 0$, dla których istnieje trójkąt o bokach mających długość:

a) a, 4, $8 - a$ b) a, $a + 3$, $a + 6$ c) $2a$, 7, $11 - a$

4.13. Dwa boki trójkąta mają długość 4 i 9. Długość c trzeciego boku wyraża się liczbą pierwszą.

a) Oblicz c. Podaj wszystkie możliwe rozwiązania.

D b) Wykaż, że dla każdej liczby c, znalezionej w punkcie a) trójkąt jest rozwartokątny.

4.14. Na podstawie danych na rysunku poniżej, oblicz długość podstawy AB trójkąta ABC.

a)



b)



4.15. Długości boków trójkąta ABC pozostają w stosunku 2 : 3 : 4. Środki boków tego trójkąta wyznaczają trójkąt, którego obwód jest równy 13,5 cm. Oblicz długości boków trójkąta ABC.

4.16. Punkty D, E, F dzielą bok AC trójkąta ABC na cztery odcinki równej długości. Przez punkty D, E, F poprowadzono odcinki równoległe do boku AB, których drugi koniec należy do boku BC. Wiedząc, że najkrótszy z tych odcinków jest krótszy od kolejnego odcinka o 7 cm, oblicz długość boku AB i długości równoległych odcinków.



4.17. W trójkącie równoramiennym ABC kąt ACB jest równy 68°. Na prostej AB zaznaczono punkty D i E w taki sposób, że $|DA| = |AC|$ oraz $|BC| = |BE|$. Oblicz kąty trójkąta CDE.



D 4.18. Punkt D leży na przedłużeniu boku AB trójkąta ABC poza punkt B. Z punktu D poprowadzono prostą prostopadłą do boku AC, która przecięła bok BC w punkcie E. Wykaż, że jeśli $|BD| = |BE|$, to trójkąt ABC jest równoramienny



4.19. Wysokość trójkąta równobocznego jest o 2 krótsza od boku.

a) Oblicz długość boku tego trójkąta. Wynik przedstaw w postaci $a + b\sqrt{c}$, gdzie a, b, $c \in \mathbf{N}_+$.

b) Jaki obwód ma trójkąt, którego wierzchołkami są środki boków danego trójkąta?

4.20. W trójkącie prostokątnym równoramiennym najkrótsza wysokość ma długość 2 cm.

a) Oblicz długości boków tego trójkąta.

c) Punkt M należy do przeciwprostokątnej tego trójkąta i dzieli ją w stosunku 1 : 3. Oblicz odległości punktu M od przyprostokątnych.

4.21. Kąty α, β, γ trójkąta różnią się kolejno o 30°.

D a) Wykaż, że trójkąt jest prostokątny.

b) Oblicz obwód tego trójkąta wiedząc, że różnica długości najdłuższego i najkrótszego boku tego trójkąta jest równa 4 cm. Wynik zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku.

4.22. Boki trójkąta mają długość: 20 cm, 16 cm, 12 cm.

D a) Wykaż, że trójkąt jest prostokątny.

b) Oblicz sumę długości wszystkich wysokości tego trójkąta.

4.23. Stosunek długości krótszych boków trójkąta prostokątnego jest równy 3 : 4. Wiedząc, że obwód tego trójkąta wynosi 36 cm, oblicz:

a) długości boków tego trójkąta,

b) długość środkowej trójkąta, poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego.

4.24. Boki trójkąta mają długość 21 cm, 17 cm, 10 cm.

a) Sprawdź, czy trójkąt jest ostrokątny, prostokątny czy rozwartokątny.

b) Oblicz długości trzech wysokości tego trójkąta.

4.25. W trójkącie ABC boki mają długość: $|AB| = 18$ cm, $|BC| = |AC| = 15$ cm. Oblicz:

a) wysokość CD tego trójkąta,

b) długość środkowej AE,

c) długość odcinka DE.

4.26. Oblicz długości odcinków, na jakie środek ciężkości trójkąta dzieli środkową tego trójkąta poprowadzoną na podstawę, jeśli:

a) trójkąt jest równoboczny, a jego obwód jest równy 18,

b) trójkąt jest prostokątny równoramienny, a jego ramiona mają długość 3.

4.27. Boki trójkąta mają długość: 9 cm, 12 cm, 15 cm. Oblicz odległość środka ciężkości tego trójkąta:

a) od dwóch jego krótszych boków,

b) od wierzchołków tego trójkąta.

4.28. Oblicz długości środkowych trójkąta, którego boki mają długość: 16 cm, 17 cm, 17 cm.

D **4.29.** W trójkącie ABC poprowadzono środkową AD. Punkt E jest środkiem odcinka AD. Półprosta $\overrightarrow{CE}$ przecina bok AB w punkcie P. Wykaż, że $|PB| = 2|AP|$.

D **4.30.** W trójkącie ABC poprowadzono środkową AD. Wykaż, że jeśli suma miar kątów DAC i ACB jest równa mierze kąta ADC, to trójkąt DBP jest równoramienny.

D 4.31. Trójkąt ABC jest równoboczny, a jego bok ma długość a, $a > 1$. Punkt D należy do boku AC oraz $|AD| = 1$. Na przedłużeniu boku BC poza punkt C leży punkt P. Wykaż, że jeśli $|CP| = 1$, to trójkąt DBP jest równoramienny.

4.32. Boki trójkąta ABC mają długość: 8 cm, 10 cm, 12 cm. Trójkąt $A_1B_1C_1$ jest podobny do trójkąta ABC w skali $\frac{1}{3}$. Oblicz obwód trójkąta $A_1B_1C_1$.

4.33. Trójkąt $A_1B_1C_1$ jest podobny do trójkąta ABC w skali 1,25. O ile procent obwód trójkąta ABC jest mniejszy od obwodu trójkąta $A_1B_1C_1$?

4.34. Boki trójkąta ABC mają długość: $|BC| = a$, $|AC| = b$, $|AB| = c$. Trójkąt $A_1B_1C_1$ jest podobny do trójkąta ABC, a jego boki mają odpowiednio długość: $|B_1C_1| = a + 4$, $|A_1C_1| = b + 6$, $|A_1B_1| = c + 8$.

D a) Wykaż, że $a : b : c = 2 : 3 : 4$.

b) Wiedząc dodatkowo, że obwód trójkąta ABC jest równy 27 cm, oblicz skalę podobieństwa trójkąta $A_1B_1C_1$ do trójkąta ABC.

4.35. Boki trapezu $ABCD$, $AB \| DC$, mają długość: $|AB| = 21$ cm, $|BC| = 8$ cm, $|DC| = 14$ cm, $|AD| = 5$ cm. Proste AD i BC przecinają się w punkcie P. Oblicz obwód trójkąta ABP.

4.36. Podstawy trapezu mają długość 4 cm i 12 cm, a jego przekątne mają długość 10 cm oraz 8 cm. Oblicz długości odcinków, na jakie punkt przecięcia przekątnych dzieli te przekątne.

4.37. W trójkącie równoramiennym boki mają długość: 18 cm, 15 cm, 15 cm.

a) Oblicz odległości środka wysokości poprowadzonej na podstawę od boków tego trójkąta.

b) Jaka jest odległość spodka tej wysokości od ramion trójkąta?

4.38. Najkrótsza wysokość trójkąta prostokątnego jest równa 8 cm, a najdłuższa wynosi $13\frac{1}{3}$ cm. Oblicz obwód tego trójkąta.

4.39. Wysokość trójkąta prostokątnego poprowadzona na przeciwprostokątną dzieli ją na odcinki, których długości pozostają w stosunku 9 : 16. Wiedząc, że obwód trójkąta jest równy 30 cm, oblicz długości przyprostokątnych.

4.40. W trójkącie ABC, w którym $|\sphericalangle ACB| = 90^\circ$ oraz $|AC| < |BC|$, zaznaczono środek ciężkości S i spodek D wysokości CD.

D a) Wykaż, że jeśli $|AD| = 3$ oraz $|BD| = 6$, to odcinek DS jest równoległy do boku AC, a jego długość jest równa $\sqrt{3}$.

b) Czy odcinek DS byłby równoległy do boku AC, gdyby $|AD| = 1$ oraz $|DB| = 4$? Odpowiedź uzasadnij.

Okrąg. Położenie prostej i okręgu

4.41. Naszkicuj okrąg i zaznacz na nim punkty A, B i C.

a) Ile cięciw i ile łuków wyznaczają te punkty? Wskaż te cięciwy i łuki.

b) Ile cięciw i ile łuków wyznaczają cztery punkty położone na okręgu?

4.42. W kole poprowadzono średnicę AB i cięciwę AC. Wiedząc, że $BC \perp AC$ i $|BC| = 7$ cm, oblicz odległość cięciwy AC od środka koła.

4.43. Odcinek AB jest cięciwą okręgu o promieniu 25 cm. Wiedząc, że $|AB| = 48$ cm, oblicz odległość tej cięciwy od środka okręgu.

4.44. Promień okręgu jest równy 17 cm. Oblicz długość cięciwy tego okręgu, która znajduje się w odległości 8 cm od środka okręgu.

4.45. Cięciwa CD okręgu jest równoległa do średnicy AB, a odległość między nimi jest równa 5 cm. Wiedząc że różnica długości tych cięciw jest równa 2 cm, oblicz długość tego okręgu.

4.46. Cięciwa CD okręgu jest prostopadła do średnicy AB i przecina ją w punkcie P w stosunku 9 : 1. Wiedząc, że odległość punktu P od środka okręgu jest równa 4 cm, oblicz:

a) długość okręgu

b) długość cięciwy CD.

4.47. Wyraź w procentach (z dokładnością do 1%), jaką część okręgu stanowi łuk okręgu o promieniu r, jeśli długość łuku jest równa d.

a) $r = 3$ cm, $d = \pi$ cm

b) $r = 5$ cm, $d = 20$ cm

c) $r = \pi$ cm, $d = \pi^2$ cm

d) $r = 0{,}25\pi$ dm, $d = 6$ cm

e) $r = \sqrt{3}$ dm, $d = \sqrt{12}\pi$ dm

f) $r = 0{,}4$ m, $d = \sqrt{5}\pi$ dm

4.48. Dany jest promień r okręgu o i odległość d środka okręgu o od prostej k. Ustal położenie prostej k oraz okręgu o.

a) $r = 3$, $d = 2\sqrt{3}$

b) $r = \pi$, $d = 9^{0,5}$

c) $r = 7$, $d = \sqrt{4^2 + 3^2}$

d) $r = \log_2 8$, $d = 3$

4.49. Wskaż na rysunku obok trzy pary odcinków równej długości wiedząc, że proste AC, EC, BD są styczne do okręgu odpowiednio w punktach A, E, F.



4.50. Proste AE, AD i BC są styczne do okręgu. Wiedząc, że $|AD| = 17$ cm, oblicz obwód trójkąta ABC.



4.51. Okrąg na rysunku obok jest styczny do wszystkich boków trójkąta ABC, w którym $|AC| = |BC|$, odpowiednio w punktach D, E, F. Wiedząc, że $|AB| = 15$ cm oraz $|BC| = 19{,}5$ cm, oblicz długość odcinka FC.



4.52. Miara kąta utworzonego przez dwa promienie okręgu jest równa α. Pod jakim kątem widać ten okrąg z punktu przecięcia stycznych do okręgu, poprowadzonych z końców tych promieni, jeśli:

a) $\alpha = 45°$ b) $\alpha = 60°$ c) $\alpha = 100°$ d) $\alpha = 141°$?

4.53. Z punktu A poprowadzono dwie styczne do okręgu o środku O i promieniu 3 cm. Odcinek AO ma długość 9 cm i przecina okrąg w punkcie P. Oblicz odległość punktu P od tych stycznych.

D 4.54. Z punktu A poprowadzono dwie styczne do okręgu o środku O i promieniu r. Półprosta $AO^{\rightarrow}$ przecina okrąg w dwóch punktach P i Q. Wykaż, że jeśli odległość punktu Q od poprowadzonych stycznych jest dwa razy większa niż odległość punktu P od tych stycznych, to $r = \frac{1}{2}|AP|$.

4.55. Do danego okręgu poprowadzono styczną tak, że końce A, B średnicy tego okręgu są odległe od stycznej o 25 cm i o 15 cm. Oblicz promień tego okręgu.

4.56. Dany jest okrąg o promieniu r i prosta, której odległość od środka okręgu jest równa d. Zbadaj położenie prostej k i okręgu o w zależności od a.

a) $r = 4$, $d = a - 3$
b) $r = a$, $d = 8 - a$
c) $r = -a$, $d = 6 + a$
d) $r = a - 1$, $d = a + 1$

Wzajemne położenie dwóch okręgów

4.57. Określ wzajemne położenie okręgów $o\,(A, r_1)$ i $o\,(B, r_2)$, jeśli $|AB| = 8$ oraz:

a) $r_1 = 1$, $r_2 = 9$
b) $r_1 = 3$, $r_2 = 5$
c) $r_1 = \sqrt{5}$, $r_2 = 3\sqrt{5}$
d) $r_1 = 5$, $r_2 = 13$
e) $r_1 = \sqrt{8}$, $r_2 = 11$
f) $r_1 = 4 - \sqrt{5}$, $r_2 = 4 + \sqrt{2}$

4.58. Dwa okręgi są styczne zewnętrznie. Odległość między ich środkami wynosi 12 cm. Wyznacz promienie tych okręgów, wiedząc, że:

a) jeden z nich jest o 2 cm dłuższy od drugiego,
b) jeden z nich jest trzy razy krótszy od drugiego.

4.59. Dwa okręgi są styczne wewnętrznie. Odległość między ich środkami jest równa 3 cm. Wyznacz promienie tych okręgów, jeśli:

a) jeden z nich jest dwa razy krótszy od drugiego,
b) suma długości promieni jest równa 17 cm.

4.60. Wyznacz promienie okręgów wiedząc że, gdyby te okręgi były styczne zewnętrznie, to odległość między ich środkami byłaby równa 15 cm; a gdyby te okręgi były styczne wewnętrznie, to odległość między ich środkami byłaby równa 3 cm. Wyznacz promienie tych okręgów.

4.61. Trzy okręgi o promieniu r są styczne zewnętrznie, każdy do dwóch pozostałych. Wyznacz długości boków i miary kątów trójkąta, utworzonego przez punkty styczności.

4.62. Dwa okręgi $o(A, r_1)$ i $o(B, r_2)$ są styczne zewnętrznie do siebie i oba są styczne wewnętrznie do okręgu $o(C, r_3)$. Obwód trójkąta ABC wynosi 25 cm. Oblicz r_3.

4.63. Dane są dwa okręgi współśrodkowe. Cięciwa większego okręgu jest styczna do mniejszego okręgu, a jej długość jest równa 30 cm. Oblicz promienie tych okręgów wiedząc, że różnią się o 9 cm.

4.64. Dane są dwa okręgi $o(A, r_1)$, $o(B, r_2)$ takie, że:

a) $r_1 = 2, r_2 = 3, |AB| = k$

b) $r_1 = k, r_2 = k - 1, |AB| = 5$

c) $r_1 = 3, r_2 = 2k, |AB| = 4$

d) $r_1 = 5 - k, r_2 = k + 1, |AB| = 2.$

Określ położenie okręgów w zależności od wartości parametru k.

4.65. Dane są dwa okręgi $o(A, 3)$ oraz $o(B, m - 4)$. Odległość między ich środkami jest równa 7. Wyznacz wszystkie wartości m, dla których te okręgi mają:

a) jeden punkt wspólny

b) dwa punkty wspólne.

4.66. Odległość między środkami dwóch okręgów jest równa 9, a promienie tych okręgów są równe: $5 - a$ oraz $2a$. Wyznacz wszystkie wartości a, dla których oba okręgi mają co najmniej jeden punkt wspólny.

Koła i kąty

4.67. Dany jest okrąg o środku w punkcie O. Korzystając z danych na rysunku, wyznacz miarę kąta α.

a)



b)



c)



d)



e)



f)



4.68. Dany jest okrąg o środku w punkcie O i prosta k styczna do tego okręgu. Korzystając z danych na rysunku, wyznacz miarę kąta α.

a)



b)



c)



d)



4.69. Dany jest okręg o środku w punkcie O. Korzystając z danych na rysunku, wyznacz miary kątów trójkąta ABC.

a)



b)



c)



4.70. Dany jest okrąg o środku w punkcie O. Korzystając z danych na rysunku, oblicz α.

a)



b)



c)



4.71. Oblicz miarę kąta środkowego, opartego na łuku okręgu o promieniu r, jeśli długość tego łuku jest równa d.

a) $r = 2$, $d = \pi$ b) $r = 3$, $d = 2\pi$ c) $r = 4$, $d = 5\pi$

d) $r = 5$, $d = 3\pi$ e) $r = 6$, $d = 6$ f) $r = 8$, $d = 40$

4.72. Dany jest okrąg o środku w punkcie O i promieniu r. Oblicz długość łuku, na którym jest oparty kąt środkowy α w tym okręgu, jeśli:

a) $r = 15$, $\alpha = 72°$ b) $r = 10$, $\alpha = 216°$ c) $r = 4$, $\alpha = 135°$

d) $r = 28$, $\alpha = 30°$ e) $r = 13$, $\alpha = 270°$

4.73. Punkty $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7, P_8, P_9$ należą do okręgu i dzielą okrąg w danej kolejności na dziewięć łuków równej długości. Oblicz:

a) $|\sphericalangle P_6P_3P_5|$ b) $|\sphericalangle P_8P_5P_3|$

c) $|\sphericalangle P_7P_9P_1|$ d) $|\sphericalangle P_2P_3P_4|$.



4.74. W okręgu o promieniu r kreślimy średnicę AB oraz taką cięciwę AC, że $|AC| = r$. Jaką częścią okręgu jest łuk CAB?

4.75. Punkty A, B, C należą do okręgu. Wiedząc, że kąty trójkąta ABC są równe: $|\sphericalangle A| = 30°$, $|\sphericalangle B| = 45°$, $|\sphericalangle C| = 105°$, oblicz stosunek długości łuków, na jakie punkty A, B, C podzieliły okrąg.

4.76. Punkty A, B, C dzielą okrąg na trzy łuki, których stosunek długości wynosi $5 : 6 : 7$. Oblicz miary kątów trójkąta ABC.

D 4.77. Cięciwy AB i CD są różnymi średnicami jednego okręgu. Wykaż, że czworokąt $ABCD$ jest prostokątem.

D 4.78. Wewnątrz równoległoboku narysowano dwa półokręgi: średnicą jednego jest krótszy bok, a średnicą drugiego – dłuższy bok równoległoboku. Wykaż, że punkt przecięcia tych półokręgów różny od wierzchołka równoległoboku należy do jednej z przekątnych tego równoległoboku.

D 4.79. Dwa okręgi przecinają się w punktach P i Q. Poprowadzono średnicę PA w pierwszym okręgu oraz średnicę PB w drugim okręgu. Wykaż, ze punkty A, Q, B są współliniowe.

D 4.80. Cięciwa CD okręgu jest równoległa do średnicy AB. Wykaż, że różnica miar kątów ACD i CDA jest równa $90°$.

D 4.81. Na rysunku obok dany jest okrąg o środku w punkcie O oraz kąty środkowe: α i β. Wykaż, że jeśli $\alpha = 80°$ i $\beta = 50°$, to $OC \| AB$.



Twierdzenie o stycznej i siecznej

4.82. Z punktu P poprowadzono styczną do okręgu w punkcie A oraz sieczną, przecinającą okrąg w punktach B i C, jak na rysunku obok. Wiedząc, że $|PB| = 1$ cm oraz $|BC| = 8$ cm, oblicz $|PA|$.



4.83. Przez punkt P poprowadzono styczną do okręgu w punkcie A i sieczną, przecinającą ten okrąg kolejno w punktach B i C. Wiedząc, że $|PA| = 8$ cm oraz $|PB| = 4$ cm, oblicz długość cięciwy BC.

4.84. Przez punkt P leżący w odległości 11 cm od środka okręgu, poprowadzono sieczną, która przecięła ten okrąg kolejno w punktach A i B. Wiedząc, że $|PA| = |AB| = 6$ cm, oblicz promień tego okręgu.

4.85. W okręgu poprowadzono dwie cięciwy AB i CD, które przecięły się w punkcie P. Wiedząc, że $|AP| = 10$ cm, $|BP| = 4$ cm oraz $|PD| = 2{,}5$ cm, oblicz $|CP|$.

4.86. Punkt P przecięcia cięciw AB i CD okręgu dzieli cięciwę AB na odcinki długości 8 cm i 3 cm. Wiedząc, że $|CP| : |PD| = 3 : 2$, oblicz długość cięciwy CD.

4.87. Z punktu P poprowadzono styczną do okręgu w punkcie A i dwie sieczne: jedna zawiera średnicę okręgu i przecina okrąg kolejno w punktach B i C; druga przecina okrąg kolejno w punktach D i E. Wiedząc, że $|AP| = 24$, $|PB| = 18$ oraz $|PD| : |DE| = 3 : 1$, oblicz:

a) promień okręgu,

b) długość odcinka PE.

D 4.88. Punkty A, B, C należą do okręgu. Styczna do okręgu w punkcie A przecina półprostą $\overrightarrow{CB}$ w punkcie P. Wykaż, że jeśli $|PB| : |BC| = 1 : 3$, to $|PA| : |PC| = 1 : 2$.

D 4.89. Punkty A, B, C należą do okręgu. Styczna do okręgu w punkcie A przecina półprostą $\overrightarrow{CB}$ w punkcie P. Wykaż, że jeśli $|PA| : |PC| = 3 : 5$, to $|PB| : |BC| = 9 : 16$.

4.90. Na rysunku obok punkty A, B, C należą do okręgu oraz $|AB| = |AC|$. Średnica AD zawiera wysokość AE trójkąta ABC. Wiedząc, że $|AE| = 12$ cm oraz $|ED| = 3$ cm, oblicz długości boków tego trójkąta.



4.91. Na rysunku obok boki AB i BC trójkąta ABC są styczne do okręgu o środku w punkcie O, odpowiednio w punktach D i E. Odległość punktu C od punktu O jest równa 5. Okrąg przecina bok AC kolejno w punktach P i Q. Wiedząc, że $|PQ| = |PC| = 2\sqrt{2}$, oblicz:

a) promień okręgu,

b) długości odcinków, na jakie punkt E dzieli bok BC.



Symetralne boków trójkąta. Okrąg opisany na trójkącie

4.92. W trójkącie ABC, w którym $|AC| > |BC|$, spodek wysokości dzieli bok AB na odcinki AD i DB w taki sposób, że $|AD| : |DB| = 3 : 1$. Symetralna boku AB przecina bok AB w punkcie E, a bok AC w punkcie F. Wiedząc, że $|EF| = 2{,}1$ cm, oblicz $|CD|$.

4.93. W trójkącie ABC bok AB ma długość 16 cm. Punkt D jest spodkiem wysokości poprowadzonej z wierzchołka C. Symetralna boku AB przecina bok CB w punkcie P w taki sposób, że $|CP| : |PB| = 1 : 2$. Wiedząc, że odcinek tej symetralnej zawarty w trójkącie ma długość 6 cm, oblicz:

a) wysokość CD,

b) obwód trójkąta ABC,

c) odległość punktu D od wierzchołka B,

d) odległość punktu D od boku AC.

4.94. Symetralne boków trójkąta prostokątnego przecinają się w punkcie odległym od wierzchołka kąta prostego o 5 cm. Wiedząc, że długości przyprostokątnych pozostają w stosunku 3 : 4, oblicz obwód tego trójkąta.

4.95. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długość 2 cm i 6 cm. Oblicz stosunek długości odcinków, na jakie symetralna przeciwprostokątnej dzieli dłuższą przyprostokątną.

4.96. W trójkącie prostokątnym ABC, w którym $|\sphericalangle CAB| = 90°$, symetralna boku AB przecina ten bok w punkcie D, zaś bok BC w punkcie E. Wiedząc, że $|AB| = 42$ cm oraz $|DE| = 28$ cm, oblicz obwód trójkąta ABC.

4.97. W trójkącie równoramiennym ABC kąt przy wierzchołku C jest równy 120°. Symetralne boków trójkąta przecinają się w punkcie P. Wiedząc, że $|CP| = 4$ cm, oblicz długości boków trójkąta ABC.

D 4.98. Na trójkącie ostrokątnym ABC opisano okrąg o środku S. Wykaż, że:

a) jeśli punkt S należy do jednej z wysokości trójkąta, to ten trójkąt jest równoramienny,

b) jeśli punkt S dzieli wysokość trójkąta w stosunku 2 : 1, licząc od wierzchołka trójkąta, to ten trójkąt jest równoboczny.

4.99. Dane są długości boków a, b, c trójkąta. Jak jest położony względem tego trójkąta środek okręgu opisanego na tym trójkącie, jeśli:

a) $a = 13$, $b = 12$, $c = 5$

b) $a = 6$, $b = 24$, $c = 25$

c) $a = 5$, $b = 6$, $c = 8$

d) $a = 5$, $b = 6$, $c = 7$?

4.100. Oblicz promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym, którego boki mają długość 6 cm.

4.101. Wysokość trójkąta równobocznego jest o 3 cm dłuższa od promienia okręgu opisanego na tym trójkącie. Oblicz długość boku trójkąta.

4.102. Oblicz promień okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym, którego przyprostokątne mają długość:

a) 2 cm i 2 cm

b) 24 cm i 7 cm

c) 60 cm i 11 cm.

4.103. Promień okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym jest równy 6 cm. Oblicz odległość środka ciężkości tego trójkąta od wierzchołka kąta prostego.

4.104. W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość 65 cm, a wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta prostego jest równa 60 cm. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

4.105. W trójkącie prostokątnym wysokość poprowadzona na przeciwprostokątną jest równa 4 cm. Spodek tej wysokości leży w odległości $1\frac{1}{6}$ cm od środka przeciwprostokątnej. Oblicz:

a) promień okręgu opisanego na tym trójkącie,

b) długości boków tego trójkąta.

4.106. Na trójkącie prostokątnym opisano okrąg o promieniu 10 cm. Wiedząc, że wysokość tego trójkąta poprowadzona na przeciwprostokątną jest równa 8 cm, oblicz długości boków tego trójkąta.

4.107. W pewnym trójkącie kąt przy wierzchołku A jest dwa razy większy od kąta przy wierzchołku B. Wyznacz stosunek długości boków tego trójkąta, jeśli środek okręgu opisanego na trójkącie ABC:

a) należy do boku AB

b) należy do boku BC.

4.108. Na trójkącie prostokątnym opisano okrąg o środku w punkcie O. Przeciwprostokątna tego trójkąta ma długość c, $c > 0$.

D a) Wykaż, że odległość punktu O od punktu S, będącego środkiem ciężkości tego trójkąta, jest równa $\frac{c}{6}$.

b) Wyznacz promień tego okręgu wiedząc, że odcinek OS jest o 10 cm krótszy od przeciwprostokątnej.

4.109. W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB ma długość 18 cm, a ramiona BC i AC – 15 cm. Sprawdź, czy trójkąt jest ostrokątny, czy rozwartokątny. Oblicz wysokość CD tego trójkąta. Następnie wyznacz promień okręgu opisanego na tym trójkącie na dwa sposoby:

a) korzystając tylko z twierdzenia Pitagorasa,

b) korzystając z podobieństwa odpowiednich trójkątów prostokątnych.

4.110. W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB ma długość 16 cm, a ramiona BC i AC – 10 cm. Sprawdź, czy trójkąt jest ostrokątny, czy rozwartokątny. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie na dwa sposoby, jak w zadaniu 4.129.

4.111. Dane są długości boków trójkąta równoramiennego. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

a) 25 cm, 25 cm, 14 cm

b) 61 cm, 61 cm, 120 cm

4.112. W trójkącie ostrokątnym ABC boki AC i BC są równe i mają długość $4\sqrt{5}$. Wiedząc, że promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 5, oblicz $|AB|$.

4.113. Symetralne boków trójkąta równoramiennego przecinają się w odległości 12,5 cm od wierzchołka przy podstawie i w odległości 10 cm od ramion trójkąta. Oblicz długości boków tego trójkąta.

Dwusieczne kątów trójkąta. Okrąg wpisany w trójkąt

4.114. W trójkącie równoramiennym ABC, $|AC| = |BC|$, dwusieczna kąta BAC tworzy z bokiem BC kąt 120°. Wyznacz kąty trójkąta ABC. Rozważ dwa przypadki.

4.115. W trójkącie ABC odcinek AD dwusiecznej kąta BAC ma długość taką, jak bok AB. Wiedząc, że $|\sphericalangle BAC| = 108°$, oblicz miary pozostałych kątów trójkąta ABC.

4.116. W trójkącie kąty są równe: 20°, 60°, 100°. Poprowadzono dwusieczne kątów tego trójkąta. Oblicz miary kątów powstałych w ten sposób sześciu trójkątów.

4.117. W trójkąt równoramienny ABC wpisano okrąg o środku O. Wiedząc, że $|\sphericalangle AOB| = 130°$, oblicz miary kątów tego trójkąta.

4.118. Kąty trójkąta ABC są równe: 50°, 60°, 70°. W trójkąt ABC wpisano okrąg. Punkty styczności wyznaczają wierzchołki trójkąta KLM. Wyznacz kąty trójkąta KLM.

4.119. Kąty trójkąta ABC są równe: 50°, 60°, 70°. Na trójkącie ABC opisano okrąg. Przez punkty A, B, C poprowadzono styczne do okręgu, które przecięły się kolejno w punktach K, L, M. Wyznacz kąty trójkąta KLM.

4.120. W trójkąt ABC wpisano okrąg. Punkty D, E, F są punktami styczności tego okręgu odpowiednio z bokami AB, BC i AC. Wiedząc, że $|AD| = 5$ cm, $|DB| = 4$ cm oraz $|FC| = 3$ cm, oblicz obwód trójkąta ABC.

4.121. W trójkąt równoramienny ABC wpisano okrąg. Wiedząc, że $|AC| = |BC| = 16$ cm oraz $|AB| = 12$ cm, oblicz długości odcinków, na jakie punkt styczności podzielił bok AC.

4.122. Wyznacz promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny, jeśli:

a) boki trójkąta mają długość 10 cm,

b) wysokości trójkąta przecinają się w punkcie, którego odległość od wierzchołków jest równa 5 cm.

4.123. Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym jest o 4 cm dłuższy od promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt. Oblicz obwód tego trójkąta.

4.124. Wyznacz promień r okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny równoramienny, jeśli:

a) promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 3,

b) różnica długości przyprostokątnej i r jest równa $1+\sqrt{2}$.

4.125. W trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 3 cm i 4 cm wpisano okrąg. Oblicz długości odcinków, na jakie punkty styczności podzieliły boki tego trójkąta.

4.126. Oblicz promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny, którego przyprostokątne mają długość:

a) 6 cm i 8 cm

b) 8 cm i 15 cm

c) 12 cm i 5 cm

d) $2\sqrt{5}$ cm i 4 cm.

4.127. Oblicz promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny równoramienny, jeśli:

a) przeciwprostokątna tego trójkąta jest równa 4 cm,

b) odległość środka okręgu od wierzchołka kąta prostego jest o 1 cm dłuższa od tego promienia.

D **4.128.** Wykaż, że suma promienia okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym i promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równa średniej arytmetycznej długości przyprostokątnych tego trójkąta.

4.129. Oblicz promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny wiedząc, że obwód tego trójkąta wynosi 30 cm, a promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 6,5 cm.

4.130. Obwód trójkąta prostokątnego jest równy 56 cm. Na trójkącie opisano okrąg i w trójkąt wpisano okrąg. Oblicz promienie tych okręgów wiedząc, że ich różnica wynosi 9,5 cm.

4.131. Dane są długości boków trójkąta równoramiennego. Wyznacz wysokość tego trójkąta poprowadzona na podstawę. Następnie oblicz promień okręgu wpisanego w ten trójkąt, korzystając z twierdzenia o odcinkach stycznych i z twierdzenia Pitagorasa.

a) 5 cm, 5 cm, 6 cm

b) 13 cm, 13 cm, 24 cm

4.132. Dane są długości boków trójkąta równoramiennego. Wyznacz wysokość tego trójkąta poprowadzona na podstawę. Następnie oblicz promień okręgu wpisanego w ten trójkąt, korzystając z podobieństwa odpowiednich trójkątów.

a) 5 cm, 5 cm, 8 cm

b) 25 cm, 25 cm, 14 cm

4.133. W trójkącie równoramiennym ABC, w którym $|AC| = |BC|$, wysokość CD jest równa 18 cm. Wiedząc, że promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 8 cm, oblicz długości boków tego trójkąta.

4.134. Podstawa AB trójkąta równoramiennego ABC ma długość 12 cm. Promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 3 cm. Oblicz długość ramienia tego trójkąta.

4.135. Boki trójkąta mają długość 4 cm, 5 cm, 6 cm. Oblicz długości odcinków, na jakie dwusieczna największego kąta trójkąta dzieli bok, leżący naprzeciw tego kąta.

4.136. Różnica długości dwóch boków trójkąta jest równa 6 cm. Dwusieczna kąta leżącego między tymi bokami przecina trzeci bok trójkąta w stosunku 3 : 1. Oblicz długości tych dwóch boków.

4.137. W trójkącie równoramiennym poprowadzono dwusieczną kąta przy podstawie, która podzieliła ramię na dwa odcinki mające długość: 4 cm i 6 cm. Oblicz długość podstawy tego trójkąta. Rozważ dwa przypadki.

4.138. W trójkącie równoramiennym ABC, w którym $|AC| = |BC|$, poprowadzono dwusieczną kąta BAC, która przecięła bok BC w punkcie D oraz $|CD| = 4\frac{4}{7}$ i $|BD| = 3\frac{3}{7}$.

a) Oblicz długość podstawy AB.

b) Wiedząc dodatkowo, że odcinek DE jest wysokością trójkąta ABD, oblicz $|AE|$ i $|BE|$.

4.139. W trójkącie równoramiennym boki mają długość 12 cm, 10 cm, 10 cm. W trójkąt wpisano okrąg. Oblicz długości odcinków:

a) na jakie punkt styczności okręgu z ramieniem dzieli to ramię,

b) na jakie dwusieczna kąta przy podstawie dzieli przeciwległe temu kątowi ramię.

4.140. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długość: 12 cm i 9 cm. W trójkąt wpisano okrąg. Oblicz długości odcinków:

a) na jakie dwusieczna kąta prostego dzieli przeciwprostokątną,

b) na jakie punkt styczności okręgu z przeciwprostokątną dzieli tę przeciwprostokątną.

4.141. W trójkącie prostokątnym ABC kąty ostre są równe: $|\sphericalangle B| = 30°$ $|\sphericalangle C| = 60°$. Dwusieczna kąta ACB przecina bok AB w punkcie D. Wiedząc, że $|AC| = 3$, oblicz:

a) długość odcinka CD,

b) promień okręgu opisanego na tym trójkącie,

c) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

4.142. Boki trójkąta mają długość: 15, 20, 25. Oblicz długość odcinka dwusiecznej tego trójkąta poprowadzonej z wierzchołka:

a) największego kąta b) najmniejszego kąta.

4.143. W trójkącie prostokątnym dwusieczna kąta prostego podzieliła przeciwprostokątną na odcinki długości 3 cm i 4 cm. Oblicz:

a) długości przyprostokątnych tego trójkąta,

b) długość odcinka tej dwusiecznej, zawartego w trójkącie.

4.144. W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB ma długość 12. Dwusieczna kąta BAC przecina bok BC w punkcie D, którego odległość od podstawy AB jest równa $4\frac{4}{11}$. Wiedząc, że promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 3, oblicz:

a) długość odcinka AD

b) wysokość CE.

Test sprawdzający do rozdziału 4.

1. W trójkącie ABC na rysunku obok kąt przy wierzchołku A jest równy 60°. Dwusieczna kąta ACB przecina bok AB w punkcie D. Jeżeli $|CD| = |DB|$, to kąt ACB ma miarę:

A. 90° B. 80°

C. 70° D. 60°



2. Kąt środkowy ma miarę 72° i jest oparty na łuku okręgu, mającym długość 4π. Promień tego okręgu jest równy:

A. 2 B. 4 C. 5 D. 10

3. Na rysunku obok dany jest okrąg o środku O, dwa kąty środkowe i kąt wpisany α. Wówczas:

A. $\alpha = 110°$ B. $\alpha = 120°$

C. $\alpha = 125°$ D. $\alpha = 130°$.



4. Średnica AB okręgu ma długość 2. Jeśli długość cięciwy BC jest równa 1, to:

A. $|AC| = 2$ B. $|AC| = \sqrt{3}$ C. $|AC| = \sqrt{2}$ D. $|AC| = 1$

5. Dwa okręgi o promieniach R i r są współśrodkowe, $R > r$. Cięciwa AB większego okręgu jest styczna do mniejszego okręgu. Jeśli $R^2 - r^2 = 9$, to:

A. $|AB| = 6$ B. $|AB| = 9$

C. $|AB| = 12$ D. $|AB| = 18$



6. Odległość między środkami dwóch okręgów jest równa 6. Jeśli promienie tych okręgów są równe π oraz 2π, to okręgi te:

A. są rozłączne wewnętrznie
B. są styczne wewnętrznie
C. są rozłączne zewnętrznie
D. się przecinają

7. Na rysunku obok dany jest okrąg o środku O i kąt α dopisany do okręgu. Z danych na rysunku wynika, że:

A. $\alpha = 50^\circ$
B. $\alpha = 55^\circ$
C. $\alpha = 60^\circ$
D. $\alpha = 65^\circ$

8. Bok trójkąta równobocznego ma długość a, zaś promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy R. Wówczas:

A. $a = 2R$
B. $a = R\sqrt{3}$
C. $a\sqrt{3} = 4R$
D. $a\sqrt{3} = 2R$

9. Boki trójkąta mają długość: 6 cm, 8 cm, 10 cm. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy:

A. 2 cm
B. 3 cm
C. 4 cm
D. 5 cm

10. Na rysunku obok trójkąty ABC i ADC są wpisane w okrąg o środku w punkcie O. Odcinek CD jest średnicą okręgu. Jeśli $|AC| = 2$ oraz $|\sphericalangle ABC| = 45^\circ$, to średnica tego okręgu ma długość:



A. $\sqrt{2}$
B. 2
C. $2\sqrt{2}$
D. 4

11. Bok AB trójkąta ABC ma długość 24 cm. Punkt przecięcia symetralnych boków BC i AC leży w odległości 5 cm od boku AB. Zatem promień okręgu opisanego na trójkącie ABC jest równy:

A. 13 cm
B. 12 cm
C. 11 cm
D. 10 cm

12. W okręgu poprowadzono dwie cięciwy. Punkt przecięcia tych cięciw dzieli jedną z nich na odcinki długości 8 cm i 2 cm, a drugą na odcinki równej długości. Długość drugiej cięciwy jest równa:

A. 6 cm
B. 8 cm
C. 10 cm
D. 12 cm

13. W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB ma długość 2 cm. W trójkąt wpisano okrąg. Punkt D jest punktem styczności tego okręgu z ramieniem AC. Jeśli $|AD| : |DC| = 2 : 3$, to obwód trójkąta ABC jest równy:

A. 12 cm
B. 9 cm
C. 8 cm
D. 7 cm

14. W trójkącie ABC, w którym $|AC| = |BC| = 36$ cm, poprowadzono dwusieczną kąta CBA, która przecięła ramię AC w punkcie D. Jeśli $|CD| : |AD| = 4 : 5$, to:

A. $|AB| = 28{,}8$ cm B. $|AB| = 40$ cm C. $|AB| = 45$ cm D. $|AB| = 54$ cm

15. Promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny jest równy 3 cm, a promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 8,5 cm. Suma długości przyprostokątnych tego trójkąta wynosi:

A. 17,5 cm B. 20 cm C. 23 cm D. 26 cm

Zadania powtórzeniowe do rozdziału 4.

16. Na rysunku obok proste AB, BC, CA są stycznymi do danego okręgu odpowiednio w punktach L, M, K, przy czym $|CM| = x$, $|MB| = y$, $|KA| = z$. Wiadomo, że $x + y + z = 10$ cm oraz $3x = 2(y + z)$.
Oblicz długość boku AB.



17. Dany jest okrąg o środku w punkcie O i styczna do tego okręgu w punkcie P. Korzystając z danych na rysunku, oblicz α.

a)



b)



18. Punkty A, B, C należą do okręgu oraz $|\sphericalangle CBA| = |\sphericalangle ACB|$. Przez punkty B i C poprowadzono styczne do okręgu, które przecięły się w punkcie D. Wiedząc, że $2|\sphericalangle CDB| = |\sphericalangle CBA|$, oblicz miarę kąta między ramionami trójkąta ABC.

19. Na rysunku obok punkty A, B, C należą do okręgu o środku w punkcie O oraz dane są kąty środkowe α i β.



D a) Wykaż, że jeśli $\alpha = 54°$ i $\beta = 72°$, to $OA \| BC$.

b) Oblicz miary kątów trójkąta ABC w przypadku, gdy $\alpha = 50°$, $\beta = 78°$.

D **20.** Punkty A, B, D należą do okręgu o środku w punkcie O. Sieczne AB i DO przecinają się w punkcie C, jak na rysunku obok. Wykaż, że jeśli $|BC| = |BO|$, to $|\sphericalangle DOA| = 3|\sphericalangle COB|$.



21. Dwa okręgi $o(O_1, r)$ i $o(O_2, R)$, gdzie $r < R$, są styczne wewnętrznie w punkcie A oraz $|O_1O_2| = 4$ cm.

a) Wyznacz promienie tych okręgów wiedząc, że ich suma jest równa 10 cm.

D b) Przez punkt A poprowadzono prostą, która przecięła mniejszy okrąg w punkcie B, a większy w punkcie C. Wykaż, że $O_1B \| O_2C$. Wiedząc dodatkowo, że $|BC| = 6$ cm, oblicz $|AB|$.

22. Promienie dwóch okręgów są równe: $r_1 = 2m - 1$ oraz $r_2 = 3m$. Odległość między środkami tych okręgów jest równa 14.

a) Wyznacz liczbę m, dla której te okręgi mają jeden punkt wspólny. Dla wyznaczonej liczby m podaj promienie tych okręgów.

b) Dla jakich wartości m okręgi te mają dwa punkty wspólne?

23. Z punktu P, którego odległość od środka O okręgu jest równa 15 cm, poprowadzono sieczną, przecinającą okrąg w punktach A i B. Wiedząc, że promień okręgu jest równy 9 cm oraz $|PA| : |AB| = 1 : 3$, oblicz długość cięciwy AB.

D **24.** W trójkącie prostokątnym ABC na rysunku obok punkt O jest środkiem dłuższej przyprostokątnej AB. Półokrąg o średnicy AB przecina przeciwprostokątną BC w punkcie D. Wykaż, że jeśli $|AD| = |DO|$, to:



a) $|AC| = 2|CD|$

b) $4 \cdot |CD| \cdot |DB| = 3 \cdot |AC|^2$

25. W trójkącie ABC, w którym $|AC| < |BC|$, wysokość CD jest równa 4,5 cm. Symetralna boku AB przecina bok AB w punkcie E, a bok BC w punkcie F. Wiedząc, że $|EF| = 3$ cm, oblicz $|AD| : |DB|$.

26. W trójkącie prostokątnym ABC przyprostokątne mają długość: $|AB| = 8$ cm, $|AC| = 6$ cm. Oblicz:

a) długość odcinka DE symetralnej boku BC, zawartego w trójkącie ABC,

b) długość odcinka CF dwusiecznej kąta ACB.

27. W trójkąt ABC wpisano okrąg. Wiedząc, że $|AB| = 20$ cm, $|AC| = 16$ cm oraz $|BC| = 12$ cm, oblicz długości odcinków:

a) na jakie punkty styczności podzieliły bok AB,

b) na jakie dwusieczna kąta ACB podzieliła bok AB.

28. W trójkącie równoramiennym poprowadzono dwusieczną kąta przy podstawie, która podzieliła przeciwległe ramię na odcinki długości: $7\frac{8}{23}$ oraz $5\frac{15}{23}$ – kolejno od wierzchołka między ramionami trójkąta. Oblicz:

a) długość podstawy,

b) promień okręgu opisanego na tym trójkącie,

c) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

29. W trójkącie prostokątnym spodek najkrótszej wysokości dzieli przeciwprostokątną w stosunku 9 : 16. Wiedząc, że promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 25 cm, oblicz:

a) długości boków tego trójkąta,

b) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

30. W trójkącie prostokątnym najkrótsza wysokość jest równa 15, a najkrótszy bok ma długość 17. Oblicz:

a) długości pozostałych boków trójkąta,

b) promień okręgu opisanego na tym trójkącie,

c) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

5. Trygonometria

Trygonometria kąta ostrego – powtórzenie wiadomości z klasy 1.

5.1. Oblicz obwód trójkąta ABC na rysunku poniżej z dokładnością do 0,5 cm:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

5.2. Średnica AB okręgu ma długość 10 cm. Cięciwa CD, prostopadła do średnicy AB, jest oddalona od punktu A o 9 cm. Oblicz:

a) tangens kąta CBA b) sinus kąta CAB.

5.3. Oblicz:

a) $(\cos 30^\circ - \sin 45^\circ)(\sin 60^\circ + \cos 45^\circ)$

b) $(3\operatorname{tg} 30^\circ - \operatorname{ctg} 45^\circ)^2 - 8 \cdot \sin 30^\circ$

c) $\left(\sqrt{2} \cdot \operatorname{ctg} 60^\circ + \sqrt{3} \cdot \cos 45^\circ\right)\left(6\operatorname{tg} \cdot 45^\circ - \sqrt{72} \cdot \operatorname{tg} 60^\circ\right)$.

5.4. W prostokącie $ABCD$ przekątne mają długość 4 cm i przecinają się pod kątem:

a) 60° b) 45° c) 30°.

Oblicz odległość punktu B od przekątnej AC.

5.5. Wyznacz kąt α, $\alpha \in (0°, 90°)$, wiedząc, że:

e) $\operatorname{tg}\alpha = \sqrt{3}$ f) $\sin\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$ g) $\cos\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ h) $\operatorname{ctg}\alpha = 1$.

5.6. W trójkącie ABC kąty przy podstawie AB są ostre. Poprowadzono wysokość CD. Wyznacz kąty trójkąta ABC, jeśli:

a) $|AC| = 10$, $|CD| = 5\sqrt{2}$, $|BC| = 10\sqrt{2}$

b) $|AD| = 2$, $|DB| = 6$, $|BC| = \sqrt{48}$.

5.7. Skonstruuj trójkąt prostokątny, w którym:

a) $|\sphericalangle A| = 90°$, $\sin|\sphericalangle B| = \frac{1}{3}$ b) $|\sphericalangle C| = 90°$, $\cos|\sphericalangle A| = \frac{3}{4}$

5.8. Dana jest jedna z funkcji trygonometrycznych kąta ostrego α. Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych tego kąta.

a) $\sin\alpha = \frac{7}{25}$ b) $\cos\alpha = \frac{60}{61}$ c) $\operatorname{tg}\alpha = 2\frac{2}{5}$ d) $\operatorname{ctg}\alpha = \frac{1}{3}$

D 5.9. Dwa kąty ostre trójkąta mają miary α i β. Wykaż, że jeśli $\operatorname{tg}\alpha = 2 \cdot \sin\alpha$ oraz $\cos\beta = \sqrt{3} \cdot \cos\alpha$, to ten trójkąt jest prostokątny, a długości jego boków pozostają w stosunku $1 : \sqrt{3} : 2$.

D 5.10. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długość a i b, zaś przeciwprostokątna ma długość c. Wykaż, że jeśli naprzeciw boku a leży kąt α taki, że $\operatorname{tg}\alpha = 2$, to $\frac{(a^2 - c^2)(b^2 - c^2)}{(a^2 + b^2 + c^2)^2} = \frac{1}{25}$.



D 5.11. Wykaż, że jeśli $\alpha \in (0°, 90°)$ oraz $\operatorname{ctg}\alpha = 4$, to $\frac{32 \cdot \sin\alpha - \sin(90° - \alpha)}{6 \cdot \cos(90° - \alpha) + 2 \cdot \cos\alpha} = 2$.

D 5.12. Wykaż, że:

a) $\operatorname{tg}5° \cdot \operatorname{tg}25° \cdot \operatorname{tg}45° \cdot \operatorname{tg}65° \cdot \operatorname{tg}85° = 1$

b) $\cos^2 20° + \cos^2 40° + \cos^2 50° + \cos^2 70° = 2$

c) $\sin^4 20° + \sin^4 70° + 2 \cdot \cos^2 20° \cdot \cos^2 70° = 1$.

Sinus, cosinus, tangens i cotangens dowolnego kąta płaskiego

5.13. Na końcowym ramieniu kąta α, umieszczonego w układzie współrzędnych w położeniu standardowym, znajduje się punkt P. Wyznacz odległość tego punktu od punktu $O(0, 0)$. Następnie oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kąta α – o ile istnieją.

a) $P(12, 5)$ b) $P\left(-2, 2\sqrt{3}\right)$ c) $P\left(-\sqrt{3}, -\sqrt{6}\right)$

d) $P(15, -8)$ e) $P(0, -3)$ f) $P(-5, 0)$

5.14. Punkt P znajduje się na końcowym ramieniu kąta α w położeniu standardowym. Odległość tego punktu od początku układu współrzędnych jest równa r. Wyznacz brakującą współrzędną punktu P i oblicz funkcje trygonometryczne kąta α, jeśli:

a) $P(-3, y)$, $r = 5$, $\alpha \in (180°, 270°)$

b) $P(x, 2)$, $r = \sqrt{13}$, $\alpha \in (90°, 180°)$

c) $P(x, 4)$, $r = 8{,}5$ $\alpha \in (0°, 90°)$

d) $P\left(4\sqrt{3}, y\right)$, $r = 7$, $\alpha \in (270°, 360°)$.

5.15. Kąt α znajduje się w położeniu standardowym. Punkt $P(x, y)$ leży na końcowym ramieniu tego kąta, w odległości r od punktu $O(0, 0)$. Oblicz współrzędne punktu P, jeśli:

a) $\alpha \in (0°, 90°)$, $\sin\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $r = 6$

b) $\alpha \in (90°, 180°)$, $\cos\alpha = -\frac{2}{3}$, $r = 9$

c) $\alpha \in (180°, 270°)$, $\cos\alpha = -\frac{3}{5}$, $r = 10$

d) $\alpha \in (270°, 360°)$, $\sin\alpha = -\frac{1}{2}$, $r = 2\sqrt{3}$.

5.16. Kąt α znajduje się w położeniu standardowym. Punkt $P(x, y)$ wybrano na końcowym ramieniu tego kąta, w odległości r od punktu $O(0, 0)$. Oblicz współrzędne punktu P, jeśli:

a) $\alpha \in (180°, 270°)$, $\operatorname{tg}\alpha = 2$, $r = 2\sqrt{5}$

b) $\alpha \in (90°, 180°)$, $\operatorname{tg}\alpha = -3$, $r = \sqrt{10}$

c) $\alpha \in (270°, 360°)$, $\operatorname{ctg}\alpha = \frac{-4}{3}$, $r = 15$

d) $\alpha \in (0°, 90°)$, $\operatorname{ctg}\alpha = \frac{1}{2}$, $r = 5$.

5.17. Jaką miarę ma kąt α, jeśli $\alpha \in \langle 0°, 360°)$ oraz:

a) $\sin\alpha = 1$ b) $\operatorname{tg}\alpha = 0$ c) $\cos\alpha = 0$.

Dla wyznaczonej miary α oblicz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych tego kąta, o ile istnieją.

5.18. Oblicz – korzystając z definicji – wartości funkcji trygonometrycznych kąta α, jeśli:

a) $\alpha = 210°$ b) $\alpha = 240°$ c) $\alpha = 135°$ d) $\alpha = 330°$.

5.19. W której ćwiartce układu współrzędnych znajduje się końcowe ramię kąta α w położeniu standardowym, jeżeli:

a) $\sin\alpha < 0$ i $\cos\alpha < 0$

b) $\sin\alpha < 0$ i $\operatorname{tg}\alpha < 0$

c) $\operatorname{tg}\alpha > 0$ i $\operatorname{ctg}\alpha > 0$

d) $\cos\alpha < 0$ i $\operatorname{tg}\alpha < 0$

e) $\sin\alpha < 0$ i $\cos\alpha > 0$

f) $\cos\alpha > 0$ i $\operatorname{tg}\alpha < 0$.

5.20. Kąt α jest ostry. Jaką wartość: dodatnią czy ujemną, ma poniższe wyrażenie?

a) $\sin(90°+\alpha)\cdot\cos(180°+\alpha)+\operatorname{tg}(270°+\alpha)$

b) $\cos(90°-\alpha)\cdot\cos(180°-\alpha)\cdot\sin(360°-\alpha)$

c) $\operatorname{ctg}(270°+\alpha)+\sin(180°+\alpha)$

d) $\cos\left[(180°+\alpha)+\sin(270°+\alpha)\right]\cdot\operatorname{tg}(180°-\alpha)$

5.21. Kąt α znajduje się w układzie współrzędnych w położeniu standardowym. Punkt $P(x, y)$ wybrano na końcowym ramieniu tego kąta w odległości r od punktu $O(0, 0)$. Oblicz współrzędne punktu P, jeśli:

a) $\operatorname{tg}\alpha = \frac{2}{3}$, $\cos\alpha < 0$, $r = \sqrt{13}$

b) $\operatorname{ctg}\alpha = -3$, $\sin\alpha > 0$, $r = 5$

c) $\operatorname{tg}\alpha = -\frac{2}{5}$, $\cos\alpha > 0$, $r = \frac{\sqrt{29}}{5}$

d) $\operatorname{tg}\alpha = \frac{4}{5}$, $\sin\alpha > 0$, $r = \frac{\sqrt{41}}{3}$

D 5.22. Wykaż, że jeśli $\alpha \in \langle 0°, 360°)$ oraz:

a) $\sin\alpha = \cos\alpha$, to $\alpha \in \{45°, 225°\}$ b) $\sin\alpha = -\cos\alpha$, to $\alpha \in \{135°, 315°\}$

5.23. Skonstruuj w układzie współrzędnych kąt o mierze α, wiedząc, że:

a) $\sin\alpha = \frac{1}{4}$ b) $\cos\alpha = -\frac{2}{5}$ c) $\operatorname{tg}\alpha = 3\frac{1}{2}$

d) $\operatorname{ctg}\alpha = -6$ e) $\sin\alpha = -\frac{3}{4}$ f) $\cos\alpha = \frac{4}{5}$

Rozważ dwa przypadki.

5.24. Skonstruuj w układzie współrzędnych kąt o takiej mierze α, że:

a) $\sin\alpha = \frac{5}{6}$ i $\operatorname{tg}\alpha < 0$ b) $\cos\alpha = -\frac{2}{7}$ i $\operatorname{ctg}\alpha > 0$

c) $\operatorname{tg}\alpha = 2\frac{1}{3}$ i $\sin\alpha < 0$ d) $\operatorname{ctg}\alpha = -\sqrt{2}$ i $\cos\alpha > 0$

Podstawowe tożsamości trygonometryczne

5.25. Oblicz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych kąta α, jeśli $\alpha \in (90°, 180°)$ oraz:

a) $\sin\alpha = 0{,}8$ b) $\cos\alpha = -\frac{1}{4}$ c) $\operatorname{tg}\alpha = -\frac{1}{3}$ d) $\operatorname{ctg}\alpha = -7$.

5.26. Oblicz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych, wiedząc, że $\alpha \in (0°, 180°)$ oraz:

a) $\operatorname{tg}\alpha = \frac{1}{2}$ b) $\cos\alpha = -\frac{24}{25}$ c) $\sin\alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}$ d) $\operatorname{ctg}\alpha = -\frac{11}{60}$.

5.27. Oblicz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych kąta α, jeśli:

a) $\sin\alpha = -\frac{5}{13}$ i $\alpha \in (180°, 270°)$ b) $\operatorname{ctg}\alpha = \frac{8}{15}$ i $\alpha \in (180°, 270°)$

c) $\operatorname{tg}\alpha = -\frac{12}{5}$ i $(270, 360)$ d) $\cos\alpha = \frac{2}{3}$ i $\alpha \in (270°, 360°)$.

5.28. Oblicz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych kąta α, $\alpha \in \langle 0°, 360°)$, jeśli:

a) $\cos\alpha = \frac{5}{13}$ b) $\sin\alpha = -\frac{60}{61}$ c) $\operatorname{ctg}\alpha = 3$ d) $\operatorname{ctg}\alpha = \frac{45}{28}$.

5.29. Oblicz wartość wyrażenia:

a) $\frac{4\cdot\sin\alpha-5\cdot\cos\alpha}{\cos\alpha+3\cdot\sin\alpha}$, jeśli $\operatorname{tg}\alpha=5$

b) $\frac{-3\cdot\cos\alpha+6\cdot\sin\alpha}{8\cdot\sin\alpha+3\cdot\cos\alpha}$, jeśli $\operatorname{ctg}\alpha=-2$.

5.30. Kąt α jest rozwarty. Oblicz wartość wyrażenia:

a) $\cos\alpha-\sin^2\alpha$, jeśli $\cos^2\alpha=0{,}81$

b) $2\cdot\cos\alpha+\sin\alpha$, jeśli $\sin^2\alpha=0{,}25$

c) $\operatorname{tg}\alpha-6\cdot\operatorname{ctg}\alpha$, jeśli $\operatorname{tg}^2\alpha=144$

d) $\frac{3\cdot\sin\alpha+4\cdot\cos\alpha}{\sin\alpha-2\cdot\cos\alpha}$, jeśli $\operatorname{ctg}^2\alpha=100$.

5.31. Oblicz:

a) $\operatorname{tg}\alpha$, jeśli $\alpha\in(0°, 90°)$ oraz $4\cdot\sin^2\alpha=3\cdot\cos^2\alpha$

b) $\operatorname{ctg}\alpha$, jeśli $\alpha\in(90°, 180°)$ oraz $5\cdot\cos^2\alpha=2\cdot\sin^2\alpha$

c) $\operatorname{tg}\alpha$, jeśli $\alpha\in(180°, 270°)$ oraz $9\cdot\sin^2\alpha-5\cdot\cos^2\alpha=2$

d) $\operatorname{ctg}\alpha$, jeśli $\alpha\in(270°, 360°)$ oraz $4\cdot\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=3$.

5.32. Sprawdź, czy podane równości są tożsamościami trygonometrycznymi, jeśli $\alpha\in(0°, 90°)\cup(90°, 180°)$.

a) $1-2\cdot\sin^2\alpha=2\cdot\cos^2\alpha-1$

b) $\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=2\cdot\cos^2\alpha-1$

c) $\frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\cos\alpha}=1+\operatorname{tg}\alpha$

d) $\frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\sin\alpha}=\operatorname{ctg}\alpha\cdot(1+\operatorname{tg}\alpha)$

e) $\frac{\sin\alpha+\operatorname{tg}\alpha}{\sin\alpha}=1+\frac{1}{\cos\alpha}$

f) $\frac{\cos\alpha+\operatorname{ctg}\alpha}{\cos\alpha}=1+\frac{1}{\sin\alpha}$

5.33. Sprawdź, czy podane równości są tożsamościami trygonometrycznymi, jeśli $\alpha\in(0°, 90°)\cup(90°, 180°)$.

a) $\cos\alpha\cdot\left(\frac{1}{\cos\alpha}-\cos\alpha\right)=\sin^2\alpha$

b) $1-\sin\alpha=\frac{\operatorname{ctg}\alpha-\cos\alpha}{\operatorname{ctg}\alpha}$

c) $\frac{2}{\sin^2\alpha}-1=1+2\cdot\operatorname{ctg}^2\alpha$

d) $\frac{1}{1-\cos\alpha}+\frac{1}{1+\cos\alpha}=\frac{2}{\sin^2\alpha}$

e) $\frac{\operatorname{tg}\alpha\cdot\left(1+\operatorname{ctg}^2\alpha\right)}{1+\operatorname{tg}^2\alpha}=\operatorname{ctg}\alpha$

f) $\frac{\operatorname{ctg}\alpha\cdot\left(1+\operatorname{tg}^2\alpha\right)}{1+\operatorname{ctg}^2\alpha}=\operatorname{tg}\alpha$

5.34. Wiedząc, że α jest kątem rozwartym oraz $\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{7}{13}$, oblicz:

a) $\sin\alpha\cdot\cos\alpha$

b) $\sin\alpha-\cos\alpha$

c) $\sin\alpha$, $\cos\alpha$.

5.35. Wiedząc, że $\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{2}}$, oblicz:

a) $\sin\alpha\cdot\cos\alpha$ b) $(\cos\alpha-\sin\alpha)^2$ d) $\sin^4\alpha+\cos^4\alpha$.

5.36. Wiedząc, że $\operatorname{tg}\alpha+\operatorname{ctg}\alpha=4$, oblicz:

a) $\operatorname{tg}^2\alpha+\operatorname{ctg}^2\alpha$ b) $\operatorname{tg}^4\alpha+\operatorname{ctg}^4\alpha$ c) $(\operatorname{tg}\alpha-\operatorname{ctg}\alpha)^2$

D 5.37. Wykaż, że jeśli $\alpha\in(0°, 90°)$ oraz $\sin\alpha\cdot\cos\alpha=\frac{7}{18}$, to $\sin\alpha+\cos\alpha=1\frac{1}{3}$.

D 5.38. Wykaż, że jeśli $\alpha\in(0°, 90°)\cup(180°, 270°)$ oraz $\operatorname{tg}\alpha+\operatorname{ctg}\alpha=2\frac{1}{6}$, to $\operatorname{tg}^2\alpha+\operatorname{ctg}^2\alpha=2\frac{25}{36}$.

5.39. Zbadaj, czy istnieje kąt α, $\alpha\in\langle 0°, 360°)$, który spełnia następujące warunki:

a) $\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{5}$ i $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$ b) $\sin\alpha=-\frac{2}{\sqrt{5}}$ i $\cos\alpha=\frac{\sqrt{5}}{5}$

c) $\cos\alpha=-\frac{1}{3}$ i $\operatorname{tg}\alpha=-2\sqrt{2}$ d) $\operatorname{tg}\alpha=\sqrt{6}$ i $\operatorname{ctg}\alpha=\frac{\sqrt{6}}{12}$

Jeśli tak, to do której ćwiartki układu współrzędnych należy końcowe ramię kąta α w położeniu standardowym?

5.40. Czy $\sin\alpha$ może się równać:

a) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ b) $\frac{-\sqrt{15}}{4}$

c) $\frac{-1}{\sin\beta}$ dla pewnego kąta β d) $\operatorname{tg}\beta+\operatorname{ctg}\beta$ dla pewnego kąta β?

5.41. Czy $\cos\alpha$ może się równać:

a) $-\frac{\sqrt{7}}{2}$ b) $\frac{3}{\sqrt{10}}$

c) $\frac{1}{\sin\beta}$ dla pewnego kąta β d) $\operatorname{tg}\beta$ dla pewnego kąta β?

Wybrane wzory redukcyjne

5.42. Oblicz, stosując wzory redukcyjne:

a) $\sin 120^\circ \cdot \cos 150^\circ + \operatorname{tg} 135^\circ$

b) $\operatorname{tg} 120^\circ \cdot \operatorname{ctg} 30^\circ + \cos^2 135^\circ$

c) $(\cos 120^\circ - \operatorname{tg} 150^\circ)^2$

d) $(\sin 135^\circ - \operatorname{tg} 120^\circ) \cdot (\cos 135^\circ - \operatorname{ctg} 150^\circ)$.

5.43. Dane są liczby:

$a = \sin 120^\circ + \cos 150^\circ - 2 \cdot \operatorname{tg} 45^\circ$ $\qquad b = \left(\dfrac{\sin 60^\circ - 2 \cdot \cos 135^\circ}{\operatorname{tg} 120^\circ} \right)^2$

$c = (\cos 150^\circ + \sin 135^\circ)(\cos 30^\circ + \sin 45^\circ)$ $\qquad d = \operatorname{tg} 150^\circ \cdot \cos 30^\circ + \sin 90^\circ$.

Która z tych liczb jest liczbą wymierną?

5.44. Porównaj liczby x i y.

a) $x = \sin 135^\circ$, $y = \operatorname{tg}^2 150^\circ$

b) $x = -\sqrt{3} \cdot \cos 120^\circ$, $y = \sin 120^\circ$

c) $x = \dfrac{1}{\operatorname{ctg} 120^\circ}$, $y = \dfrac{1}{\cos 135^\circ}$

d) $x = 4^{\sin 150^\circ}$, $y = \left(\dfrac{1}{2} \right)^{3 \cos 120^\circ}$

5.45. Oblicz bez użycia tablic trygonometrycznych i kalkulatora.

a) $4 \cdot \sin 300^\circ \cdot \cos 330^\circ \cdot \operatorname{ctg} 315^\circ$

b) $\cos 240^\circ \cdot \sin 180^\circ + \cos 0^\circ$

c) $\sin^2 217^\circ + \cos^2 127^\circ + 2 \cdot \sin 37^\circ \cdot \cos 127^\circ$

d) $\operatorname{tg} 225^\circ - \operatorname{ctg} 135^\circ - \sin 0^\circ$

e) $\cos 0^\circ + \sin 90^\circ - \sin 270^\circ - \operatorname{tg} 180^\circ$

5.46. Oblicz bez użycia tablic trygonometrycznych i kalkulatora.

a) $2 \cdot \cos 120^\circ + 4 \cdot \operatorname{tg} 210^\circ \cdot \sin 120^\circ$

b) $3 \cdot \operatorname{tg} 225^\circ \cdot \cos 300^\circ + \sin 150^\circ$

c) $\cos 210^\circ \cdot \operatorname{ctg} 210^\circ + \sin 315^\circ \cdot \cos 315^\circ$

d) $\sin 150^\circ \cdot \operatorname{tg} 225^\circ + \sin^2 300^\circ$

e) $\sin 180^\circ + \cos 90^\circ + \cos 180^\circ + \sin 270^\circ$

5.47. Wiedząc, że $\alpha \in (0°, 90°) \cup (90°, 180°)$, doprowadź poniższe wyrażenia do najprostszej postaci.

a) $\sin(180° - \alpha) \cdot \cos(90° + \alpha) - \cos^2(180° - \alpha)$

b) $\sin(90° + \alpha) \cdot \operatorname{tg}(180° - \alpha) + \cos(180° - \alpha) \cdot \operatorname{ctg}(90° + \alpha)$

c) $\cos(90° - \alpha) \cdot \sin(180° - \alpha) - \sin(90° - \alpha) \cdot \cos(180° - \alpha)$

d) $\operatorname{tg}(90° + \alpha) \cdot \operatorname{tg}(180° - \alpha) + \operatorname{ctg}(90° - \alpha) \cdot \operatorname{tg}(90° - \alpha)$

5.48. Kąty trójkąta mają miary: α, β, γ. Oblicz funkcje trygonometryczne kąta $\alpha + \beta$, jeśli:

a) $\gamma = 60°$

b) $\gamma = 30°$

c) $\cos\gamma = \frac{-\sqrt{3}}{2}$

d) $\operatorname{tg}\gamma = -1$

5.49. Wyznacz α, $\alpha \in \langle 0°, 360° \rangle$, wiedząc, że:

a) $\cos\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ i $\sin\alpha < 0$

b) $\sin\alpha = 0$ i $\cos\alpha = -1$

c) $\operatorname{ctg}\alpha = -1$ i $\sin\alpha > 0$

d) $\operatorname{tg}\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ i $\cos\alpha > 0$

e) $\cos\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$ i $\sin\alpha < 0$

f) $\operatorname{tg}\alpha = -\sqrt{3}$ i $\sin\alpha > 0$.

Test sprawdzający do rozdziału 5.

1. Kąt α znajduje się w układzie współrzędnych w położeniu standardowym. Punkt $P(-5, 12)$ należy do drugiego ramienia tego kąta. Zatem:

A. $\cos\alpha = -\frac{5}{13}$ B. $\sin\alpha = -\frac{12}{13}$ C. $\operatorname{tg}\alpha = -\frac{5}{12}$ D. $\operatorname{ctg}\alpha = -\frac{12}{5}$

2. Punkt P należy do drugiego ramienia kąta α w położeniu standardowym i jest punktem przecięcia się prostej k: $x = -3$ z prostą l: $y = -4x$. Zatem:

A. $\operatorname{tg}\alpha = -\frac{3}{4}$ B. $\operatorname{tg}\alpha = -\frac{4}{3}$ C. $\operatorname{tg}\alpha = -4$ D. $\operatorname{tg}\alpha = \frac{-1}{4}$

3. O kącie płaskim α wiadomo, że $\operatorname{tg}\alpha < 0$ i $\sin\alpha < 0$. Zatem:

A. $\alpha \in (0°, 90°)$ B. $\alpha \in (90°, 180°)$ C. $\alpha \in (180°, 270°)$ D. $(270°, 360°)$

4. Jeśli $\alpha \in (90°, 180°)$ i $\cos^2\alpha = \frac{4}{9}$, to:

A. $\operatorname{tg}\alpha \cdot \sin\alpha = \frac{5}{6}$ B. $\operatorname{tg}\alpha \cdot \sin\alpha = \frac{6}{5}$ C. $\operatorname{tg}\alpha \cdot \sin\alpha = -\frac{6}{5}$ D. $\operatorname{tg}\alpha \cdot \sin\alpha = -\frac{5}{6}$

5. Wartość wyrażenia $\sin^2(90° + 44°) - \cos^2 44°$ jest równa:

A. 0 B. $-2\cos^2 44$ C. -1 D. $-\frac{1}{2}$

6. Wyrażenie $\cos(180° - \alpha) \cdot \sin(90° - \alpha) + 1$ jest równe:

A. $\sin\alpha \cdot \cos\alpha + 1$ B. 2 C. $\cos^2\alpha + 1$ D. $\sin^2\alpha$

7. Wyrażenie $\operatorname{tg}135° \cdot \cos 120°$ jest równe:

A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

8. Jeśli $\alpha = 150°$, to:

A. $\sqrt{3} \cdot \cos\alpha + \sin\alpha = 0$ B. $(\sin\alpha - \cos\alpha)^2 = \frac{2+\sqrt{3}}{2}$

C. $\cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \frac{1}{4}$ D. $\frac{2 \cdot \sin\alpha + 1}{2 \cdot \cos\alpha} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

9. Jeśli α, β, γ są kątami trójkąta oraz $\alpha = 15°$, $\beta = 30°$, to:

A. $\cos\gamma = -\sqrt{2} \cdot \sin\beta$ B. $\cos\gamma = \sin(\alpha + \beta)$

C. $\cos\gamma = -0{,}5 \cdot \operatorname{ctg}(\alpha + \beta)$ D. $\sqrt{3} \cdot \cos\gamma = -\operatorname{tg} 2\beta$

10. Jeśli $\alpha \in (180°, 270°)$ i $\operatorname{tg}\alpha = 5$, to:

A. $\sin\alpha = \frac{-1}{\sqrt{26}}$ B. $\sin\alpha = \frac{-5}{\sqrt{26}}$ C. $\sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{26}}$ D. $\sin\alpha = \frac{5}{\sqrt{26}}$

Zadania powtórzeniowe do rozdziału 5.

11. Na drugim ramieniu kąta α znajdującego się w położeniu standardowym leży punkt $P\left(-7\frac{1}{2}, 4\right)$. Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kąta α.

12. Korzystając z definicji funkcji trygonometrycznych kąta, znajdującego się w układzie współrzędnych w położeniu standardowym, wyznacz wartości funkcji trygonometrycznych kąta równego $300°$.

13. Skonstruuj w układzie współrzędnych kąt α, wiedząc, że:

a) $\cos\alpha = -\frac{5}{8}$ i $\alpha \in (180°, 270°)$ b) $\sin\alpha = \frac{3}{7}$

14. Skonstruuj w układzie współrzędnych kąt α, wiedząc, że:

a) $\operatorname{tg}\alpha = 1{,}5$ i $\cos\alpha < 0$ b) $\operatorname{ctg}\alpha = -3$

15. Porównaj liczby: $a = \sin 135°$ oraz $b = \sin^3 150° + \sin 30° \cdot \cos^2 120°$.

16. Wyznacz miarę kąta α, $\alpha \in \langle 0°, 360°)$, wiedząc, że:

a) $\sin\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ i $\operatorname{tg}\alpha < 0$ b) $\operatorname{tg}\alpha = -\frac{1+\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}}$ i $\sin\alpha > 0$

17. Kąt α jest kątem ostrym oraz $\operatorname{tg}\alpha + \operatorname{ctg}\alpha = 2{,}5$. Oblicz:

a) $\operatorname{tg}^2\alpha + \operatorname{ctg}^2\alpha$ b) $\operatorname{tg}^4\alpha + \operatorname{ctg}^4\alpha$.

18. Kąt α jest kątem rozwartym oraz $\sin\alpha + \cos\alpha = \frac{2}{3}$. Oblicz:

a) $\sin\alpha - \cos\alpha$ b) $\sin^4\alpha + \cos^4\alpha$.

19. Oblicz wartość wyrażenia:

a) $\operatorname{tg}15° \cdot \operatorname{tg}75° \cdot \operatorname{tg}135°$ b) $\operatorname{tg}120° \cdot \operatorname{tg}130° \cdot \operatorname{tg}140°$

D 20. Wykaż, że:

a) $(\sin 15° + \cos 165°)^2 + 2 \cdot \sin 75° \cdot \cos 75° = 1$

b) $(\sin 130° + \cos 50°)^2 - 2 \cdot \sin 40° \cdot \cos 40° = 1$

D 21. Wykaż, że jeśli α jest kątem ostrym i $\frac{3(\sin\alpha - 8\cdot\cos\alpha)}{4\cdot\cos\alpha - 5\cdot\sin\alpha} = 7$, to $\alpha = 45°$.

D 22. Wykaż, że jeśli suma cosinusów wszystkich kątów trójkąta prostokątnego jest równa $\frac{3\sqrt{5}}{5}$, to iloczyn sinusów tych kątów jest równy $\frac{2}{5}$.

D 23. Wykaż, że jeśli $a = 3\sqrt[4]{9^{\cos 240°}}$ i $b = \left(\sqrt{\operatorname{tg} 210°}\right)^3$, to $a \cdot b = 1$.

D 24. Wykaż, że dana równość jest tożsamością trygonometryczną. Podaj konieczne założenia.

a) $(1+\sin\alpha)\cdot\left(\frac{1}{\cos\alpha} - \frac{1}{\operatorname{ctg}\alpha}\right) = \cos\alpha$

b) $(1-\cos\alpha)\cdot\left(\frac{1}{\sin\alpha} + \frac{1}{\operatorname{tg}\alpha}\right) = \sin\alpha$

D 25. Wykaż, że jeśli α jest kątem ostrym i $2\cos^2\alpha + 5\sin^2\alpha = 4$, to $\left(\operatorname{tg}\alpha + \operatorname{ctg}\alpha\right)^2 = 4{,}5$.

6. Geometria analityczna

Odcinek w układzie współrzędnych

6.1. Oblicz długość odcinka AB, jeśli:

a) $A(3, 7)$, $B(-8, 7)$

b) $A(-5, -2)$, $B(-5, 7)$

c) $A(1, 9)$, $B(-7, -6)$

d) $A(10, 6)$, $B(4, 0)$

e) $A\left(\sqrt{5}+2, \sqrt{5}\right)$, $B(1, -1)$

f) $A\left(3\frac{1}{3}, -5\right)$, $B\left(\frac{2}{3}, -3\right)$.

6.2. Wyznacz współrzędne środka odcinka AB, jeśli:

a) $A(0, 4)$, $B(-2, 0)$

b) $A(-3, 1)$, $B(3, 5)$

c) $A(4, -1)$, $B(-10, 9)$

d) $A\left(\sqrt{2}, -3\right)$, $B\left(\sqrt{2}, 7\right)$.

6.3. Dane są dwa wierzchołki równoległoboku $ABCD$ i punkt P przecięcia się przekątnych. Oblicz współrzędne pozostałych wierzchołków równoległoboku, jeśli:

a) $A(-3, 5)$, $B(-2, -1)$, $P(3, 1)$

b) $B(4, -2)$, $C(2, 7)$, $P(-1, 2)$.

Narysuj równoległobok $ABCD$ w układzie współrzędnych.

6.4. Dane są trzy wierzchołki równoległoboku $ABCD$. Oblicz współrzędne czwartego wierzchołka oraz współrzędne punktu P przecięcia przekątnych, jeśli:

a) $A(4, 1)$, $B(2, 6)$, $C(-8, 3)$

b) $A(-5, -2)$, $B(3, 1)$, $D(-2, 5)$.

Narysuj równoległobok $ABCD$ w układzie współrzędnych.

6.5. Oblicz długości przekątnych równoległoboku $ABCD$, jeśli:

a) $A(5, 1)$, $B(8, -3)$, $C(3, 9)$

b) $A(-4, -5)$, $B(5, -3)$, $D(-3, 3)$.

6.6. Oblicz długości boków równoległoboku $ABCD$, jeśli dane są dwa jego wierzchołki i punkt P przecięcia się przekątnych.

a) $A(4, -6)$, $B(9, -6)$, $P(7, -2)$

b) $A(-3, -5)$, $P(2, -1)$, $D(-1, 3)$

6.7. Dany jest trójkąt ABC, gdzie: $A(-4, -1)$, $B(4, 5)$, $C(2, 9)$. Oblicz długość środkowej:

a) AD b) BE c) CF.

6.8. Wyznacz współrzędne punktów podziału odcinka AB:

a) na cztery odcinki równej długości, jeśli $A(-5, -7)$, $B(3, 5)$,

b) na trzy odcinki równej długości, jeśli $A(2, -3)$, $B(-10, 3)$,

c) na sześć odcinków równej długości, jeśli $A(-1, 3)$, $B(5, 15)$.

6.9. Oblicz współrzędne punktu S przecięcia środkowych w trójkącie ABC, jeśli:

a) $A(0, 0)$, $B(9, 0)$, $C(0, 6)$

b) $A(-4, 0)$, $B(-2, -5)$, $C(0, 2)$

c) $A(-2, 7)$, $B(1, 2)$, $C(4, 0)$

d) $A(-4, -6)$, $B(2, -11)$, $C(5, 5)$.

6.10. W trójkącie ABC dane są wierzchołki: $A(-5, -2)$, $B(7, 4)$, $C(1, 7)$. Na bokach AB, BC i AC tego trójkąta zaznaczono odpowiednio punkty D, E, F w taki sposób, że $|AD| : |DB| = |BE| : |EC| = |CF| : |FA| = 1 : 2$. Oblicz współrzędne tych punktów.

D 6.11. Wykaż, że trójkąt o wierzchołkach $A(0,2)$, $B(6, -2)$, $C(7, 6)$ jest równoramienny.

D 6.12. Wykaż, że trójkąt o wierzchołkach $A(-2,-3)$, $B(4, 1)$, $C(2, 4)$ jest prostokątny.

D 6.13. Dane są punkty: $A(-2, 0)$, $B(3, 1)$, $C(4, 6)$, $D(-1, 5)$. Wykaż, że czworokąt $ABCD$ jest rombem.

D 6.14. Korzystając z własności wektorów wykaż, że jeśli $A(0, -1)$, $B(6, 1)$, $C(3, 5)$, $D(-3, 3)$, to czworokąt $ABCD$ jest równoległobokiem.

D 6.15. Korzystając z własności wektorów wykaż, że jeśli $A(-3, 4)$, $B(6, 1)$, $C(6, 4)$, $D(3, 5)$, to czworokąt $ABCD$ jest trapezem.

Równanie kierunkowe prostej

6.16. Wyznacz współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez punkty A i B.

a) $A(2, -3)$, $B(6, 7)$ b) $A(-4, 1)$, $B(2, 7)$

c) $A\left(\frac{-3}{4}, -1\right)$, $B\left(\frac{-1}{4}, 8\right)$ d) $A\left(\frac{1}{8}, 1\frac{1}{2}\right)$, $B\left(\frac{1}{4}, \frac{-1}{2}\right)$

6.17. Prosta k przechodzi przez punkt A, a jej współczynnik kierunkowy jest równy a. Wyznacz równanie kierunkowe prostej k.

a) $a = -3$ $A(5, 6)$
b) $a = 2$ $A(-10, 12)$
c) $a = \frac{1}{3}$ $A(-1, -9)$
d) $a = -\frac{3}{4}$ $A(24, -36)$

6.18. Napisz równanie kierunkowe prostej, przechodzącej przez punkty A i B.

a) $A(-10, 58)$, $B(2, 22)$
b) $A(-8, -95)$, $B(4, 25)$
c) $A(-10, 7)$, $B(5, -3)$
d) $A(-6, -2)$, $B(24, 4)$

6.19. Dane jest równanie prostej k. Podaj miarę kąta nachylenia tej prostej do osi OX.

a) $k: y = x - 1$
b) $k: y = \sqrt{3}x + \sqrt{2}$
c) $k: y = 1 - \sqrt{3}x$
d) $k: y = -x + 2$
e) $k: y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{1}{2}$
f) $k: y = -\frac{3 - 2\sqrt{3}x}{6}$

6.20. Dane są punkty A i B. Podaj, z dokładnością do jednego stopnia, miarę kąta nachylenia prostej AB do osi OX.

a) $A(-4, 2)$, $B(1, 8)$
b) $A(5, 6)$, $B(9, -4)$
c) $A(12, -3)$, $B(6, 15)$
d) $A(2, -3)$, $B(-1, -19)$

6.21. Wyznacz równanie kierunkowej prostej k, przechodzącej przez punkt P i nachylonej do osi OX pod kątem α.

a) $P(0, 0)$, $\alpha = 135°$
b) $P(0, 6)$, $\alpha = 30°$
c) $P(4, 0)$, $\alpha = 120°$
d) $P(3, -4)$, $\alpha = 45°$
e) $P(-2\sqrt{3}, 5)$, $\alpha = 60°$
f) $P(\sqrt{6}, \sqrt{8})$, $\alpha = 150°$

6.22. Dany jest trójkąt o wierzchołkach: $A(-4, 3)$, $B(4, -5)$ i $C(8, 1)$. Wyznacz:

a) równania kierunkowe prostych, zawierających środkowe AD, BE i CF,

b) współrzędne punktu przecięcia tych prostych.

6.23. Wyznacz liczbę a wiedząc, że prosta m jest równoległa do prostej k.

a) $k: y = (2a - 3)x + 4$, $m: y = -4x + 7$
b) $k: y = 3x + a$, $m: y = 4 + (4 + a)x$
c) $k: y = (1 - a)x$, $m: y = (2a - 5)x - 9$
d) $k: y = 8$, $m: y = (a - 10)x + 7$

6.24. Dana jest prosta m: $y = -2x - 1$.

a) Napisz równanie prostej k, równoległej do prostej m i przechodzącej przez punkt $(-1, 5)$.

b) Naszkicuj obydwie proste w układzie współrzędnych.

c) Sprawdź algebraicznie, że proste k i m nie mają punktów wspólnych.

6.25. Napisz równanie kierunkowe prostej m, równoległej do prostej k i przechodzącej przez punkt A.

a) k: $y = 2$, $A(3, -5)$

b) k: $y = \frac{3}{4}x$, $A(-8, 3)$

c) k: $y = -2x + 5$, $A(-0{,}5; 4)$

d) k: $y = 0{,}125x - 1$, $A(16, 20)$

6.26. Wyznacz a wiedząc, że prosta k jest prostopadła do prostej m.

a) k: $y = 3x + 6$, m: $y = ax - 8$

b) k: $y = (-0{,}25a + 3)x + 2$, m: $y = 4x - 8$

c) k: $y = 5 + (4 - 2a)x$, m: $y = -\frac{2}{3}x + 11$

d) k: $y = -x + 3a\sqrt{5}$, m: $y = \left(2a - \sqrt{5}\right)x - 19a$

6.27. Dane jest równanie prostej m: $y = 2x - 2$.

a) Napisz równanie prostej k, która jest prostopadła do prostej m i przechodzi przez punkt $(0, 3)$.

b) Oblicz współrzędne punktu wspólnego tych prostych.

c) Naszkicuj proste k i m w układzie współrzędnych; następnie zaznacz ich wspólny punkt.

6.28. Napisz równanie kierunkowe prostej m, prostopadłej do prostej k i przechodzącej przez punkt A.

a) k: $y = -\frac{2}{3}x$, $A(-4, 1)$

b) k: $y = -x + 8$, $A\left(2\sqrt{3}, -\sqrt{3}\right)$

c) k: $y = 4x - 1$, $A(2, 9)$

d) k: $y = 0{,}75x + 3$, $A(6, -4)$

6.29. Dany jest trójkąt o wierzchołkach $A(-4, -2)$, $B(4, -1)$, $C(-2, 2)$.

a) Napisz równania kierunkowe prostych AB, BC, AC.

b) Czy trójkąt ABC jest prostokątny? Odpowiedź uzasadnij.

6.30. Wyznacz równanie symetralnej odcinka o końcach A, B.

a) $A(-4, -1)$, $B(4, -3)$
b) $A(-4, -3)$, $B(2, 3)$
c) $A(0, 3)$, $B(4, -5)$
d) $A(1, -3)$, $B(7, 1)$

D 6.31. Wykaż, że prosta k: $y = -3x + 5$ jest symetralną odcinka o końcach $A(-1, -2)$ i $B(5, 0)$.

D 6.32. Dane są punkty $A(-5, -4)$, $B(1, -1)$, $C(-3, 2)$. Wykaż, że wysokość trójkąta ABC, poprowadzona z wierzchołka C, zawiera się w prostej k: $y = -2x - 4$.

D 6.33. Dane są punkty: $A(-1, 2)$, $B(-6, -1)$, $C(5, 1)$, $D(10, 4)$. Korzystając z własności prostych, opisanych równaniami kierunkowym, wykaż, że czworokąt $ABCD$ jest równoległobokiem.

D 6.34. Dane są punkty: $A(-1, -3)$, $B(5, 0)$, $C(3, 4)$, $D(-3, 1)$. Korzystając z własności prostych, opisanych równaniami kierunkowymi wykaż, że czworokąt $ABCD$ jest prostokątem.

D 6.35. Dane są punkty: $A(-4, 1)$, $B(0, -2)$, $C(3, 2)$, $D(-1, 5)$. Korzystając z własności prostych, opisanych równaniami kierunkowymi wykaż, że czworokąt $ABCD$ jest kwadratem.

c) k: $y = 3 + p - 4x$, m: $y = \frac{1}{8}|p+8|x - p^2$

Równanie ogólne prostej

6.36. Dane jest równanie prostej k. Przedstaw to równanie w postaci ogólnej.

a) $\frac{x}{3} = \frac{12-x}{3}$
b) $y = \frac{-x+5}{4}$
c) $y + \frac{x-1}{2} = \frac{x+2}{3}$

6.37. Punkty A i B należą do prostej k. Wyznacz równanie ogólne prostej k.

a) $A(0, 8)$, $B(2, 4)$
b) $A(3, -4)$, $B(11, -4)$
c) $A(-3, 2)$, $B(4, 9)$
d) $A(-2, 6)$, $B(\sqrt{2}, -3\sqrt{2})$

6.38. Do prostej należą punkty P i Q. Korzystając z równania prostej przechodzącej przez dwa dane punkty, wyznacz równanie ogólne tej prostej.

a) $P(0, -4)$, $Q(3, 1)$

b) $P\left(\sqrt{5}, -3\right)$, $Q\left(\sqrt{5}, 8\right)$

c) $P(2, 2)$, $Q(-1, 0)$

d) $P(3, 1)$, $Q(-1, -7)$

6.39. Dane jest równanie ogólne prostej. Podaj miarę kąta, jaki tworzy ta prosta z osią OX.

a) $x + y - 7 = 0$

b) $\sqrt{3}x - y + 90 = 0$

c) $\sqrt{3}x + y + 1 = 0$

d) $\sqrt{3}x - 3y + 15 = 0$

e) $x - \sqrt{3} = 0$

f) $3y - \sqrt{3} = 0$

6.40. Dane są równania ogólne prostych k i m. Czy proste k i m są równoległe? Odpowiedź uzasadnij.

a) $k: 2x - 3y + 6 = 0$, $m: -x + 1\frac{1}{2}y - 2 = 0$

b) $k: 3x - 4 = 0$, $m: 2y + 5 = 0$

c) $k: 7x + 21y - 3 = 0$, $m: x - 3y - 1 = 0$

d) $k: 2x + 7 = 0$, $m: 3x - 5 = 0$

6.41. Napisz równanie ogólne prostej m równoległej do prostej:

a) $k: 3x - 2y + \sqrt{3} = 0$ i przechodzącej przez punkt $P(-1, 1)$

b) $k: 4x + 9y = 0$ i przecinającej oś OY w punkcie $P(0, 5)$

c) $k: 2x - 11 = 0$ i przecinającej oś OX w punkcie $P(-4, 0)$

d) $k: y - 5 = 0$ i przechodzącej przez punkt $P\left(7, \sqrt{2}\right)$.

6.42. Dane są równania ogólne prostych k i m. Czy proste k i m są prostopadłe? Odpowiedź uzasadnij.

a) $k: 5x + 3y - 2 = 0$, $m: -15x + 25y + 10 = 0$

b) $k: 5x + 7 = 0$, $m: 3y - 2 = 0$

c) $k: 4x - 20y + 30 = 0$, $m: 15x - 3y - 2 = 0$

d) $k: -\frac{2}{3}x - \frac{3}{4}y + 1 = 0$, $m: 1{,}5x - 1\frac{1}{3}y + 2\frac{1}{5} = 0$

6.43. Napisz równanie ogólne prostej m prostopadłej do prostej:

a) $k: 5x - y + 3 = 0$ i przechodzącej przez punkt $P(-1, 2)$

b) $k: y + 4 = 0$ i przechodzącej przez punkt $P\left(-\sqrt{7}, \sqrt{2}\right)$

c) k: $10x - 7 = 0$ i przechodzącej przez punkt $P(3, 8)$

d) k: $-3x + 2y = 0$ i przecinającej oś OY w punkcie $P(0, -2)$.

6.44. Oblicz brakujące współczynniki w równaniu ogólnym prostej m, wiedząc, że:

a) prosta m: $Ax - 2y + C = 0$ jest równoległa do prostej k: $5x + 14y - 1 = 0$ i przechodzi przez punkt $P(7, 0)$

b) prosta m: $x + By + C = 0$ jest równoległa do prostej k: $-3x + 4y - 5 = 0$ i przechodzi przez punkt $P(1, -3)$

c) prosta m: $3x + By + C = 0$ jest prostopadła do prostej k: $-20x + 15y - 7 = 0$ i przechodzi przez początek układu współrzędnych

d) prosta m: $Ax + y + C = 0$ jest prostopadła do prostej k: $2x + 4y - 13 = 0$ i przechodzi przez punkt $P\left(\frac{1}{2}, 7\right)$.

6.45. Wyznacz równanie ogólne symetralnej odcinka AB.

a) $A(-4, 5)$, $B(6, 1)$

b) $A(0, 7)$, $B(0, -3)$

c) $A(-1, -2)$, $B(3, 2)$

d) $A(-1, 8)$, $B(-5, 8)$

Równanie okręgu

6.46. Napisz równanie okręgu o środku w punkcie S i promieniu r w postaci kanonicznej.

a) $S(0, 0)$, $r = 3$

b) $S(0, -2)$, $r = \sqrt{5}$

c) $S(4, 0)$, $r = 2{,}5$

d) $S(-3, 1)$, $r = \sqrt{2}$

e) $S(3, -2)$, $r = \frac{1}{3}$

f) $S\left(-\sqrt{3}, -\sqrt{2}\right)$, $r = 4$

6.47. Poniższe równania opisują okrąg o środku w punkcie S i promieniu r. Podaj współrzędne punktu S i promień tego okręgu.

a) $x^2 + y^2 = 1$

b) $(x - 1)^2 + y^2 = 2{,}25$

c) $(1 + x)^2 + (2 - y)^2 = 25$

d) $(-x - 3)^2 + (-1 - y)^2 = 81$

6.48. Wyznacz współrzędne środka i promień okręgu opisanego równaniem:

a) $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$

b) $x^2 + y^2 + 6x + 10y + 33 = 0$

c) $x^2 + y^2 - 8x + 7 = 0$

d) $x^2 + y^2 - 2\sqrt{3}y - 6 = 0$

e) $x^2 + y^2 - 2x - 6y + 9 = 0$

f) $x^2 + y^2 + 4y - 5 = 0$

6.49. Wyznacz współrzędne środka i promień okręgu opisanego równaniem:

a) $x^2+y^2-x-0,5y-\frac{59}{16}=0$

b) $x^2+y^2-\sqrt{8}y-6=0$

c) $x^2+y^2+x-\frac{1}{2}y-\frac{11}{16}=0$

d) $x^2+y^2-3x+y-1,5=0$

6.50. Czy równanie $x^2+y^2-6x+2y+10=0$ opisuje okrąg? Odpowiedź uzasadnij.

6.51. Dane jest równanie okręgu oraz punkty A, B, C. Sprawdź algebraicznie, które z tych punktów należą do okręgu. Następnie narysuj okrąg w układzie współrzędnych i zaznacz punkty A, B, C.

a) $(x+4)^2+(y-3)^2=25$, $A(-1, 7)$, $B(1, 3)$, $C(-2, 6)$

b) $x^2+y^2+8x+2y+16=0$, $A(-4, 0)$, $B(-3, -2)$, $C(-5, -1)$

6.52. Punkt A należy do okręgu o środku w punkcie S. Napisz równanie tego okręgu.

a) $S(0, 0)$, $A(3, 4)$

b) $S(2, 1)$, $A(4, 2)$

c) $S(-3, 2)$, $A(3, 10)$

d) $S(-2, 1)$, $A(4, 7)$

6.53. W prostokątnym układzie współrzędnych zilustruj zbiory:

$A=\{(x, y) : x \in \mathbf{R} \wedge y \in \mathbf{R} \wedge x^2+y^2+6x-8y+21=0\}$

$B=\{(x, y) : x \in \mathbf{R} \wedge y \in \mathbf{R} \wedge x^2+y^2+2x+2y-14=0\}$,

a następnie wyznacz zbiory: $A \cup B$, $A-B$, $B-A$, $A \cap B$.

6.54. Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkty A i B, jeśli jego środek należy do prostej k.

a) $A(5, 10)$, $B(3, 12)$, k: $y=-2x-2$

b) $A(6, 4)$, $B(-1, 3)$, k: $y=\frac{1}{2}x-1\frac{1}{2}$

c) $A(3, 0)$, $B(4, 1)$, k: $y=2x+4$

d) $A(7, 4)$, $B(-5, -12)$, k: $y=x-5$

6.55. Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkty A, B, C, jeśli:

a) $A(-1, 0)$, $B(7, 0)$, $C(0, 1)$

b) $A(1, 3)$, $B(5, 1)$, $C(4, 4)$

c) $A(1, 5)$, $B(8, -2)$, $C(9, 1)$

d) $A(-14, -1)$, $B(3, 16)$, $C(11, 4)$

D 6.56. Udowodnij, że jeśli $a \neq b$, to równanie $x^2+y^2-ax+2by-0,75a^2+2ab=0$ opisuje okrąg. Podaj współrzędne środka S i promień r okręgu.

Wyznaczanie w układzie współrzędnych punktów wspólnych prostych, okręgów i parabol

6.57. Rozwiąż algebraicznie układ równań i przedstaw jego interpretację graficzną.

a) $\begin{cases} x-y=1 \\ y=x^2-6x+9 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x-y=0 \\ y=-2(x-1)^2+6 \end{cases}$

c) $\begin{cases} y=-0,5x^2-2x+3 \\ -2x+y=11 \end{cases}$

d) $\begin{cases} y=\frac{1}{4}x^2+x \\ -5x+2y=-4 \end{cases}$

6.58. Rozwiąż algebraicznie układ równań i przedstaw jego interpretację graficzną.

a) $\begin{cases} (x-1)^2+(y-3)^2=8 \\ x-2=y \end{cases}$

b) $\begin{cases} (x-3)^2+(y+1)^2=16 \\ x+y=6 \end{cases}$

c) $\begin{cases} (x+3)^2+(y-2)^2=17 \\ 5x+3y=-26 \end{cases}$

d) $\begin{cases} (x+3)^2+(y+2)^2=8 \\ 4x+y=-2 \end{cases}$

6.59. Przedstaw interpretację graficzną danego układu równań w układzie współrzędnych. Następnie rozwiąż ten układ algebraicznie.

a) $\begin{cases} 3x+y=-13 \\ y=x^2+6x+7 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x^2+y^2-6x-4y+8=0 \\ x+3y=4 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x^2+y^2-4x-2y+1=0 \\ y=2x-5 \end{cases}$

d) $\begin{cases} y+x^2+8x=-14 \\ y=4x+22 \end{cases}$

6.60. Wyznacz współrzędne punktów wspólnych (o ile istnieją) prostej k i okręgu o.

a) $k\colon y=\frac{1}{3}x-1$, $o\colon x^2+y^2=9$

b) $k\colon y=1$, $o\colon (x+5)^2+y^2=1$

c) $k\colon x+y=-x-8$, $o\colon x^2+y^2+6x+2y=0$

d) $k\colon x+2y+4=0$, $o\colon x^2+y^2+8x+4y+19=0$

Czy prosta k jest sieczną okręgu, jest rozłączna z okręgiem, czy jest styczną do tego okręgu?

6.61. Wyznacz współrzędne punktów wspólnych (o ile istnieją) prostej k i paraboli p.

a) $k: x + y = 0$, $p: y = x^2 - 2$

b) $k: y = x + 3$, $p: y = -2x^2 + 8x - 4$

c) $k: x - 2y + 7 = 0$, $p: y = \frac{1}{2}(x+1)^2$

d) $k: 2x - y - 11 = 0$, $p: y = x^2 - 6x + 5$

6.62. Zapisz równania dwóch krzywych znajdujących się na rysunku poniżej. Następnie oblicz współrzędne punktów wspólnych tych krzywych, wiedząc, że rysunek przedstawia:

a) okrąg o środku S i prostą k



b) okrąg o środku S i prostą k



c) parabolę p i prostą k



d) parabolę p i prostą k



Zastosowanie układów równań do rozwiazywania zadań z geometrii analitycznej

6.63. Dane są punkty $A(-6, 3)$ oraz $B(0, 5)$. Na prostej k: $x - 2y + 4 = 0$ wyznacz współrzędne punktu C, który jest równoodległy od punktów A i B.

6.64. Dane są punkty: $A(0, 2)$, $B(2, 4)$, $C(6,2)$. Wyznacz:

a) równania symetralnych odcinków AB i BC,

b) współrzędne punktu przecięcia się tych symetralnych,

c) odległość punktu przecięcia się tych symetralnych od punktów A, B, C.

6.65. Boki trójkąta zawierają się w prostych: k: $x - 3y + 5 = 0$, l: $x + 2y + 5 = 0$, m: $3x + y - 5 = 0$.

D a) Wykaż, że trójkąt jest prostokątny.

b) Wyznacz współrzędne wierzchołków tego trójkąta.

6.66. Dane są punkty $A(-4, -2)$, $B(3, -1)$, $C(2, 4)$, $D(-3, 3)$. Oblicz współrzędne punktu przecięcia się przekątnych tego czworokąta.

6.67. Prosta k: $y = -3x + 8$ przecina okrąg o środku w punkcie $(1, 0)$ i promieniu 5 w punktach A i B. Oblicz:

a) współrzędne punktów A i B b) długość cięciwy AB.

6.68. Prosta k: $x - y + 1 = 0$ przecina parabolę p: $y = -0{,}5x^2 + 5$ w punktach A i B. Napisz równanie okręgu, którego średnicą jest odcinek AB.

6.69. Punkty $A(-4, 0)$, $B(4, 4)$, $C(-5, 7)$ są wierzchołkami trójkąta. Odcinek CD jest wysokością tego trójkąta. Oblicz:

a) współrzędne punktu D b) długość wysokości CD.

6.70. Punkty $A(-4, 3)$, $B(2, 0)$, $C(2, 5)$ są wierzchołkami trójkąta. Wyznacz:

a) równania prostych, zawierających wysokości poprowadzone z wierzchołków A i C,

b) punkt przecięcia się wysokości trójkąta (ortocentrum).

6.71. Dany jest okrąg o: $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 1 = 0$.

D a) Wykaż, że prosta k: $y - 6 = 0$ jest styczna do okręgu. Oblicz współrzędne punktu styczności.

b) Wyznacz na stycznej punkty, których odległość od środka okręgu jest równa 5. Oblicz odległość tych punktów od punktu styczności.

6.72. Dana jest parabola p: $y = x^2 - 3$.

a) Wyznacz współrzędne punktów A i B, będących punktami przecięcia się paraboli p z prostą k: $x - y + 3 = 0$.

b) Wyznacz współrzędne punktów C i D, będących punktami przecięcia się paraboli p z prostą m: $y + 2x = 0$.

D c) Wykaż, że odcinki AB i CD przecinają się w środku odcinka CD.

6.73. Dany jest okrąg o: $x^2 + y^2 - 6y = 0$ oraz punkt $A(0, 6)$.

D a) Wykaż, że punkt A należy do okręgu o.

b) Wyznacz równanie prostej k, nachylonej do osi OX pod kątem $60°$ i przechodzącej przez punkt A.

c) Oblicz współrzędne punktu B, będącego drugim punktem przecięcia prostej k z danym okręgiem.

d) Wyznacz na okręgu punkt C tak, aby trójkąt ABC był równoboczny.

6.74. Punkty A, B, C należą do paraboli p: $y = \frac{1}{4}(x-4)^2$ i są wierzchołkami trójkąta równoramiennego. Wiedząc, że punkt C jest wierzchołkiem paraboli oraz $|\sphericalangle ACB| = 120°$, wyznacz współrzędne punktów A, B, C.

Test sprawdzający do rozdziału 6.

1. Dane są trzy kolejne wierzchołki równoległoboku $ABCD$: $A(2, -2)$, $B(4, 2)$, $C(-2, 3)$. Wówczas wierzchołek D ma współrzędne:

A. $(0, 7)$ B. $(-4, -1)$ C. $(8, -3)$ D. $(-5, 0)$

2. Prostą k na rysunku poniżej można opisać równaniem kierunkowym $y = ax + b$. Wówczas:

A. $a = -2$ B. $a = -1{,}5$ C. $a = -1$ D. $a = 1$



3. Do prostej k należą punkty: $(-1, 2)$, oraz $(-1, -4)$. Zatem prostą k opisuje równanie:

A. $y = 2x - 4$ B. $y + 1 = 0$ C. $x + 1 = 0$ D. $-x + 2y - 4 = 0$

4. Wskaż równanie prostej, równoległej do prostej k: $2x - y + 4 = 0$.

A. $-4x + 2y = 0$ B. $2x + y - 4 = 0$ C. $2x + 4 = 0$ D. $x + 2y + 4 = 0$

5. Wskaż równanie prostej, prostopadłej do prostej k: $y = 4x - 1$.

A. $y = 4x + 1$ B. $y = -4x - 1$ C. $y = 0{,}25x + 1$ D. $y = -0{,}25x - 1$

6. Równanie $y^2 = 4 - (x - 3)^2$ opisuje:

A. okrąg o środku w punkcie $(-3, 0)$ i promieniu 4

B. okrąg o środku w punkcie $(3, 0)$ i promieniu 2

C. parabolę, której wierzchołkiem jest punkt $(3, 4)$

D. sumę dwóch prostych: $y = -x + 5$ oraz $y = x - 1$

7. Proste k: $-2x + y - 3 = 0$ oraz m: $3x - y + 2 = 0$ przecinają się w punkcie o współrzędnych:

A. $(1, 5)$ B. $(-2, 3)$ C. $(5, 13)$ D. $(-1, 1)$

8. Kąt nachylenia prostej k: $\sqrt{3}x + 3y - 1 = 0$ do osi OX jest równy:

A. $30°$ B. $60°$ C. $120°$ D. $150°$

9. Wskaż równanie ogólne prostej, której nie można opisać równaniem kierunkowym.

A. $y + 5 = 0$ B. $x - \sqrt{2} + 1 = 0$ C. $2x + \sqrt{3}y = 0$ D. $2y - \sqrt{5} + 2 = 0$

10. Dane są punkty $A(-3, 4)$, $B(6, 7)$. Punkt P należy do odcinka AB oraz $|AP| : |PB| = 1 : 2$. Zatem:

A. $P(3, 6)$ B. $P\left(1\frac{1}{2}, 5\frac{1}{2}\right)$ C. $P(0, 5)$ D. $P\left(-1, 4\frac{2}{3}\right)$

11. Wskaż równanie prostej, prostopadłej do prostej k: $x - 2y + 4 = 0$ i przechodzącej przez punkt $(0, 3)$.

A. $4x + 2y - 6 = 0$ B. $2x + y + 3 = 0$

C. $x + 2y - 3 = 0$ D. $0{,}5x + y - 3 = 0$

12. Dane jest równanie okręgu: $x^2 + y^2 + 10x - 6y - 2 = 0$. Promień tego okręgu jest równy:

A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. 6 D. $4\sqrt{2}$

13. Odległość punktu $A(-2, 1)$ od środka okręgu o: $(x-2)^2 + (y+2)^2 = 9$ jest równa:

A. $\sqrt{17}$ B. 3 C. $2\sqrt{5}$ D. 5

14. Układ równań $\begin{cases} x^2+y^2=1 \\ x+y=\sqrt{2} \end{cases}$:

A. ma jedno rozwiązanie
B. ma dwa rozwiązania
C. nie ma rozwiązań
D. ma nieskończenie wiele rozwiązań

15. Prosta k: $y = 2x + 1$ przecina parabolę p: $y = (x-1)^2$ w punktach A i B. Środek odcinka AB ma współrzędne:

A. $(0, 5)$ B. $(2, 5)$ C. $(1, 3)$ D. $(1, 5)$

Zadania powtórzeniowe do rozdziału 6.

16. Punkt $S(2, 1)$ jest środkiem ciężkości trójkąta ABC, a punkt $D(1, 3)$ jest środkiem odcinka AB. Oblicz współrzędne punktu C.

D 17. Dane są punkty: $A(-3, -1)$, $B(1, 4)$, $C(-1,7)$, $D(-5, 2)$. Wykaż, że czworokąt $ABCD$ jest równoległobokiem.

D 18. Dane są punkty: $A(-6, 1)$, $B(3, -2)$, $C(4, 1)$, $D(-5, 4)$. Wykaż, że czworokąt $ABCD$ jest prostokątem.

D 19. Dane są punkty: $A(-6, 1)$, $B(-1, 2)$, $C(-4, 4)$. Wykaż, że trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym równoramiennym.

20. Wyznacz równanie:

a) prostej, równoległej do prostej k: $2x - 3y + 1 = 0$ i przechodzącej przez punkt $P(-17, 2)$,

b) prostej, prostopadłej do prostej k: $-x + 5y - 7 = 0$ i przechodzącej przez punkt $P(-3, 11)$.

21. Wyznacz równanie prostej, nachylonej do osi OX pod kątem α i przechodzącej przez punkt P, jeśli:

a) $\alpha = 30°$, $P(\sqrt{3}, -1)$ b) $\alpha = 120°$, $P(-\sqrt{6}, \sqrt{8})$ c) $\cos\alpha = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $P(9, -1)$

22. Wyznacz równanie ogólne prostej, do której należą punkty:

a) $A(5, -6)$, $B(-2, 8)$ b) $A(-3, 9)$, $B(-3, 12)$

23. Wyznacz równanie symetralnej odcinka AB, jeśli $A(-2, 0)$, $B(7, 3)$.

24. Dane są proste k: $ax + 2y - 4 = 0$ oraz m: $8x + ay - 12 = 0$. Wyznacz liczbę a, dla której te proste:

a) są równoległe b) są prostopadłe.

Sprawdź, czy dla wyznaczonej liczby a istnieje postać kierunkowa równania prostej k i równania prostej m.

25. Doprowadź równanie okręgu o: $x^2 + y^2 + 3x - 5y - 0{,}5 = 0$ do postaci kanonicznej. Podaj współrzędne środka i promień tego okręgu.

D 26. Dane są punkty: $A(-4, -5)$, $B(2, -5)$, $C(-2, -1)$. Wykaż, że środek okręgu opisanego na trójkącie ABC ma współrzędne $(-1, -4)$, a jego promień jest równy $\sqrt{10}$.

27. Dane są punkty $A(-4, 0)$, $B(2, -2)$ oraz prosta k: $x + y - 6 = 0$. Wyznacz na prostej k punkt C tak, aby $|AC| = |BC|$.

28. Dany jest punkt $C(-4, 4)$ oraz prosta k: $x - 5y + 11 = 0$. Wyznacz na prostej k punkty A i B spełniające warunek: $|AC| = |BC| = \sqrt{13}$.

29. Dane są punkty: $A(-2, 6)$, $B(-4, 0)$. Wyznacz na osi OY punkt C taki, że $|\sphericalangle ACB| = 90^\circ$.

30. Prosta k: $y = 3 - x$ przecina parabolę p: $y = x^2 + 6x + 9$ w punktach A i B.

a) Oblicz współrzędne punktów A i B.

D b) Wykaż, że oś symetrii paraboli przecina odcinek AB w punkcie, który dzieli ten odcinek w stosunku 3 : 2.

31. Rozwiąż dany układ algebraicznie. Następnie przedstaw ilustrację graficzną tego układu.

a) $\begin{cases} y = \frac{1}{2}x - 3 \\ (x-2)^2 + (y-3)^2 = 20 \end{cases}$ b) $\begin{cases} y = 2x - 4 \\ y = x^2 - 4x + 1 \end{cases}$

7. Geometria płaska – rozwiązywanie trójkątów, pole trójkąta, pole koła

Twierdzenie sinusów

7.1. Oblicz promień okręgu opisanego na trójkącie ABC, jeśli:

a) $|AC| = 3$ oraz $|\sphericalangle CBA| = 60°$

b) $|BC| = 4$ oraz $|\sphericalangle BAC| = 150°$

c) $|\sphericalangle A| = 72°$, $|\sphericalangle B| = 63°$, $|AB| = \sqrt{8}$

d) $|\sphericalangle B| + |\sphericalangle C| = 150°$, $|BC| = 13$.

7.2. W trójkącie ABC kąty są odpowiednio równe α, β, γ, a promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy R. Oblicz:

a) długość boku AB, jeśli $\alpha = 28°$, $\beta = 32°$ oraz $R = 8$ cm,

b) długość boku AC, jeśli $\alpha = 65°$, $\gamma = 83°$ oraz $R = 10$ cm.

7.3. W trójkącie ABC kąty są odpowiednio równe α, β, γ. Oblicz:

a) długość boku AC, jeśli $\alpha = 48°$, $\gamma = 70°$, $|BC| = 5$ cm,

b) długość boku AB, jeśli $\alpha = 17°$, $\gamma = 32°$, $|AC| = 7{,}55$ cm.

7.4. W trójkącie kąty są odpowiednio równe α, β, γ, a boki naprzeciw kątów mają odpowiednio długość a, b, c. Oblicz:

a) b, jeśli: $\sin\alpha = \frac{1}{5}$ i $\cos\beta = \frac{3}{5}$ oraz $a = 8$ cm,

b) c, jeśli: $\cos\alpha = -0{,}174$ i $\cos\gamma = 0{,}719$ oraz $a = 19{,}7$ cm.

7.5. W trójkącie ABC bok AB ma długość c, zaś kąty trójkąta przylegające do boku AB są równe α i β. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie, jeśli:

a) $c = 8$ cm i $\sin(\alpha+\beta) = \frac{2}{3}$

b) $c = 13{,}5$ cm i $\sin(\alpha+\beta) = \frac{3}{4}$

c) $c = 20$ cm i $\cos(\alpha+\beta) = -\frac{5}{13}$

d) $c = 15$ cm i $\cos(\alpha+\beta) = \frac{8}{17}$

7.6. Boki trójkąta leżące naprzeciw kątów α, β, γ mają odpowiednio długość a, b, c. Na trójkącie opisano okrąg o promieniu R. Oblicz:

a) R, jeśli $\operatorname{tg}\gamma = \frac{-3}{4}$, $c = 6$ cm,

b) a, jeśli $\operatorname{tg}\alpha = \frac{8}{15}$, $\cos\gamma = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, $c = 17$ cm,

c) c, jeśli $\operatorname{ctg}\alpha = 1$, $\cos\gamma = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $b = 9{,}66$ cm,

d) b, jeśli $\operatorname{tg}\alpha = \sqrt{3}$, $\cos\beta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $c = 19{,}32$ cm.

7.7. W trójkącie ABC mamy dane: $|AC| = 3\sqrt{3}$, $|BC| = 3$ oraz $|\sphericalangle A| = 30°$. Oblicz miary pozostałych kątów trójkąta.

7.8. W trójkącie ABC mamy dane: $|AB| = 12$, $|BC| = 6\sqrt{2}$ oraz $|\sphericalangle A| = 30°$. Oblicz miary pozostałych kątów trójkąta.

7.9. W trójkącie równoramiennym rozwartokątnym najdłuższy bok ma długość 6. Wiedząc, że promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy $2\sqrt{3}$, oblicz:

a) miary kątów trójkąta

b) obwód tego trójkąta.

7.10. W trójkącie rozwartokątnym ABC dane są długości boków: $|AB| = 3\sqrt{2}$, $|BC| = 3 - \sqrt{3}$, $|AC| = 2\sqrt{3}$. Wyznacz:

a) miarę kąta ACB,

b) promień okręgu opisanego na trójkącie ABC.

D 7.11. Wykaż, że jeśli dwa kąty trójkąta mają po 30°, to długość dwóch boków tego trójkąta jest równa promieniowi okręgu opisanego na tym trójkącie.

Twierdzenie cosinusów

7.12. Dane są długości boków a i b oraz kąt miedzy tymi bokami równy γ. Oblicz długość trzeciego boku, jeśli:

a) $a = 3$, $b = 9$, $\gamma = 120°$

b) $a = 2\sqrt{2}$, $b = 6$, $\gamma = 45°$.

7.13. Boki trójkąta ABC mają długość: $|AB| = 8$ cm, $|BC| = 6$ cm, $|AC| = 5$ cm. Oblicz cosinusy kątów tego trójkąta. Czy trójkąt jest ostrokątny, prostokątny, czy rozwartokątny?

7.14. Dane są długości boków trójkąta. Sprawdź, czy trójkąt jest ostrokątny, prostokątny czy rozwartokątny. Podaj miarę największego kąta tego trójkąta.

a) $a = 10$ cm, $b = 9$ cm, $c = 5$ cm

b) $a = 4$ cm, $b = 10$ cm, $c = 12$ cm

c) $a = 2\sqrt{2}$ cm, $b = \sqrt{26}$ cm, $c = 3\sqrt{2}$ cm

7.15. Długości boków trójkąta ABC są równe: $|AB| = \sqrt{14}$ cm, $|AC| = 3\sqrt{2}$ cm oraz $|BC| = \sqrt{2}$ cm. Wyznacz miarę kąta przy wierzchołku C.

7.16. Boki trójkąta ABC mają długość: $|BC| = 5$, $|AB| = 2\sqrt{2} - 1$ oraz $|AC| = 2\sqrt{2} + 1$. Oblicz miarę kąta przy wierzchołku A.

7.17. Boki równoległoboku mają długość a i b, a kąt ostry jest równy γ. Oblicz długość przekątnych tego równoległoboku, jeśli:

a) $a = 4$ cm, $b = 3\sqrt{2}$ cm, $\gamma = 45°$ b) $a = 3$ cm, $b = 5$ cm, $\gamma = 30°$.

7.18. Dwa boki trójkąta ABC mają długość: $|AB| = 7$ cm, $|BC| = 8$ cm. Wiedząc, że $|\sphericalangle C| = 60°$, oblicz długość boku AC.

7.19. W trójkącie ABC dwa boki mają długość: $|AB| = 2$ cm i $|AC| = 4$ cm, a sinus kąta BAC jest równy $\frac{\sqrt{15}}{4}$.

D a) Wykaż, że jeśli kąt BAC jest ostry, to trójkąt ABC jest równoramienny.

b) Oblicz długość boku BC w przypadku, gdy $|\sphericalangle BAC| \in (90°, 180°)$.

7.20. W trójkącie ABC mamy dane: $|AC| = 6$ cm, $|BC| = 4$ cm oraz $\sin|\sphericalangle ACB| = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. Oblicz obwód trójkąta ABC.

7.21. W trójkącie ABC mamy dane: $|AC| = 4$, $|BC| = |AB| - 2$ oraz $|\sphericalangle ACB| = 60°$. Oblicz obwód trójkąta ABC.

7.22. W trójkącie ABC bok AC jest o 6 cm dłuższy od boku AB oraz $|BC| = 5\sqrt{2}$ cm. Wiedząc, że $|\sphericalangle ABC| = 135°$, oblicz promień okręgu opisanego na trójkącie ABC.

7.23. W trójkącie ABC boki mają długość: $|AB| = 10$ cm, $|BC| = 2\sqrt{21}$ cm i $|AC| = 8$ cm. Oblicz długości środkowych CD i BE.

7.24. Boki trójkąta ABC mają długość: $|AB| = 18$ cm, $|BC| = 15$ cm oraz $|AC| = 12$ cm. Oblicz:

a) długość środkowej CD,

b) promień okręgu opisanego na trójkącie ADC.

7.25. Dwa boki trójkąta ABC mają długość: $|AC| = 10$ cm, $|BC| = 6$ cm. Wiedząc, że $|\sphericalangle ACB| = 60°$, oblicz długość środkowej CD.

Zastosowanie twierdzenia sinusów i twierdzenia cosinusów do rozwiązywania zadań

7.26. Rozwiąż trójkąt ABC, w którym $|AC| = |BC|$, $|AB| = 10$, a promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 8,5.

7.27. Rozwiąż trójkąt ABC, w którym:

a) $|AC| = 72$, $|BC| = 73$, $|\sphericalangle A| = 49°$

b) $|AC| = 72$, $|BC| = 70$, $|\sphericalangle A| = 49°$.

7.28. Rozwiąż trójkąt ABC, w którym:

a) $|BC| = 178$, $|AC| = 89$, $|\sphericalangle B| = 30°$

b) $|BC| = 160$, $|AC| = 89$, $|\sphericalangle B| = 30°$.

D 7.29. Wykaż, że nie istnieje trójkąt ABC, w którym $|BC| = 179$, $|AC| = 89$, $|\sphericalangle B| = 30°$.

7.30. Boki trójkąta mają długość a, b, c, kąty są odpowiednio równe α, β, γ, a R jest promieniem okręgu opisanego na tym trójkącie. Rozwiąż ten trójkąt, jeśli:

a) $a = \sqrt{6}$, $b = 2$, $\beta = 45°$

b) $a = 2$, $b = \sqrt{2}$, $\alpha = 45°$

c) $R = c = 5$, $\alpha = 60°$

d) $R = 3$, $a = \sqrt{27}$, $\beta = 45°$, $c < b$.

7.31. Na rysunku obok punkty A, B, C, D należą do okręgu o środku O oraz $|AD| = |DC|$. Wiedząc, że $|BC| = 8$, $|AC| = |AB| + 6$ i $|\sphericalangle ABC| = 120°$, oblicz obwód czworokąta $ABCD$.



7.32. W trójkącie prostokątnym równoramiennym ABC przyprostokątne mają długość: $|AC| = |BC| = \sqrt{2}$. Punkty D, E należą do przeciwprostokątnej AB oraz $|\sphericalangle ACD| = |\sphericalangle DCE| = |\sphericalangle ECB|$. Oblicz długości odcinków AD, DE, EB.



D 7.33. Wykaż, że jeśli α, β są miarami dwóch kątów trójkąta, a R – promieniem okręgu opisanego na tym trójkącie, to obwód trójkąta jest równy $2R\left[\sin\alpha + \sin\beta + \sin(\alpha+\beta)\right]$.

D 7.34. Boki trójkąta mają długość a, b, c, a kąty są odpowiednio równe α, β, γ. Wykaż, że jeśli $a : b : c = 4 : 5 : 6$, to $\cos\beta = \cos^2\alpha$.

D 7.35. W trójkącie ABC poprowadzono środkową CD. Wykaż, że jeśli $|\sphericalangle BDC| = 60°$, to $|AC|^2 - |BC|^2 = |AB| \cdot |CD|$.

Pole figury płaskiej

7.36. Pole jednej kratki jest równe 1. Oblicz pola poniższych figur.

a)



b)



c)



d)



7.37. Na rysunku obok dane są trzy figury: kwadrat, trójkąt równoboczny i koło, których pola są odpowiednio równe: s, t, w. Wyraź pola figur umieszczonych poniżej za pomocą pól s, t, w.



a)



b)



c)



d)



Pole trójkąta, cz. 1

7.38. Wyznacz wysokość trójkąta równobocznego, którego pole jest równe $3\sqrt{3}$ cm^2.

7.39. Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym jest o 4 cm dłuższy od promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt. Oblicz:

a) wysokość trójkąta

b) pole tego trójkąta.

7.40. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długość 20 cm i 21 cm. Oblicz odległość wierzchołka kąta prostego od przeciwprostokątnej.

7.41. W trójkącie prostokątnym wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta prostego jest równa 12 cm i dzieli przeciwprostokątną na dwa odcinki, których długości pozostają w stosunku 4 : 9. Oblicz pole tego trójkąta.

7.42. Pole trójkąta prostokątnego jest równe 136,5 cm^2, a cosinus jednego z kątów wynosi $\frac{84}{85}$. Oblicz długości boków tego trójkąta.

7.43. W trójkącie prostokątnym cosinus jednego z kątów jest równy $\frac{12}{13}$, a promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 13 cm. Oblicz pole tego trójkąta.

7.44. W trójkącie prostokątnym sinus jednego z kątów jest równy $\frac{3}{5}$. Promień okręgu wpisanego w ten trójkąt ma długość 7 cm. Oblicz pole tego trójkąta.

7.45. W trójkącie równoramiennym długość podstawy wynosi 16 cm, a wysokość poprowadzona na tę podstawę jest równa 15 cm. Oblicz wysokość poprowadzoną na ramię trójkąta.

7.46. W trójkącie równoramiennym ABC stosunek długości podstawy AB do ramienia BC jest równy $4:\sqrt{5}$. Wiedząc, że pole trójkąta jest równe 50, oblicz:

a) długości boków trójkąta,

b) wysokość poprowadzoną z wierzchołka A.

7.47. Wysokości trójkąta pozostają w stosunku 20 : 15 : 12.

D a) Wykaż, że ten trójkąt jest prostokątny.

b) Oblicz sumę sinusów wszystkich kątów tego trójkąta.

7.48. W trójkącie ABC dane są: $|AC|=4$ cm, $|BC|=\sqrt{37}$ cm oraz $|\sphericalangle BAC|=60°$. Oblicz pole trójkąta ABC.

7.49. W trójkącie ABC dane są: $|BC|=15$ cm, $\sin|\sphericalangle BAC|=\frac{12}{13}$ oraz $\sin|\sphericalangle CBA|=0{,}8$. Oblicz pole trójkąta ABC.

7.50. Oblicz pole trójkąta, którego dwa boki mają długość 10 cm i 14 cm, a kąt między nimi jest równy:

a) $30°$ b) $120°$ c) $135°$.

7.51. Dwa boki trójkąta mają długość 10 cm i 12 cm, a jego pole jest równe 30 cm^2. Jaką miarę może mieć kąt tego trójkąta między danymi bokami?

7.52. W trójkącie, którego pole jest równe 27 cm^2, dwa boki mają długość 18 cm i 6 cm. Wiedząc, że kąt między danymi bokami jest rozwarty, oblicz:

a) miarę tego kąta b) długość trzeciego boku.

7.53. W trójkącie ostrokątnym dwa boki mają długość 5 cm i 8 cm. Pole tego trójkąta jest równe $10\sqrt{3}$ cm^2. Oblicz:

a) długość trzeciego boku,

b) wysokość poprowadzoną na trzeci bok tego trójkąta.

7.54. W trójkącie równoramiennym cosinus jednego z kątów jest równy $-0{,}8$. Wiedząc, że pole trójkąta jest równe 7,5 cm^2, oblicz:

a) długości boków trójkąta b) sinus kąta przy podstawie.

7.55. Pole trójkąta jest równe 20 cm^2, a jeden z jego kątów ma miarę $150°$. Wiedząc, że wysokości poprowadzone z wierzchołków kątów ostrych pozostają w stosunku 5 : 4, oblicz długości boków trójkąta przy kącie rozwartym.

D 7.56. Wierzchołki trójkątów na rysunku obok należą do dwóch przeciwległych boków równoległoboku. Wykaż, że suma pól trójkątów białych jest równa sumie pól trójkątów zielonych.



D 7.57. Wykaż, że w równoległoboku na rysunku obok suma pól wielokątów zielonych jest równa sumie pól wielokątów szarych.



D 7.58. Punkt P leży dowolnie wewnątrz trójkąta, jak na rysunku obok. Każdy bok tego trójkąta jest podzielony jednym bokiem odpowiedniego zielonego trójkąta na dwa równe odcinki. Wykaż, że suma pól białych trójkątów jest równa sumie pól zielonych trójkątów.



D 7.59. Każdy bok czworokąta jest podzielony dwoma punktami na trzy równe odcinki. Punkt P jest dowolnym punktem leżącym we wnętrzu czworokąta, (zobacz rysunek obok). Wykaż, że suma pól białych czworokątów jest dwa razy większa od sumy pól zielonych trójkątów.



7.60. W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB ma długość 10 cm, a wysokość CD jest równa 12 cm. Oblicz pole trójkąta ABE, jeśli punkt E należy do boku AC oraz:

a) $|AE| = |EC|$ b) $|AE| : |EC| = 2 : 1$.

7.61. W trójkącie ABC wysokość poprowadzona na podstawę dzieli tę podstawę w stosunku 3 : 5. Wiedząc, że pola powstałych trójkątów różnią się o 4 cm^2, oblicz pole trójkąta ABC.

7.62. Przekątne czworokąta dzielą ten czworokąt na cztery trójkąty. Dane są pola trzech trójkątów (zobacz rysunek obok). Oblicz:

a) stosunek długości odcinków, na jakie punkt przecięcia przekątnych dzieli te przekątne,

b) pole czwartego trójkąta.



D 7.63. W trapezie $ABCD$, $AB \| DC$, poprowadzono przekątne, które przecięły się w punkcie P. Wykaż, że pola trójkątów BCP i APD są równe.

7.64. W trapezie $ABCD$, $AB \| DC$, poprowadzono przekątne, które przecięły się w punkcie E. Pola trójkątów ABE i BCE są odpowiednio równe 78 i 52. Oblicz pole trójkąta CDE.

7.65. Pole trójkąta ABC jest równe 24 cm^2. Środkowa CD ma długość 9 cm, a sinus kąta BDC jest równy $\frac{2}{3}$. Oblicz długość boku AB.



7.66. W trójkącie poprowadzono środkowe, które podzieliły dany trójkąt na sześć mniejszych trójkątów. Wykaż, że pola powstałych trójkątów są równe.

7.67. Środkowe CD i BE trójkąta ABC przecinają się pod kątem 45°, jak na rysunku obok. Wiedząc, że $|BE| = 12$ cm oraz $|CD| = 21$ cm, oblicz pole trójkąta ABC.



7.68. Dwa boki trójkąta mają długość a i b. Kąt zawarty między tymi bokami jest równy γ. Oblicz długość odcinka dwusiecznej kąta γ, zawartego w tym trójkącie, jeśli:

a) $a = 8$, $b = 6$, $\gamma = 90°$

b) $a = 4$, $b = 5$, $\gamma = 60°$

7.69. Dwa boki trójkąta ABC mają długość: $|AC| = 4$, $|BC| = 6$, a kąt ACB ma miarę 150°. Przez wierzchołek C poprowadzono prostą prostopadłą do boku BC, która przecięła bok AB w punkcie D. Oblicz:

a) długość odcinka CD

b) pola trójkątów ADC i CDB.

7.70. Dwa boki trójkąta ABC mają długość: $|AC| = 6$, $|BC| = 12$, a kąt ACB ma miarę 120°. Przez punkt C poprowadzono prostą prostopadłą do boku AC, która przecięła bok AB w punkcie D.

a) Oblicz długość odcinka CD.

D b) Wykaż, że punkt D jest środkiem boku AB.

Pole trójkąta, cz. 2

7.71. Z kawałka trójkątnego materiału o obwodzie 1,12 m i polu 504 cm^2 wycięto koło styczne do boków tego trójkąta. Oblicz długość promienia wyciętego koła.

7.72. Pole trójkąta jest równe 63 cm^2. Oblicz jego obwód wiedząc, że promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 3 cm.

7.73. W trójkącie ABC dane są kąty: $|\sphericalangle A| = 30°$, $|\sphericalangle B| = 45°$. Wysokość CD jest równa 3 cm.

a) Oblicz pole trójkąta ABC.

b) Wyznacz promień okręgu wpisanego w ten trójkąt. Podaj przybliżenie dziesiętne wyniku z dokładnością do 0,1 cm.

7.74. Pole trójkąta równoramiennego wynosi 48 cm^2, a sinus kąta przy podstawie jest równy 0,8. Oblicz:

a) obwód trójkąta,

b) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

7.75. Pole trójkąta równoramiennego wynosi 168 cm^2. Promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy $5\frac{1}{4}$ cm. Wiadomo, że ramię jest dłuższe od podstawy o 11 cm.

a) Oblicz długości boków tego trójkąta.

D b) Wykaż, że kąt α między ramionami tego trójkąta jest większy od 30° i jednocześnie mniejszy od 45°.

7.76. Pole trójkąta wynosi 84 cm^2, a promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 4 cm. Wiedząc, że długości boków trójkąta są kolejnymi liczbami naturalnymi, wyznacz najkrótszą wysokość tego trójkąta.

7.77. Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość 16 cm, Wiedząc, że pole tego trójkąta jest równe 120 cm^2, oblicz:

a) długość ramienia,

b) promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

7.78. W trójkącie równoramiennym podstawa ma długość 32 cm, a cosinus kąta przy podstawie jest równy 0,8. Oblicz:

a) pole tego trójkąta,

b) promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

7.79. W trójkącie dwa boki mają długość 15 cm, a promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 12,5 cm. Wiedząc, że pole trójkąta jest równe 108 cm^2, wyznacz:

a) długość podstawy tego trójkąta,

b) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

7.80. Dwa boki trójkąta mają długość 42 cm i 20 cm, a promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy $21\frac{1}{4}$ cm. Wiedząc, że pole trójkąta jest równe 336 cm^2, wyznacz:

a) długość trzeciego boku,

b) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

7.81. Dwa boki trójkąta ostrokątnego mają długość 17 cm i 25 cm, a jego pole jest równe 210 cm^2. Oblicz:

a) sinus kąta między ramionami trójkąta,

b) długość trzeciego boku,

c) promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

7.82. Dwa boki trójkąta ostrokątnego mają długość 8 i 3, a jego pole jest równe $6\sqrt{3}$. Oblicz:

a) miarę kąta między tymi bokami,

b) długość trzeciego boku,

c) promień okręgu opisanego na tym trójkącie,

d) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

7.83. Promień okręgu opisanego na trójkącie równoramiennym jest równy 10. Wiedząc, że kąt między ramionami jest równy 150°, oblicz pole tego trójkąta.

7.84. Promień okręgu opisanego na trójkącie równoramiennym jest równy $5\sqrt{3}$. Wiedząc, że kąty przy podstawie są równe 30°, oblicz pole tego trójkąta.

7.85. Boki trójkąta mają długość 21 cm, 17 cm, 10 cm. Oblicz:

a) pole trójkąta,

b) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt,

c) promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

7.86. Boki trójkąta mają długość 25 cm, 39 cm, 56 cm. Oblicz:

a) wysokości tego trójkąta,

b) sinus najmniejszego kąta,

c) promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

7.87. W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB ma długość 8 cm. W trójkąt ten wpisano okrąg. Punkty D i E są punktami styczności okręgu, odpowiednio z ramionami AC i BC tego trójkąta, przy czym $|DC|+|CE|=|DA|+|AB|+|BE|$. Oblicz:

a) pole trójkąta ABC,

b) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

7.88. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długość 8 cm i 6 cm. Przez wierzchołek kąta prostego poprowadzono prostą, która podzieliła ten trójkąt na dwa trójkąty o równych obwodach. Oblicz:

a) pola powstałych trójkątów,

b) stosunek promieni okręgów wpisanych w te trójkąty.

Pola trójkątów podobnych

7.89. Trójkąt ABC ma obwód równy 30 cm, a pole 24 cm^2. Obwód trójkąta $A_1B_1C_1$ podobnego do trójkąta ABC wynosi 15 cm. Oblicz pole trójkąta $A_1B_1C_1$.

7.90. Trójkąt ABC ma obwód równy 33 cm, a jego pole wynosi 18 cm^2. Oblicz obwód trójkąta $A_1B_1C_1$ podobnego do trójkąta ABC wiedząc, że pole trójkąta $A_1B_1C_1$ jest równe 2 cm^2.

7.91. Odcinek A_1B_1 jest równoległy do odcinka AB. Na podstawie danych na rysunku oblicz stosunek pola trójkąta A_1B_1C do pola trójkąta ABC.

a)



b)



c)



d)



7.92. Podstawa AB trójkąta ABC ma długość 24 cm. Na boku AC zaznaczono punkty A_1, A_2, a na boku BC punkty B_1, B_2 w taki sposób, że $A_1B_1 \parallel AB$ i $A_2B_2 \parallel AB$. Wiedząc, że $|A_1B_1| = 8$ cm, $|A_2B_2| = 20$ cm, oblicz stosunek pól:

a) trójkątów A_1B_1C, A_2B_2C i ABC

b) wielokątów A_1B_1C, $A_2B_2B_1A_1$ i ABB_2A_2.

7.93. W trójkącie ostrokątnym poprowadzono dwie proste równoległe do podstawy, które podzieliły wysokość trójkąta opuszczoną na tę podstawę na trzy odcinki równej długości. Oblicz stosunek pól powstałych w wyniku tego podziału figur.

7.94. Stosunek pól dwóch trójkątów podobnych $A_1B_1C_1$ i ABC wynosi $\frac{4}{9}$. Wiedząc, że podstawa A_1B_1 trójkąta $A_1B_1C_1$ jest o 7 cm krótsza od podstawy AB trójkąta ABC, oblicz $|A_1B_1|$ i $|AB|$.

7.95. Odcinki KL i MN są równoległe do podstawy AB trójkąta ABC. Stosunek pól figur KLC, $MNLK$ i $ABNM$ w podanej kolejności wynosi $1 : 8 : 7$. Oblicz $|KL| : |MN| : |AB|$.



7.96. W trójkącie ABC na rysunku obok punkt E należy do boku AC oraz $|EC| : |AE| = 1 : 3$; natomiast punkt F jest środkiem odcinka BC. Proste prostopadłe do podstawy AB i przechodzące odpowiednio przez punkty E i F odcięły dwa trójkąty, których pola są odpowiednio równe 9 i 2. Oblicz pole trójkąta ABC.



7.97. W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB ma długość 40 cm. W trójkąt wpisano koło, które jest styczne do ramion trójkąta w punktach D i E. Wiedząc, że $|DE| = 8$ cm, oblicz:

a) pole trójkąta DEC

b) pole czworokąta $ABED$.

7.98. W trójkąt równoramienny ABC o bokach długości 13 cm, 13 cm, 10 cm wpisano koło. Styczna do koła, równoległa do podstawy, odcina od trójkąta ABC trójkąt DEC. Oblicz pole trójkąta DEC.

7.99. W trójkącie prostokątnym ABC przyprostokątne AC i AB mają odpowiednio długość 8 cm i 12 cm. Na przyprostokątnej AB obrano punkt D tak, że $|\sphericalangle ADC| = |\sphericalangle ACB|$. Oblicz pole trójkąta ADC.

7.100. W trójkącie prostokątnym ABC, $|\sphericalangle A| = 90^\circ$, przyprostokątna AC ma długość 12 cm. Odcinek DE, prostopadły do przeciwprostokątnej BC, dzieli trójkąt na dwie figury o polach równych $P_1 = 6\ \text{cm}^2$ i $P_2 = 90\ \text{cm}^2$. Oblicz długości boków trójkąta DBE.



7.101. W trójkącie prostokątnym ABC stosunek przyprostokątnych jest równy $|AB| : |AC| = 4 : 3$. Punkt D dzieli przyprostokątną AB na odcinki takie, że $|DB| = 3|AD|$. Punkt E należy do przeciwprostokątnej BC i odcinek DE jest prostopadły do boku BC. Oblicz, jakim procentem pola trójkąta ABC jest pole trójkąta DBE.

7.102. W trójkącie prostokątnym ABC stosunek przyprostokątnych jest równy $|AC| : |AB| = 5 : 12$. Punkt D należy do przeciwprostokątnej BC oraz $|CD| : |DB| = 5 : 8$. Punkt E należy do przyprostokątnej AB i $ED \perp CB$. Oblicz stosunek pola czworokąta $AEDC$ do pola trójkąta EBD.

7.103. W trójkącie ostrokątnym równoramiennym ABC, $|AC| = |BC|$, poprowadzono wysokości CD i BE. Pole trójkąta ABE jest o 44% większe od pola trójkąta ADC. Wiedząc, że obwód trójkąta ABC jest równy 80 cm, oblicz pole trójkąta ABC.

7.104. Cięciwy AB i CD koła przecinają się w punkcie E. Wiedząc, że $|\sphericalangle BED| = 30^\circ$, $|AE| = 6$ cm $|ED| = 3$ cm oraz $|EB| = 2$ cm, oblicz pole trójkąta AEC.

7.105. W kole poprowadzono cięciwy AB i CD, które przecięły się w punkcie E. Pole trójkąta AEC jest o 210 cm^2 większe od pola trójkąta EDB. Wiedząc, że $|AE| = 40$ cm, $|ED| = 16$ cm oraz $|BE| = 10$ cm, oblicz:

a) długość odcinka CE,

b) pola trójkątów AEC i EDB,

c) miarę kąta przecięcia się cięciwy AB z cięciwą CD.



Pole koła, pole wycinka koła

7.106. Średnicę AB koła podzielono na cztery równe odcinki. Oblicz, jaką część pola tego koła stanowi figura zaznaczona kolorem zielonym, jeśli:

a) okręgi wyznaczające tę figurę są styczne wewnętrznie, a ich średnice są zawarte w średnicy AB



b) łuk wewnątrz koła jest sumą dwóch półokręgów (patrz rysunek poniżej).



D 7.107. Każde z czterech mniejszych kół ma promień 1. Większe koło ma promień 2. Wykaż, że pole figury zielonej jest równe polu figury szarej.



7.108. Promień koła jest równy r. Kąt wycinka tego koła ma miarę α. Oblicz pole wycinka, jeśli:

a) $r = 9$ cm, $\alpha = 20°$ b) $r = 12$ cm, $\alpha = 150°$ c) $r = 5$ cm, $\alpha = 54°$.

7.109. Pole wycinka koła jest równe P, a łuk tego wycinka ma długość L. Oblicz promień koła, jeśli:

a) $P = 10\pi$ cm^2, $L = 2{,}5\pi$ cm

b) $P = 30$ cm^2, $L = 12$ cm

c) $P = 210\pi$ cm^2, $L = 14\pi$ cm.

7.110. Dane jest koło o środku w punkcie O i promieniu r. Oblicz pole odcinka tego koła (zaznaczonego na rysunku obok), wyznaczonego przez łuk długości L, jeśli:

a) $r = 2$, $L = \pi$ b) $r = 3$, $L = 2\pi$

c) $r = 6$, $L = 5\pi$.



7.111. Stosunek pola trójkąta do pola koła wpisanego w ten trójkąt jest równy $6 : \pi$. Wiedząc, że średnica tego koła ma długość 6 cm, oblicz obwód trójkąta.

7.112. W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych jest dwa razy krótsza od przeciwprostokątnej. Oblicz stosunek pola koła wpisanego w ten trójkąt do pola koła opisanego na tym trójkącie.

7.113. Kąt wpisany w koło ma miarę 45° i jest oparty na łuku długości 3π cm. Oblicz pole wycinka koła, wyznaczonego przez ten sam łuk.

7.114. Wycinek koła jest wyznaczony przez kąt środkowy, zaznaczony na rysunku poniżej. W wycinek wpisano koło o polu P. Oblicz pole wycinka, jeśli:

a) $P = 4\pi$ cm^2



b) $P = 9\pi$ cm^2



7.115. W wycinek koła o promieniu 6 cm wpisano okrąg o promieniu 2 cm (zobacz rysunek obok). Oblicz pole wycinka koła.



7.116. W kole z jednego punktu okręgu poprowadzono dwie cięciwy; każda ma długość 6 cm. Wiedząc, że utworzyły one kąt 60°, oblicz pole części koła zawartej między tymi cięciwami.

7.117. Odległość środków dwóch kół o jednakowych promieniach r wynosi r. Oblicz pole części wspólnej tych kół.

7.118. Podstawa trójkąta równobocznego jest średnicą koła o promieniu r. Oblicz stosunek pola części koła leżącej na zewnątrz trójkąta do pola części koła leżącej wewnątrz tego trójkąta.

7.119. W kąt o mierze 60° wpisano dwa koła styczne do ramion kąta i styczne zewnętrznie do siebie. Wyznacz pole większego koła, jeśli pole mniejszego jest równe 5.

Zastosowanie pojęcia pola w dowodzeniu twierdzeń

D 7.120. Trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym o przeciwprostokątnej BC. Z punktu M leżącego na boku BC poprowadzono odcinki MD oraz MS prostopadłe odpowiednio do przyprostokątnych AC oraz AB. Wykaż, że $\frac{|MD|}{|AB|}+\frac{|MS|}{|AC|}=1$.



D 7.121. W trójkąt prostokątny, którego przyprostokątne mają długość a i b, gdzie $a > b$, wpisano prostokąt, jak na rysunku obok. Stosunek boków prostokąta jest równy 1 : 2. Wykaż, że długość krótszego boku prostokąta jest równa $\frac{ab}{2a+b}$ lub $\frac{ab}{a+2b}$. W którym przypadku pole prostokąta jest większe?



D 7.122. Punkt M należy do podstawy AB trójkąta równoramiennego ABC, $M \neq A$ i $M \neq B$. Wykaż, że suma odległości punktu M od ramion trójkąta jest równa wysokości trójkąta, poprowadzonej z punktu A.

D 7.123. Boki trójkąta mają długość a, b, c. Wysokości opuszczone na te boki są odpowiednio równe h_a, h_b, h_c. Wykaż, że jeśli $h_a + h_b = h_c$, to $c=\frac{ab}{a+b}$.

D 7.124. W trójkącie ABC dane są: $|\sphericalangle ACB| = 135°$ oraz $|BC| = a$. Wykaż, że jeśli środkowa CD tego trójkąta jest prostopadła do boku BC, to:

a) $|CD|=\frac{a}{2}$

b) $|AC|=a\sqrt{2}$.

D 7.125. W trójkącie dwa boki mają długość a i b, a kąt zawarty między nimi jest równy α. Niech x oznacza długość odcinka dwusiecznej tego kąta, zawartego w tym trójkącie. Wykaż, że:

a) jeśli $\alpha = 120°$, to $x=\frac{ab}{a+b}$

b) jeśli $\alpha = 90°$, to $x=\frac{ab\sqrt{2}}{a+b}$.

D 7.126. Punkt D należy do podstawy AB trójkąta równoramiennego ABC. Półprosta $\overrightarrow{CD}$ dzieli kąt przy wierzchołku C na kąty α i β, jak na rysunku obok. Wykaż, że $\frac{|AD|}{|DB|}=\frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$.



Test sprawdzający do rozdziału 7.

1. Trójkąt prostokątny równoramienny ma pole równe 2 cm^2. Z tego wynika, że przyprostokątna ma długość:

A. $\sqrt{2}$ cm B. 2 cm C. $2\sqrt{2}$ cm D. 4 cm

2. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długość 7 cm i 24 cm. Niech h oznacza odległość wierzchołka kąta prostego od przeciwprostokątnej tego trójkąta. Wówczas:

A. $h=3\frac{9}{25}$ cm B. h = 12,5 cm C. h = 6,72 cm D. $h=5\frac{23}{25}$ cm

3. Pole jednej kratki wynosi 1. Pole figury na rysunku obok jest równe:



A. 8 B. 8,5

C. 9 D. 9,5.

4. Trójkąt $A_1B_1C_1$ o polu 36 cm^2 jest podobny do trójkąta ABC o polu 4 cm^2. Skala podobieństwa trójkąta $A_1B_1C_1$ do trójkąta ABC jest równa:

A. 3 B. 9 C. 12 D. $\frac{1}{9}$

5. Wysokość trójkąta prostokątnego poprowadzona na przeciwprostokątną dzieli ją na dwa odcinki, długości 2 cm i 8 cm. Pole tego trójkąta jest równe:

A. 16 cm^2 B. 20 cm^2 C. 24 cm^2 D. 28 cm^2

6. Na boku AC trójkąta ABC zaznaczono punkty D, E w taki sposób, że $|AE| = |ED| = |DC|$. Przez punkty E, D poprowadzono proste równoległe do boku AB, które podzieliły trójkąt na trzy rozłączne figury o polach równych odpowiednio P_1, P_2, P_3 (zobacz rysunek obok). Zatem:



A. $P_2 : P_3 = 1 : 2$ B. $P_2 : P_3 = 2 : 3$

C. $P_2 : P_3 = 4 : 9$ D. $P_2 : P_3 = 3 : 5$

7. Odcinek CD jest środkową w trójkącie ABC. Trójkąt DBC ma pole równe 3 cm^2. Pole trójkąta ABC wynosi:

A. 4,5 cm^2 B. 5 cm^2 C. 6 cm^2 D. 7,5 cm^2

8. Boki trójkąta mają długość: 3, 4, 5. Pole koła opisanego na tym trójkącie jest równe:

A. 5π B. $6{,}25\pi$ C. 10π D. 25π

9. Boki trójkąta mają długość: 13, 14, 15. Pole tego trójkąta jest równe:

A. 105 B. 91 C. 84 D. 42

10. W trójkącie dwa boki mają długość 8 cm i 5 cm, a kąt między tymi bokami jest równy 150°. Pole tego trójkąta jest równe:

A. 20 cm^2 B. $10\sqrt{3}$ cm^2 C. $10\sqrt{2}$ cm^2 D. 10 cm^2

11. Na rysunku obok punkty A i B są środkami dwóch sąsiednich boków kwadratu. Jaką część pola kwadratu stanowi pole trójkąta ABC?



A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{3}{8}$ D. $\frac{2}{5}$

12. Pole trójkąta wynosi 48 cm^2. Promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 3 cm. Obwód tego trójkąta jest równy:

A. 16 cm B. 32 cm C. 72 cm D. 144 cm

13. Na rysunku obok dany jest wycinek koła, którego kąt jest równy 45°, Jeśli łuk tego wycinka ma długość π, to pole koła jest równe:



A. π B. 4π

C. 8π D. 16π

14. Pole wycinka koła o promieniu 12 cm jest równe 60π cm^2. Kąt środkowy, wyznaczający dany wycinek koła jest równy:

A. 150° B. 135° C. 120° D. 90°

15. Dane są dwa okręgi współśrodkowe. Cięciwa AB większego okręgu ma długość 10 cm i jest styczna do mniejszego okręgu. Pole pierścienia kołowego wyznaczonego przez te okręgi jest równe:



A. 25π cm^2 B. 100π cm^2

C. 50π cm^2 D. 75π cm^2.

Zadania powtórzeniowe do rozdziału 7.

16. Boki trójkąta mają długość: $a=\sqrt{8}$, $b=\sqrt{12}$, $c=\sqrt{6}-\sqrt{2}$. Oblicz miary kątów tego trójkąta.

17. Boki trójkąta mają długość a, b, c; kąty są odpowiednio równe α, β, γ; R jest promieniem okręgu opisanego na tym trójkącie. Rozwiąż ten trójkąt, jeśli:

a) $a=\sqrt{6}$, $b=2$, $\beta=45°$ b) $a=2$, $b=\sqrt{2}$, $\alpha=45°$

c) $R=c=5$, $\alpha=60°$ d) $R=3$, $a=\sqrt{27}$, $\beta=45°$, $c<b$.

18. Oblicz długości boków trójkąta równoramiennego, którego pole jest równe $25\sqrt{2}$, a kąt między ramionami jest równy 45°.

19. W trójkącie ABC bok BC ma długość 16 cm oraz $|\sphericalangle ACB|=120°$. Wiedząc, że promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 16 cm, wyznacz:

a) pozostałe kąty trójkąta ABC,

b) wysokość poprowadzoną z wierzchołka C,

c) długość środkowej AD.

20. W trójkącie prostokątnym cosinus jednego z kątów ostrych jest równy $\frac{3}{5}$. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 12,5 cm. Oblicz odległość wierzchołka kąta prostego od przeciwprostokątnej.

21. Pole trójkąta prostokątnego wynosi 240 cm^2, a tangens jednego z kątów ostrych jest równy $1\frac{7}{8}$. Oblicz promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

22. Boki trójkąta mają długość: 13 cm, 20 cm, 21 cm. Oblicz:
a) pole tego trójkąta,
b) sinus największego kąta,
c) promień okręgu wpisanego w trójkąt,
d) promień okręgu opisanego na trójkącie.

23. Dwa boki trójkąta mają długość 8 i 5, a kąt między tymi bokami jest równy: $\alpha = 60°$. Oblicz:
a) długość trzeciego boku trójkąta,
b) wysokość poprowadzoną na trzeci bok,
c) długość odcinka dwusiecznej kąta α, zawartego w tym trójkącie,
d) długość środkowej poprowadzonej z wierzchołka kąta α.

24. Dwa boki trójkąta mają długość 28 cm i 25 cm, a promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy $14\frac{1}{6}$ cm. Wiedząc, że pole trójkąta wynosi 210 cm^2, wyznacz:
a) długość trzeciego boku,
b) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

25. Dwa boki trójkąta mają długość: $a = 7$ cm, $b = 8$ cm. Promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy $\sqrt{5}$ cm. Wiedząc, że pole trójkąta wynosi $12\sqrt{5}$ cm^2, oblicz:
a) długość trzeciego boku,
b) sinusy kątów tego trójkąta.

D 26. Punkty D, E, F są środkami boków trójkąta ABC. Punkty G, H należą do odcinka DE. Wykaż, że:
a) pola trójkątów AFG, FBH oraz DEC są równe,
b) suma pól trójkątów zielonych jest równa polu jednego białego trójkąta.



D 27. W danym trójkącie poprowadzono dwusieczną jednego z kątów. Wykaż, że jeśli pola powstałych dwóch trójkątów są równe, to dany trójkąt jest równoramienny.

28. W trójkącie ABC dane są: $|AC| = 20$, $|BC| = 15$ i $|\sphericalangle C| = 30°$. Punkt D należy do boku BC oraz pole trójkąta ADC jest dwa razy większe od pola trójkąta ABD. Oblicz $|AD|$.

29. W trójkącie ABC, w którym $|AC| = 12$ cm, $|BC| = 4$ cm, dwusieczna kąta ACB przecina bok AB w punkcie D. Wiedząc, że pole trójkąta ADC jest o $6\sqrt{3}$ cm^2 większe od pola trójkąta DBC, oblicz pole trójkąta ABC.

30. W trapezie $ABCD$, w którym $AB \| DC$, przekątne przecinają się w punkcie E. Wiedząc, że pola trójkątów ABE i CDE są odpowiednio równe 90 cm^2 i 40 cm^2, oblicz pole trójkąta AED.

31. Przyprostokątne trójkąta prostokątnego ABC pozostają w stosunku $|AC| : |AB| = 3 : 4$. Symetralna przeciwprostokątnej BC przecina bok BC w punkcie D i bok AB w punkcie E. Jaką część pola trójkąta ABC stanowi pole trójkąta EBD?

32. Pole koła jest równe $72\frac{1}{4}\pi$ cm^2. Cięciwa CD przecina średnicę AB w punkcie E, odległym o 5 cm od środka koła. Wiedząc, że pole trójkąta EBD jest 9 razy większe od pola trójkąta ACE, oblicz odległość cięciwy CD od środka koła.



33. Pole wycinka koła jest równe 40π cm^2, a łuk tego wycinka ma długość 10π cm. Oblicz:

a) promień koła

b) miarę kąta środkowego tego wycinka.

34. W trójkącie prostokątnym ABC dane są: $|AC| = 3$ cm, $|\sphericalangle CAB| = 90°$, $|\sphericalangle ABC| = 30°$. Przyprostokątna AB jest średnicą półkola, jak na rysunku obok. Punkt D jest punktem przecięcia półokręgu z bokiem BC. Oblicz:

a) długość cięciwy DB,

b) pole odcinka koła, zaznaczonego na rysunku obok.



D 35. W ćwiartkę koła o promieniu $R = 1$ wpisano koło, którego promień jest równy r. Wykaż, że $r = \sqrt{2} - 1$.



8. Wielomiany

Wielomiany jednej zmiennej rzeczywistej

8.1. Wśród poniższych wyrażeń algebraicznych znajdują się wielomiany. Wskaż je.

a) $3x^7 - 2x^5 + 4$ b) $-12x^8$ c) $\frac{3}{x-1}$

d) $\sqrt{x} + 8$ e) $5 - \pi$ f) $2|x| + 3$

g) $\sqrt{2}$ h) $3x^2 - 2x + 1$ i) $\frac{2x^2+8}{4}$

8.2. Dany jest jednomian $F(x)$. Określ jego stopień.

a) $F(x) = -5 \cdot (x^2)^4$ b) $F(x) = 0{,}2(x^3)^5 \cdot x^2$

c) $F(x) = 8 \cdot (x^5 \cdot x^3)^6$ d) $F(x) = -0{,}3 \cdot (x^2)^5 \cdot (x^4 \cdot x^7)$

8.3. Dany jest jednomian stopnia n, $n \in \boldsymbol{N}$. Oblicz n, jeśli:

a) $G(x) = 0{,}5x^n$ oraz $G(4) = 32$

b) $G(x) = \frac{1}{3}x^n$ oraz $G(3) = 243$

c) $G(x) = \sqrt{5}\,x^n$ oraz $G\left(\sqrt{5}\right) = 125$

d) $G(x) = \sqrt{2}\,x^n$ oraz $G\left(2\sqrt{2}\right) = 32$.

8.4. Uporządkuj dany wielomian rosnąco. Następnie podaj stopień tego wielomianu oraz wypisz jego współczynniki.

a) $F(x) = 2 - 4x^2 + 8x^4 + 3x^2 + 8$ b) $G(x) = x - 3x^3 + 5x + 3x^3 + 2x^2$

c) $H(x) = x^5 - 2x^3 + 4 + 3x^5 + 1$ d) $W(x) = 3x - 9x^4 + x^2 - 3x + 9x^4$

8.5. Uporządkuj dany wielomian malejąco. Następnie podaj stopień tego wielomianu oraz wypisz jego współczynniki.

a) $F(x) = 4x - 3 + 5x^2 - 5x^4 - 8x$ b) $G(x) = 9x^2 + 8 - 7x - 9x^2 + 7x$

c) $H(x) = 2 - 3x^3 + 2x^2 + 4x^4$ d) $W(x) = -4x + 6 + 2x - 8x^3 + 4x^5$

8.6. Podaj przykład wielomianu jednej zmiennej rzeczywistej x:

a) stopnia siódmego, który jest uporządkowany rosnąco i ma tylko trzy wyrazy różne od zera,

b) stopnia dziewiątego, który jest uporządkowany malejąco i ma tylko pięć wyrazów różnych od zera.

8.7. Dany jest wielomian $W(x)$. Oblicz jego wartość dla podanych obok wielomianu liczb.

a) $W(x) = -x^3 + 4x^2 - 7$; $-3, -1, 4, 5$

b) $W(x) = x^3 - x^2 + 1$; $\sqrt{2}+1$, $\sqrt{3}-\sqrt{2}$

8.8. Podaj przykład wielomianu $W(x)$ zmiennej rzeczywistej x:

a) stopnia piątego, który ma tylko trzy wyrazy różne od zera oraz dla $x = -1$ przyjmuje wartość 6,

b) stopnia czwartego, który dla $x = -\sqrt{2}$ przyjmuje wartość 0.

8.9. Wyznacz sumę wszystkich współczynników wielomianu $W(x)$, jeśli:

a) $W(x) = 8x^7 - 2x^5 + 4x^3 - 10$

b) $W(x) = -12x^5 + 6x^3 + 4x + 1$

c) $W(x) = (3x^{10} - 2x^{11})^{50}$

d) $W(x) = (-4x^7 + 2x^3)^5$.

8.10. Wyznacz współczynnik a wielomianu $W(x) = -x^4 - 2x^3 + ax + 3$, jeśli $W(-2) = -1$.

8.11. Wyznacz współczynniki a i b wielomianu $W(x) = -5x^3 + ax + b$ wiedząc, że $W(-1) = 2$ oraz $W(2) = -31$.

8.12. Wyznacz współczynniki a i b wielomianu $W(x) = 2x^4 + ax^3 + x + b$ wiedząc, że $W(1) = -5$ oraz $W(-1) = -1$.

8.13. Jeden ze współczynników wielomianu $W(x) = ax^3 + bx^2 + cx$ jest wyznaczony przez warunek $W(1) + W(-1) = 8$. Podaj wartość tego współczynnika.

8.14. Wyznacz współczynnik a wielomianu $W(x) = x^4 + ax - 4$, wiedząc, że $W\left(\sqrt{2}-1\right) = W\left(1-\sqrt{2}\right)$.

8.15. Suma wszystkich współczynników wielomianu $W(x) = 3x^3 - (2a + b)x^2 + (a - b)x + 6$ jest równa 8 oraz $W(-2) = -82$. Oblicz a i b.

8.16. Suma wszystkich współczynników wielomianu $W(x) = 5x^3 + (2a^2 - 3)x^2 + (a + 1)x + 2$ jest równa 11. Oblicz a.

8.17. Suma wszystkich współczynników wielomianu $W(x) = -2x^4 + (a - a^2)x^3 + b - 4$ jest równa -6 oraz $W(0) = 8$. Oblicz a i b.

Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów

8.18. Dane są wielomiany $W(x)$ i $P(x)$. Wyznacz wielomian $W(x) + P(x)$.

a) $W(x) = -4x^7 + 2x^5 - 3x^2 + 6$ $\quad P(x) = 4x^7 - 3x^5 + 2x^3 + 4x^2 - 8$

b) $W(x) = 3x^5 - 8x^4 + 2x^3 - x$ $\quad P(x) = 9x^5 + 9x^4 - 6x^3 + 1$

c) $W(x) = 3 - 4x^2 + 8x^3 + x^4$ $\quad P(x) = -x^4 - 8x^3 + 2x$

d) $W(x) = \frac{1}{4}x^6 - \frac{1}{2}x^5 + 6x^3 - \frac{1}{8}$ $\quad P(x) = -0{,}25x^6 + 0{,}5x^5 - 8x^3 + 0{,}125$

8.19. Dane są wielomiany $W(x)$ i $P(x)$. Wyznacz wielomian $W(x) - P(x)$.

a) $W(x) = \frac{3}{4}x^7 - \frac{3}{8}x^6 + \frac{1}{8}x^5 + 8$ $\quad P(x) = 0{,}75x^7 + \frac{5}{8}x^6 + 0{,}125x^5 + 2$

b) $W(x) = 4x^3 - 12x^2 + 0{,}6x + 0{,}4$ $\quad P(x) = -4x^3 - 12x^2 + 0{,}5x + 0{,}4$

c) $W(x) = 3x^6 - \sqrt{2}x^5 + 2\sqrt{2}x^3 + 8x$ $\quad P(x) = 5x^6 - 2\sqrt{2}x^5 + 4x - 1$

d) $W(x) = \sqrt{2}x^4 - 3\sqrt{3}x^3 + 4x^2 + 1$ $\quad P(x) = x^4 - x^3 + \sqrt{3}x^2 - \sqrt{2}$

8.20. Wykonaj działania:

a) $(2x^6 - 3x^4 + 2x) - (x^4 + 8x^2 + 4x - 1) + x^6 + 5x^4 + 6x^2$

b) $(-3x^4 + 5x^3 - 6) - (4x^4 + 2x^3 + 4x) - (-7x^4 + 3x^3 + 8)$

c) $7x^7 - 6x^5 + 2x - (4x^5 + 3x^2 - 6) - (7x^7 - 10x^5)$

d) $12x^3 - (x^7 + 4x^3) - (14x^3 - 5x^7)$.

8.21. Dany jest wielomian $W(x) = -3x^3 + 4x^2 + 2x - 1$. Wyznacz wielomian $F(x)$ i uporządkuj go malejąco, jeśli:

a) $F(x) = 4 \cdot W(x)$ $\quad$ b) $F(x) = -0{,}5 \cdot W(x)$ $\quad$ c) $F(x) = x^2 \cdot W(x)$

d) $F(x) = (x - 1) \cdot W(x)$ $\quad$ e) $F(x) = (x^2 + 3x) \cdot W(x)$ $\quad$ f) $F(x) = (2x^2 - 3) \cdot W(x)$.

8.22. Dane są wielomiany: $W(x) = -3x^3 + 2x^2 + 5x - 1$, $P(x) = 2x^2 + 3x$ oraz $G(x) = x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 7$. Wykonaj działania:

a) $P(x) + 2G(x)$
b) $3P(x) - 2W(x)$
c) $W(x) - [P(x) - G(x)]$
d) $W(x) + G(x) - 3P(x)$.

8.23. Dane są wielomiany: $W(x) = 3x^2 - 2$, $P(x) = x^3 + 2x - 1$ oraz $G(x) = 4x^2 - 3x + 1$. Wykonaj działania:

a) $W(x) \cdot P(x)$
b) $P(x) \cdot G(x)$
c) $[W(x)]^2 \cdot G(x)$
d) $[P(x)]^2 \cdot W(x)$.

8.24. Wykonaj mnożenie:

a) $(x^7 - x^6)(x^5 - x^2)$
b) $(x^{12} - 1)(x^3 + x^4)$
c) $(x^7 - x^6 - 1)(x^5 + x^3)$
d) $(x^4 - x^3 - x^2)(x^5 + 1)$.

8.25. Wykonaj działania:

a) $(3x^2 - 4x)(3x^2 + 4x)$
b) $(5x^3 - 6x)^2$
c) $(3x^7 + 2x)^2$
d) $(9x^7 - x^3)(9x^7 + x^3)$.

D 8.26. Wykaż, że $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac$. Następnie wykonaj działania:

a) $(x^2 - x + 1)^2 - (x^2 + x + 1)^2$
b) $(3x^2 - x + 2)^2 - (3x^2 + x + 2)^2$
c) $(x^2 + x)^2 + (3x^2 + 1)^2$
d) $(2x^2 - 3x)^2 + (x^2 + 4x)^2$.

8.27. Wykonaj działania:

a) $(x^3 - 2x + 1)(x^2 + 1) + (x^4 + 3x + 2)(x^3 - 2x)$
b) $(2x^4 - 3x + 5)(x^3 + 4x + 1) + (x^3 + 2x)(x^4 - 4x^2)$
c) $(3x^3 - 2x^2 + 5x + 1)(x + 2) + (x^3 + 4x^2 - 1)(x^2 + 5x)$
d) $(x^3 - 2x^2 + 4x + 5)(x^2 - 1) - (x^3 - 4x^2 + 2x - 3)(x^2 + 2x)$.

8.28. Określ stopień wielomianu $W(x)$ oraz podaj wyraz wolny i współczynnik tego wielomianu przy najwyższej potędze zmiennej x – bez wykonywania działań.

a) $W(x) = (-3x^4 + 1)(2x^3 - 5)^3$
b) $W(x) = (4x^2 - 1)(3x^3 + 2)(x^5 - 4)$
c) $W(x) = (3x + 1)^2(2x^4 - 5)$
d) $W(x) = -2x^6(x^3 + 1)^4(2 - 3x)^2$

Równość wielomianów

8.29. Sprawdź, czy wielomiany $W(x)$ i $P(x)$ są równe, jeśli:

a) $W(x) = (3x - 1)(4 - 2x)(x + 1)$ $\quad P(x) = -6x^3 + 8x^2 + 10x - 4$

b) $W(x) = (3 - 5x)^2(x^2 - 1) - 25x^4$ $\quad P(x) = -30x^3 - 16x^2 + 30x - 9$

c) $W(x) = (-2x + 1)^3$ $\quad P(x) = -8x^3 + 12x^2 - 12x + 1$

d) $W(x) = 3x^5 - (2x^2 + 1)(x^3 - 1)$ $\quad P(x) = x^5 - x^3 + 2x^2 + 1.$

8.30. Sprawdź, czy istnieje liczba a, dla której wielomiany $W(x)$ i $P(x)$ są równe, jeśli:

a) $W(x) = (x^2 - ax)(x + 2a) + 8x$ $\quad P(x) = x^3 - 2x^2$

b) $W(x) = 2x^4 - 3(a + 1)x^3 + 4a$ $\quad P(x) = 2x^4 - 6x^3 + 8$

c) $W(x) = (x^3 - 2a)(x^3 + 2a) - 6x$ $\quad P(x) = x^9 + 3ax - 16$

d) $W(x) = (3x - a)^2 \cdot 4x$ $\quad P(x) = 36x^3 + 48x^2 + 16x.$

8.31. Wyznacz liczbę a, dla której wielomiany $W(x)$ i $P(x)$ są równe, jeśli:

a) $W(x) = (3x^2 - a)(x + 2a) - (2x - 1)$ $\quad P(x) = 3x^3 + 18x^2 - 5x - 17$

b) $W(x) = 8 + ax(ax + 1) - (a^2 + x - 5x^2) \cdot x$ $\quad P(x) = 5x^3 + 3x^2 - 2x + 8$

c) $W(x) = -6x^3 - 5ax^2 - ax - 2$ $\quad P(x) = (3x^2 - a^2x + 2)(-2x - 1)$

d) $W(x) = (2x^2 - 3)(2x - a^2) - 4$ $\quad P(x) = 4x^3 + (a - 3)x^2 - 6x - a.$

8.32. Sprawdź, czy istnieją liczby a i b, dla których wielomiany $W(x)$ i $P(x)$ są równe, jeśli:

a) $W(x) = 2x^3 + (3a + 1)x^2 + (b + 2)x - 4$ $\quad P(x) = 2x^3 + 4x^2 + 5x - 4$

b) $W(x) = (2ax - b)^3$ $\quad P(x) = 8x^3 - 10x^2 + 6x - 1$

c) $W(x) = 2ax(2x - b)^2$ $\quad P(x) = 16x^3 - 48x^2 + 36x$

d) $W(x) = (x^2 - ax)^2 - (x^2 + bx)^2$ $\quad P(x) = -2x^3 - 3x^2.$

8.33. Wyznacz współczynniki a i b, dla których wielomiany $W(x) - F(x)$ i $H(x)$ są równe, jeśli:

a) $W(x) = x^3 + ax^2 + 3x + 1$, $\quad F(x) = 2x^2 + bx - 4$, $\quad H(x) = x^3 - 7x^2 + 8x + 5$

b) $W(x) = 2x^3 + ax^2 + 5x - 3$, $\quad F(x) = x^3 - 5x^2 + bx + 4$, $\quad H(x) = x^3 + 2x^2 + 4x - 7.$

8.34. Wyznacz współczynniki a i b tak, aby $W(x) \cdot F(x) \equiv H(x)$, jeśli:

a) $W(x) = x^2 + 3x + 2$, $\quad F(x) = ax + b$, $\quad H(x) = 2x^3 + 3x^2 - 5x - 6$

b) $W(x) = 2x^2 - x + 5$, $\quad F(x) = ax + b$, $\quad H(x) = -2x^3 + 7x^2 - 8x + 15.$

8.35. Wyznacz współczynniki b i c tak, aby wielomian $W(x)\cdot F(x) - H(x)$ był wielomianem zerowym, jeśli:

a) $W(x) = -3x + 5$, $F(x) = x^2 + bx + c$, $H(x) = -3x^3 - x^2 - 2x + 20$

b) $W(x) = 2x - 3$, $F(x) = x^2 + bx + c$, $H(x) = 2x^3 + 7x^2 - 13x - 3$.

Wzory skróconego mnożenia stopnia 3. Wzór na $a^n - b^n$

8.36. Zapisz za pomocą sumy algebraicznej wyrażenie:

a) $(y + z)^3$ b) $(2 + a)^3$ c) $(1 + 3x)^3$ d) $\left(\sqrt[3]{3}+1\right)^3$

e) $(5 - b)^3$ f) $(x - 4)^3$ g) $(2x - 3)^3$ h) $\left(1-\sqrt[3]{2}\right)^3$.

8.37. Oblicz sześcian danej liczby.

a) $1-\sqrt{3}$ b) $\sqrt{6}+2$ c) $3\sqrt{2}-1$ d) $4\sqrt{2}+\sqrt{6}$

e) $2+\sqrt[3]{2}$ f) $-\sqrt[3]{3}-\sqrt[3]{9}$ g) $2\sqrt[3]{2}-\sqrt[3]{4}$ h) $\sqrt[3]{5}+2\sqrt[3]{25}$

8.38. Zapisz za pomocą sumy algebraicznej wyrażenie:

a) $(x + a)(x^2 - ax + a^2)$ b) $(3 + x)(9 - 3x + x^2)$

c) $(y + 4)(16 - 4y + y^2)$ d) $(2 - y)(4 + 2y + y^2)$

e) $(25 + 5x + x^2)(x - 5)$ f) $\left(\sqrt{2}-z\right)\left(z^2+2+\sqrt{2}\,z\right)$.

8.39. Oblicz:

a) $\left(2-\sqrt[3]{5}\right)\left(4+2\sqrt[3]{5}+\sqrt[3]{25}\right)$ b) $\left(1-2\sqrt[3]{2}+4\sqrt[3]{4}\right)\left(1+2\sqrt[3]{2}\right)$

c) $\left(\sqrt[3]{3}+\sqrt[3]{2}\right)\left(\sqrt[3]{9}-\sqrt[3]{6}+\sqrt[3]{4}\right)$ d) $\left(4\sqrt[3]{4}+2\sqrt[3]{18}+\sqrt[3]{81}\right)\left(\sqrt[3]{9}-2\sqrt[3]{2}\right)$

8.40. Doprowadź dane wyrażenie do najprostszej postaci.

a) $(x - 1)^3 + (2 - x)^3$ b) $(2 + x)^3 + 2(x - 1)^3$

c) $(x + 1)(x^2 - x + 1) + (1 - x)^3$ d) $3(x - 2)(x^2 + 2x + 4) - (x + 3)^3$

e) $(x + 4)^3 - (4 - x)(x^2 + 4x + 16)$ f) $\left(\sqrt[3]{5}+x\right)^3-\left(\sqrt[3]{5}-x\right)^3-6\sqrt[3]{25}x$

8.41. Wykonaj działania i przeprowadź redukcję wyrazów podobnych:

a) $(x+1)^3-(2x-3)^2-(x+3)^2+2(x-2)(x+2)$

b) $(2x-5)^2(x-1)-(3x+1)^2(x+1)-(x-1)(x^2+x+1)$

c) $(2x-1)^3-(x+1)^3+(x+2)^3-(x+2)(x^2-2x+4)$

d) $(2x-3y)^2-(3x-y)(3x+y)+(x-2y)^2-(8x-7y)(-2y)$

e) $(x^2-1)^3-(x-1)(x^2+1)(x+1)+4x^2(x^2+1)$

f) $(3x-1)^3-3(x+1)(x^2-x+1)+2(x-2)^3$.

8.42. Rozwiąż równanie:

a) $(x-1)^3+35=4(x+1)^2-(2-x)(4+2x+x^2)$

b) $(2+x)^3+9x=10-(2-x)^3+(2x-1)^2$

c) $2(3x-5)^2+3(x+1)(x^2-x+1)=(x+3)^3+2x(x^2-25)+72$

d) $(x-4)^3-12(x+2)^2+20x(x-4)=-9-(x^2+3x+9)(3-x)$.

8.43. Rozwiąż nierówność:

a) $(x-2)^3+7x^2+(2+x)(x^2-2x+4)>2x^3+12x+25$

b) $(x-4)(x^2+4x+16)-2(x-1)^3\geq 5(x-4)(x+3)-x^3$

c) $x^2(x-5)-(x-2)^3\leq 3x-12(x-1)$

d) $(3+x)^3+(2x-1)(4x^2+2x+1)-11(3x+4)<9x^2(x+1)-(x^2+2)$.

8.44. Zamień na iloczyny wyrażenia:

a) x^3-3x^2+3x-1

b) $x^3+18x^2+108x+216$

c) $27-27y+9y^2-y^3$

d) $8x^3+36x^2y+54xy^2+27y^3$

e) $1+6x+12x^2+8x^3$

f) $1-15y+75y^2-125y^3$.

8.45. Zamień na iloczyny wyrażenia:

a) y^3+8

b) $1-x^3$

c) $27z^3-1$

d) $8k^3-125$

e) $64+27y^3$

f) $125a^3+216$

g) $5\sqrt{5}+x^3$

h) $y^3-2\sqrt{2}$.

8.46. Usuń niewymierność z mianownika ułamka:

a) $\frac{2}{\sqrt[3]{3}}$

b) $\frac{1}{3\sqrt[3]{2}}$

c) $\frac{2\sqrt[3]{5}}{\sqrt[3]{25}}$

d) $\frac{2}{2-\sqrt[3]{2}}$

e) $\frac{2}{3+\sqrt[3]{5}}$

f) $\frac{7}{\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{12}+\sqrt[3]{9}}$

g) $\frac{\sqrt[3]{2}}{4\sqrt[3]{16}+2\sqrt[3]{4}+1}$

h) $\frac{\sqrt[3]{3}-2}{\sqrt[3]{3}+\sqrt[3]{9}}$

Zastosowanie wzorów skróconego mnożenia w dowodzeniu

D 8.47. Wykaż, że liczba $207^3 + 148^3$ jest podzielna przez 71.

D 8.48. Wykaż, że liczba $536^3 - 124^3$ jest podzielna przez 103.

D 8.49. Wykaż, że jeśli liczba całkowita przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3, to sześcian tej liczby przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2.

D 8.50. Liczba całkowita a przy dzieleniu przez 4 daje resztę 3, zaś liczba całkowita b przy dzieleniu przez 4 daje resztę 1. Wykaż, że suma sześcianów tych liczb jest podzielna przez 4.

D 8.51. Liczba całkowita c przy dzieleniu przez 6 daje resztę 2. Wykaż, że liczba $4 + c^3$ jest podzielna przez 12.

D 8.52. Liczba całkowita c przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1. Wykaż, że reszta z dzielenia liczby $c^3 - 2$ przez 3 jest równa 2.

D 8.53. Wykaż, że jeśli liczba parzysta jest niepodzielna przez 6, to sześcian tej liczby przy dzieleniu przez 6 daje resztę 2 lub 4.

D 8.54. Wykaż, że jeśli $a - b = 5$ i $a \cdot b = 7$, to $a^3 - b^3 = 230$.

D 8.55. Wykaż, że jeśli $a + b = 4$ i $a \cdot b + 9 = 0$, to $a^3 + b^3 - 172 = 0$.

D 8.56. Wykaż, że liczba $\left(1-\sqrt{2}\right)^3\left(7+5\sqrt{2}\right)$ jest liczbą całkowitą.

D 8.57. Wykaż, że liczba $\left(26-15\sqrt{3}\right)\left(2+\sqrt{3}\right)^3$ jest liczbą naturalną.

D 8.58. Wykaż, że liczba $\sqrt{\sqrt{2}-1}\cdot\sqrt[4]{3+2\sqrt{2}}$ jest liczbą naturalną.

D 8.59. Wykaż, że liczba $209^{21} - 45^{21}$ jest podzielna przez 164.

D 8.60. Wykaż, że liczba $384^{58} - 120^{58}$ jest podzielna przez 11.

D 8.61. Wykaż, że liczba $26^{24} - 15^{24}$ jest podzielna przez 41.

D 8.62. Wykaż, że liczba $3^{18} - 2^{18}$ jest podzielna przez 19.

D 8.63. Wykaż, że liczba $3^{16} - 2^{16}$ jest podzielna przez 13.

D 8.64. Wykaż, że liczba $8^{15} - 5^5$ jest podzielna przez 13.

D 8.65. Wykaż, że liczba $6^{21} - 9^{14}$ jest podzielna przez 15.

D 8.66. Wykaż, że liczba $2^{35} - 3^{28}$ jest wielokrotnością liczby 7.

Podzielność wielomianów

8.67. Podaj przykład wielomianu pierwszego stopnia, przez który jest podzielny wielomian $W(x)$, jeśli:

a) $W(x) = x^3 - 1$
b) $W(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$
c) $W(x) = 81 - x^4$
d) $W(x) = 8 + 125x^3$
e) $W(x) = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$
f) $W(x) = x^5 - 32$
g) $W(x) = 27x^6 - 64$
h) $W(x) = 4x^4 - 4x^2 + 1$.

8.68. Wskaż cztery wielomiany pierwszego stopnia, przez które jest podzielny wielomian $W(x)$, jeśli $W(x) = (4x^2 - 9)(x^2 - 4x - 5)$.

8.69. Wskaż pięć wielomianów pierwszego stopnia, przez które jest podzielny wielomian $W(x)$, jeśli $W(x) = (x^3 + 125)(6x^2 + 13x - 10)(4x^2 - 9)$.

8.70. Podaj przykład wielomianu drugiego stopnia, przez który jest podzielny wielomian $W(x)$, jeśli:

a) $W(x) = (x + 1)(x^4 + 8)(x - 3)$
b) $W(x) = 27x^3 - 1000$
c) $W(x) = 125x^3 + 216$
d) $W(x) = 8x^3 - 60x^2 + 150x - 125$.

8.71. Dany jest wielomian $W(x) = -3x^2(4 - x)(x + 2)$. Wskaż trzy wielomiany stopnia trzeciego, przez które jest podzielny wielomian $W(x)$.

8.72. Dany jest wielomian $W(x) = (9x^2 - 1)(x^2 - 4x)$. Podaj przykład wielomianu:

a) stopnia pierwszego
b) stopnia drugiego
c) stopnia trzeciego
d) stopnia czwartego,

przez który jest podzielny wielomian $W(x)$.

8.73. Podaj przykład wielomianu $F(x)$ stopnia pierwszego i takiego, że wielomian $W(x) = (x^2 + 10x + 25)\cdot F(x)$ jest podzielny przez wielomian $P(x) = x^2 + 4x - 5$.

8.74. Podaj przykład wielomianu $F(x)$ stopnia pierwszego i takiego, że wielomian $W(x) = (8x^3 - 1)\cdot F(x)$ jest podzielny przez wielomian $P(x) = 2x^2 + 5x - 3$.

8.75. Podaj przykład wielomianu $F(x)$ takiego, że wielomian $W(x) = (3 - x)(4 + 5x)\cdot F(x)$ jest podzielny przez wielomian $P(x) = -x^2 + 9x - 18$.

8.76. Podaj przykład wielomianu $F(x)$ takiego, że wielomian $W(x) = (x + 2)(x^2 - x - 6)\cdot F(x)$ jest podzielny przez wielomian $P(x) = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$.

8.77. Wielomian $W(x)$ jest podzielny przez wielomian $P(x)$. Wielomian $Q(x) = 4 + 3x$ jest ilorazem z dzielenia $W(x)$ przez $P(x)$. Wyznacz $P(x)$, jeśli:

a) $W(x) = 16 - 9x^2$ b) $W(x) = 9x^2 + 24x + 16$ c) $W(x) = -3x^2 - x + 4$.

8.78. Wielomian $W(x) = -10x^3 + 11x^2 + ax + b$ jest podzielny przez wielomian $P(x) = 1 - 2x$. Ilorazem z dzielenia $W(x)$ przez $P(x)$ jest wielomian $Q(x) = 5x^2 - 3x + 2$. Oblicz a i b.

8.79. Wielomian $W(x) = -3x^3 + (3a + b)x^2 - (4a + 9b)x + 30$ jest podzielny przez wielomian $P(x) = -3x + 5$. Ilorazem z dzielenia $W(x)$ przez $P(x)$ jest wielomian $Q(x) = x^2 - 4x + 6$. Oblicz a i b.

8.80. Wielomian $W(x) = -6x^4 + (a - b)x^3 - 21x^2 + (2a - 3b)x - 15$ jest podzielny przez wielomian $P(x) = 3x^2 - 2x + 5$. Ilorazem z dzielenia $W(x)$ przez $P(x)$ jest wielomian $Q(x) = -2x^2 + x - 3$. Oblicz a i b.

8.81. Wielomian $W(x) = 6x^3 - x^2 + 10x - 8$ jest podzielny przez wielomian $P(x)$. Ilorazem z dzielenia wielomianu $W(x)$ przez $P(x)$ jest wielomian $Q(x) = 2x^2 + x + 4$. Wyznacz $P(x)$.

8.82. Wielomian $W(x) = 2x^4 - 7x^3 + 6x^2 + 10x - 15$ jest podzielny przez wielomian $P(x)$. Ilorazem z dzielenia wielomianu $W(x)$ przez $P(x)$ jest wielomian $Q(x) = x^3 - 2x^2 + 5$. Wyznacz $P(x)$.

8.83. Wielomian $W(x) = (8x^3 - 27)(2x - 7)$ jest podzielny przez wielomian $P(x)$. Ilorazem z dzielenia $W(x)$ przez $P(x)$ jest wielomian $Q(x) = 4x^2 + 6x + 9$. Wyznacz $P(x)$.

8.84. Wielomian $W(x) = (x^3 + 216)(3x + 5)$ jest podzielny przez wielomian $P(x) = 3x^2 + 23x + 30$, a ilorazem z dzielenia $W(x)$ przez $P(x)$ jest wielomian $Q(x)$. Wyznacz $Q(x)$.

8.85. Wielomian $W(x) = (2x - 3)^2(3x + 1)^2$ jest podzielny przez wielomian $P(x) = 6x^2 - 7x - 3$, a ilorazem z dzielenia $W(x)$ przez $P(x)$ jest wielomian $Q(x)$. Wyznacz $Q(x)$.

8.86. Wielomian $W(x)$ jest podzielny przez wielomian $P(x)$, a ilorazem z dzielenia wielomianu $W(x)$ przez $P(x)$ jest wielomian $Q(x)$. Wyznacz wielomian $Q(x)$, jeśli:

a) $W(x) = x^6 - 2x^4 + 2x^3 - 2x + 1$, $P(x) = (x^3 - 2x + 1)$

b) $W(x) = x^6 - x^5 + 2x^4 - x^3 - x^2 + 2x - 2$, $P(x) = (x^4 + x^2 - 2)$

Dzielenie wielomianu przez dwumian liniowy. Schemat Hornera

8.87. Wykonaj dzielenie:

a) $(x^3 - 6x^2 + 12x - 16) : (x - 4)$

b) $(x^3 - x^2 - 5x + 21) : (x + 3)$

c) $(x^3 - 3x^2 + 3x - 2) : (x - 2)$

d) $(x^4 + 5x^3 - 12x^2 + 5x + 1) : (x - 1)$.

8.88. Wykonaj dzielenie:

a) $(100x^3 - 120x^2 + 47x - 6) : \left(x - \frac{2}{5}\right)$

b) $(38x^3 + 7x^2 - 8x - 1) : \left(x + \frac{1}{2}\right)$

c) $(16x^4 + 8x^3 - 7x^2 + 2x + 1) : \left(x + \frac{1}{4}\right)$

d) $(2x^5 + 3x^4 - 2x - 3) : \left(x + \frac{3}{2}\right)$.

8.89. Wykonaj dzielenie:

a) $(2x^4 - 15x^3 + 24x^2 - 5x - 6) : (2x - 3)$

b) $(12x^4 - 3x^3 + 8x^2 - 6x + 1) : (4x - 1)$

c) $(-2x^4 + x^3 - 16x^2 + 4) : (-2x + 1)$

d) $(-3x^4 + 2x^3 - 12x + 8) : (-3x + 2)$.

8.90. Wykonaj dzielenie z resztą:

a) $(3x^2 - 2x + 1) : (x + 2)$

b) $(-2x^3 + 4x - 3) : (x - 1)$

c) $(4x^4 + 3x^2 - 6x + 3) : (x + 1)$

d) $(-3x^4 + 2x^3 + 4) : (x - 3)$

e) $(x^5 + 4x^3 - 2x^2 + 1) : (x + 3)$

f) $(x^6 - 3x^4 + 2x^2 + 1) : (x - 2)$.

8.91. Wykonaj dzielenie, stosując schemat Hornera:

a) $(x^3 + 2x^2 + x - 4) : (x - 1)$
b) $(x^3 + 3x^2 + 3x + 2) : (x + 2)$
c) $(3x^3 - 4x^2 - x - 6) : (x - 2)$
d) $(2x^3 + 7x^2 + 8x + 15) : (x + 3)$.

8.92. Wykonaj dzielenie, stosując schemat Hornera:

a) $(3x^4 + 3x^3 + 2x^2 + 3x + 1) : (x + 1)$
b) $(2x^4 + 3x^3 - 2x^2 + 6x - 3) : (x - 0{,}5)$
c) $(3x^4 - x^3 + 6x^2 + 7x - 3) : \left(x - \frac{1}{3}\right)$
d) $(5x^4 + 9x^3 - 2x^2 + 5x - 1) : \left(x - \frac{1}{5}\right)$.

8.93. Wykonaj dzielenie, stosując schemat Hornera:

a) $(x^3 - 3x + 2) : (x - 1)$
b) $(2x^3 + x + 18) : (x + 2)$
c) $(-x^3 + 4x + 3) : (x + 1)$
d) $(5x^3 - 7x - 26) : (x - 2)$
e) $(2x^4 - 5x + 3) : (x - 1)$
f) $(-3x^4 + 2x^2 + 1) : (x + 1)$.

8.94. Wykonaj dzielenie z resztą, stosując schemat Hornera:

a) $(3x + 5) : (x + 4)$
b) $(-4x + 1) : (x - 7)$
c) $(x^3 - 1) : (x + 2)$
d) $(3x^4 - 2x + 8) : (x - 2)$
e) $(5x^5 + 2x^3 + 7) : (x - 1)$
f) $(-2x^5 + 4x^3 + 6) : (x + 3)$.

8.95. Wykonaj dzielenie:

a) $(2x^6 + 3x^2 - 15) : (x - 1)$
b) $(-3x^4 + 2x + 16) : (x - 2)$
c) $(x^5 + 1) : (x + 1)$
d) $(x^6 - 1) : (x + 1)$
e) $(x^7 + 1) : (x - 1)$
f) $(x^8 - 1) : (x - 1)$.

8.96. Oblicz resztę z dzielenia wielomianu $W(x)$ przez dwumian $P(x)$, jeśli:

a) $W(x) = -2x^3 + 4x^2 - 5x + 1$, $P(x) = x - 2$
b) $W(x) = x^4 - 2x^3 + 4$, $P(x) = x + 1$
c) $W(x) = -3x^6 + 4x^4 + 9$, $P(x) = x - 1$
d) $W(x) = x^3 + 2x^2 + 3x + 1$, $P(x) = x + 3$.

8.97. Dany jest wielomian $W(x) = x^3 + (k^2 + 1)x^2 - 2kx - 15$.

a) Dla $k = 1$ oblicz resztę z dzielenia wielomianu $W(x)$ przez dwumian $x + 3$.

D b) Uzasadnij, że jeśli $k = -5$ lub $k = 3$, to wielomian $W(x)$ jest podzielny przez dwumian $x + 1$.

8.98. Reszta z dzielenia wielomianu $W(x) = m^2x^8 - 5x^4 - 3m$ przez dwumian $x - 1$ jest równa -1. Oblicz m.

8.99. Reszta z dzielenia wielomianu $W(x) = m^2x^6 - 8x^3 + 5m$ przez dwumian $x + 1$ jest równa 2. Oblicz m.

8.100. Wyznacz wszystkie wartości parametru a, $a \in \boldsymbol{R}$, dla których reszta z dzielenia wielomianu $W(x) = 2x^4 - 3x^3 + ax^2 + a^2x + 2$ przez dwumian $x - 1$ jest większa od 3.

8.101. Wyznacz wszystkie wartości parametru a, $a \in \boldsymbol{R}$, dla których reszta z dzielenia wielomianu $W(x) = x^4 - 2x^3 - \frac{1}{4}ax^2 + a^2x + 1$ przez dwumian $x - 2$ jest mniejsza od 4.

Pierwiastek wielomianu. Twierdzenie Bezouta

8.102. Sprawdź, czy podana obok wielomianu $W(x)$ liczba c jest jego pierwiastkiem:

a) $W(x) = x^3 - 6x^2 + 12x - 7$, $c = 1$

b) $W(x) = 5x^3 - 2x^2 - 6x - 20$, $c = 2$

c) $W(x) = 6x^4 - 3x^2 + 5x + 3$, $c = -1$

d) $W(x) = x^4 + 7x^3 + 16x^2 - 24$, $c = -2$.

8.103. Dany jest wielomian $W(x)$ i zbiór A. Sprawdź, które liczby ze zbioru A są pierwiastkami wielomian $W(x)$.

a) $W(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$, $A = \{-1, \sqrt{2}, 3\}$

b) $W(x) = x^4 - 2x^2 - 3$, $A = \left\{-\sqrt{3}, -\frac{1}{3}, 1, \sqrt{3}\right\}$

8.104. Wielomian $W(x)$ jest zapisany w postaci iloczynu wielomianów pierwszego i drugiego stopnia. Podaj stopień wielomianu $W(x)$ i wyznacz pierwiastki tego wielomianu.

a) $W(x) = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)(5 - 2x)(x^2 + 1)$

b) $W(x) = (81x^2 - 4)(x^2 - x - 6)(3 - x)(x + 5)$

c) $W(x) = 5x(2x^2 + x + 1)(9x^2 - 6x + 1)(4 + x^2)$

d) $W(x) = (x^2 + 3x + 4)(1 - 2x + 8x^2)(x^2 - 9)$

8.105. Podaj przykład wielomianu $W(x)$ szóstego stopnia, zapisanego w postaci iloczynowej i którego pierwiastkami są liczby:

a) 0, 1, 2, 3, 4, 5

b) $-\sqrt{5}, -\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}, \sqrt{5}$

c) $-1, 1, 3$

d) -2.

8.106. Sprawdź, nie wykonując dzielenia, czy wielomian $W(x)$ jest podzielny przez dwumian $P(x)$, jeśli:

a) $W(x) = x^3 - 3x^2 + 4x - 12$ $P(x) = x - 3$

b) $W(x) = 2x^4 + 3x^3 + 2x^2 + x - 14$ $P(x) = x + 2$

c) $W(x) = 5x^5 - 3x^3 - 2x + 9$ $P(x) = x - 1$

d) $W(x) = -3x^7 + 8x^5 + 4x^2 + 1$ $P(x) = x + 1$.

8.107. Wyznacz liczbę k, dla której wielomian $W(x)$ jest podzielny przez dwumian $P(x)$, jeśli:

a) $W(x) = 2x^3 - (3k + 2)x^2 + 6kx - 18$ $P(x) = x + 3$

b) $W(x) = x^3 - (4k + 3)x^2 + (6k - 1)x + 25$ $P(x) = x - 5$

c) $W(x) = 2x^3 + 3k^2x^2 + kx - 20$ $P(x) = x - 2$

d) $W(x) = x^3 + 2x^2 - k^2x + 5k + 7$ $P(x) = x + 3$.

8.108. Wyznacz wszystkie pierwiastki wielomianu $W(x)$ wiedząc, że wielomian $W(x)$ jest podzielny przez $P(x)$, jeśli:

a) $W(x) = 3x^3 + 20x^2 + 11x - 6$ $P(x) = x + 1$

b) $W(x) = 2x^3 - 10x^2 + 10x - 8$ $P(x) = x - 4$

c) $W(x) = 2x^3 - 3x^2 - 20x + 21$ $P(x) = x + 3$

d) $W(x) = 8x^3 - 6x^2 - 18x - 4$ $P(x) = x - 2$

e) $W(x) = x^3 - 4x^2 - 3x + 18$ $P(x) = x - 3$

f) $W(x) = x^3 + 2x - 3$ $P(x) = x - 1$.

8.109. Dany jest wielomian $W(x)$ i liczba c. Wykaż, że liczba c jest pierwiastkiem wielomianu $W(x)$. Następnie wyznacz pozostałe pierwiastki wielomianu $W(x)$, o ile istnieją.

a) $W(x) = x^3 - x^2 - 16x - 20$, $c = -2$

b) $W(x) = x^3 - x^2 - 8x + 8$, $c = 1$

c) $W(x) = 2x^3 + 7x^2 + 2x - 3$ $c = -3$

d) $W(x) = x^3 + 5x^2 + 5x + 25$, $c = -5$

8.110. Wykaż, że liczba c jest pierwiastkiem wielomianu $W(x)$. Następnie wyznacz pozostałe pierwiastki wielomianu $W(x)$, o ile istnieją.

a) $W(x) = x^5 + 2x^4 + 2x^3 + 4x^2 - 3x - 6$, $c = -2$

b) $W(x) = x^5 - x^4 + 3x^3 - 3x^2 + 2x - 2$, $c = 1$

c) $W(x) = 2x^5 + 2x^4 - 20x^3 - 20x^2 + 18x + 18$, $c = -1$

d) $W(x) = x^5 - 2x^4 - 15x^3 + 30x^2 - 16x + 32$, $c = 2$

8.111. Wyznacz liczbę a, dla której liczba c jest pierwiastkiem wielomianu $W(x)$. Dla obliczonej wartości a, podaj pozostałe pierwiastki tego wielomianu.

a) $W(x) = x^3 + 2x^2 - x + a$, $c = 1$

b) $W(x) = 3x^3 - (4a + 5)x^2 + 28x - 4a$, $c = 2$

8.112. Wielomian $W(x)$ jest podzielny przez podany obok wielomianu dwumian. Oblicz a. Następnie wyznacz wszystkie pierwiastki wielomianu $W(x)$.

a) $W(x) = 4x^3 + 5x^2 + ax - 2$, $x + \frac{1}{4}$

b) $W(x) = 4x^3 + 6ax^2 + (4a + 2)x - 12$, $x - \frac{1}{2}$

8.113. Liczby x_1 i x_2 są pierwiastkami wielomianu $W(x)$. Oblicz a i b. Następnie znajdź trzeci pierwiastek wielomianu $W(x)$.

a) $W(x) = x^3 - (a + b)x^2 - (a - b)x + 3$, $x_1 = 1$, $x_2 = 3$

b) $W(x) = 2x^3 + (a + b)x^2 + (5b + 2a)x - 8$, $x_1 = 4$, $x_2 = -\frac{1}{2}$

8.114. Oblicz wartości współczynników a i b wielomianu $W(x)$ wiedząc, że wielomian ten jest podzielny przez podany obok trójmian kwadratowy $P(x)$. Podaj wszystkie pierwiastki wielomianu $W(x)$.

a) $W(x) = x^3 + ax^2 - bx + 6$ $P(x) = (x - 1)(x - 2)$

b) $W(x) = 3x^3 + ax^2 - 15x + b$ $P(x) = 3x^2 + 11x - 4$

D 8.115. Wykaż, że dla dowolnej liczby naturalnej dodatniej n wielomian $W(x) = n \cdot x^{n+1} - (n - 1)x^n - 1$ jest podzielny przez dwumian $x - 1$.

D 8.116. Wykaż, że dla dowolnej liczby naturalnej dodatniej n wielomian $W(x) = x^{2n-1} + (n - 1)x^2 + nx + 2$ jest podzielny przez dwumian $x + 1$.

Pierwiastki wymierne wielomianu

8.117. Wyznacz całkowite pierwiastki wielomianu $W(x)$, jeśli:

a) $W(x) = x^3 + 4x^2 + x - 6$
b) $W(x) = 2x^3 - 2x^2 - 2x - 4$
c) $W(x) = 2x^3 - 5x^2 - 2x + 5$
d) $W(x) = 3x^3 + 7x^2 - 4$
e) $W(x) = x^4 + x^3 - 11x^2 - 9x + 18$
f) $W(x) = 5x^4 + 15x^3 - 19x^2 + 3x - 4$.

D 8.118. Wykaż, że wielomian $W(x) = 4x^4 + 4x^3 + 11x^2 - x - 3$ nie ma pierwiastków całkowitych.

D 8.119. Wykaż, że wielomian $W(x) = x^3 + 6x^2 + 3x - 10$ ma tylko całkowite pierwiastki.

8.120. Wyznacz całkowite pierwiastki wielomianu $W(x)$.

a) $W(x) = \frac{1}{4}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - x + 2$
b) $W(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{7}{3}x + 2$
c) $W(x) = \frac{1}{2}x^3 + \frac{5}{2}x^2 + 5x + 12$
d) $W(x) = \frac{1}{2}x^4 + x^3 - \frac{13}{2}x^2 - 7x + 12$

8.121. Wyznacz wszystkie pierwiastki wielomianu $W(x)$ wiedząc, że ten wielomian ma pierwiastek całkowity.

a) $W(x) = x^3 + 2x^2 - 3x - 10$
b) $W(x) = 3x^3 + 8x^2 + 3x - 2$
c) $W(x) = x^3 + 2x^2 - 15x - 36$
d) $W(x) = -2x^3 + 28x - 16$
e) $W(x) = 2x^3 + 4x - 24$
f) $W(x) = x^5 - x^4 + 2x^3 - 2x^2 + x - 1$
g) $W(x) = 4x^5 - 8x^4 - 4x^3 + 8x^2 + x - 2$
h) $W(x) = x^5 - x^4 - x^3 + x^2 - 6x + 6$

D 8.122. Wykaż, że jeśli $a \in \mathbf{Z}$ oraz wielomian $W(x) = x^4 + 2x^3 - 4x^2 + ax - 2$ ma pierwiastek, będący liczbą pierwszą, to wielomian $W(x)$ ma dwa pierwiastki całkowite.

D 8.123. Wykaż, że jeśli $a \in \mathbf{Z}$ oraz wielomian $W(x) = x^3 + ax^2 + x - 12$ ma pierwiastek, który jest nieparzystą liczbą pierwszą, to reszta z dzielenia wielomianu $W(x)$ przez $x - 1$ jest równa -12.

D 8.124. Współczynniki a i b wielomianu $W(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 - 5x + 6$ są liczbami całkowitymi, a dwa pierwiastki wielomianu $W(x)$ są liczbami pierwszymi.

a) Oblicz a i b.

b) Wykaż, że wielomian $W(x)$ ma tylko dwa pierwiastki.

8.125. Wielomian $W(x) = x^3 - ax^2 - x + 5$ ma trzy całkowite pierwiastki. Wiedząc, że a jest liczbą pierwszą, wyznacz pierwiastki wielomianu $W(x)$.

Rozkładanie wielomianów na czynniki

8.126. Rozłóż wielomiany na czynniki, stosując wzory skróconego mnożenia.

a) $625x^4 - 1$
b) $x^4 - 2x^2 + 1$
c) $-4 - 20x^2 - 25x^4$
d) $81x^4 - 16$
e) $(x-4)^2 - (2x+1)^2$
f) $9x^2 - 6x + 1 - (2x+5)^2$

8.127. Rozłóż wielomiany na czynniki, stosując wzory skróconego mnożenia.

a) $-x^3 + 3x^2 - 3x + 1$
b) $8x^3 + 36x^2 + 54x + 27$
c) $1 + 8x^3$
d) $216x^3 - 125$
e) $(x-5)^3 - 8x^3$
f) $27x^3 - (2x+1)^3$

8.128. Rozłóż dane wielomiany na czynniki, wyłączając wspólny czynnik poza nawias.

a) $4x^4 - 4x^3 + x^2$
b) $(x^2+2)(2x-3) + 5x(x^2+2)$
c) $x(3x^2+1) - 4(3x^2+1)$
d) $(5x-1)(x^2+1) + (5x-1)(6-2x^2)$
e) $(2x-5)x^2 - 3x(2x-5)$
f) $9(x-4) + (x-4)x^2 + 6x(x-4)$

8.129 Rozłóż dane wielomiany na czynniki, wyłączając wspólny czynnik poza nawias.

a) $5x^2(x-1) + 7x(1-x) + 2(x-1)$
b) $-2x^2(2-x) + 3x(x-2) + 2(2-x)$
c) $(4x-1)^2x + (1-4x)x^2 - (4x-1)$
d) $x(x+5) - x^2(x+5) - 2(-x-5)$
e) $(-1-x)(x^2-1) - (x+1)^2$
f) $(x^2-9)x - (x-3)^2$

8.130. Zamień sumę algebraiczną na iloczyn, stosując metodę grupowania wyrazów.

a) $a(x+y) + bx + by$
b) $ax + bx - ay - by$
c) $cx - cy - ay + ax$
d) $x^2 - xy + ax - ay$
e) $y^2 + 2xy - 2x - y$
f) $3ac - bc - b + 3a$

8.131. Rozłóż dane wielomiany na czynniki, stosując grupowanie wyrazów.

a) $x^3 + 3x^2 - 4x - 12$
b) $7x^3 + 2x^2 - 21x - 6$
c) $3x^3 - 6x^2 + 4x - 8$
d) $x^3 - x^2 + x - 1$
e) $4x^3 + 4x^2 - x - 1$
f) $-9x^3 - 18x^2 + x + 2$

8.132. Rozłóż dane wielomiany na czynniki, stosując grupowanie wyrazów.

a) $9x^3 - 4x^2 - 27x + 12$
b) $5x^3 - 4x^2 - 5x + 4$
c) $16x^3 + 16x^2 - 4x - 4$
d) $18x^3 + 9x^2 - 18x - 9$
e) $3x^3 - 7x^2 - 27x + 63$
f) $10x^3 + 15x^2 + 8x + 12$

8.133. Rozłóż dane wielomiany na czynniki, stosując grupowanie wyrazów.

a) $-3x^3 - 4x^2 + 12x + 16$
b) $20x^3 + 12x^2 - 45x - 27$
c) $-4x^3 + 2x^2 - 6x + 3$
d) $-6x^3 - 16x^2 + 3x + 8$
e) $2x^4 + 3x^3 - 2x^2 - 3x$
f) $3x^4 - x^3 - 15x^2 + 5x$

8.134. Rozłóż dane wielomiany na czynniki.

a) $x^4 + 2x^3 - x - 2$
b) $8x^4 + 24x^3 + x + 3$
c) $x^4 - x^3 - 27x + 27$
d) $125x^4 - 125x^3 - 8x + 8$
e) $8x^4 + 8x^3 - x - 1$
f) $3x^4 + 2x^3 - 24x - 16$

8.135. Rozłóż dane wielomiany na czynniki.

a) $(x + 2)(x + 2) - 4x - 8$
b) $(x - 3)(x + 3) - 4x + 12$
c) $2x - 14 + 5(x - 7)x^2$
d) $3x^3 - 4x^2 - (3x - 4)^2$
e) $2x + 3 - (4x + 6)(2x - 3)$
f) $2 + x + (4 + 2x)^2$

8.136. Rozłóż dane wielomiany na czynniki.

a) $x^2 - 1 + (x^2 - 1)(x^2 + 1)$
b) $3(x + 5)^3 - (x^2 + 10x + 25)$
c) $(x^2 + 8x + 16)x^2 - (x + 4)^2$
d) $4 - x^2 - (x - 2)(x + 2)(x - 3)$
e) $x^3 - 8 + (x - 2)(x^2 - 3x + 1)$
f) $(3x + 1)(2x^2 + 5) + 27x^3 + 1$

8.137. Rozłóż dany wielomian na czynniki wiedząc, że ma on całkowity pierwiastek.

a) $2x^3 + x^2 - 5x + 2$
b) $x^3 + 3x - 4$
c) $3x^3 + 8x^2 + 3x - 2$
d) $x^3 - 7x^2 + 11x - 5$
e) $2x^3 - x^2 - 7x + 6$
f) $3x^3 + 11x^2 + 5x - 3$

8.138. Rozłóż dane wielomiany na czynniki.

a) $x^3 + 4x^2 + x - 6$
b) $2x^7 - 4x^5 + 2x^3$
c) $27 - (4x + 1)^3$
d) $x^3 + 4x^2 - 3x - 18$
e) $5x^4 + 8x^3 + x^2 - 2x$
f) $3\sqrt{2}x^3 - x^2 - 27\sqrt{2}x + 9$

8.139. Rozłóż dane wielomiany na czynniki.

a) $(x+3)^3+4(x+3)^2+4(x+3)$
b) $(2x-3)^3-2(2x-3)^2+(2x-3)$
c) $(4x-5)^3-9(4x-5)$
d) $3(x-2)^3-(x^2-4)(x-2)$
e) $(4x-1)^3-(3x+2)^3$
f) $(2x+3)^3-8x-12$

8.140. Rozłóż dane wielomiany na czynniki.

a) $2x^4-x^2-1$
b) $-x^4+10x^2-9$
c) x^6-7x^3-8
d) $(x^2-3x)^2-9x^2$
e) $9x^2-(x^2+2)^2$
f) $(x+1)^4-5(x+1)^2+4$

Równania wielomianowe

8.141. Rozwiąż równanie:

a) $x^3-8=0$
b) $x^3+64=0$
c) $x^5+1=0$
d) $81x^4-1$
e) $x^6-64=0$
f) $x^8+2x^4+1=0$

8.142. Rozwiąż równanie:

a) $(4-x)(x+5)(2x-3)=0$
b) $(x^2-4x+1)(x^2+5)(8-x^3)=0$
c) $(x^2+6x+2)(8x^2-4x)=0$
d) $(9x^2-25)(125x^3+216)=0$
e) $(2x^2+x+1)(3x^2+12)=0$
f) $(x^4-256)(3x^2-6)(x^3+27)=0$

8.143. Rozwiąż równanie:

a) $x^2(x^2-4)=3(x^2-4)$
b) $-5(x^2-3x)=x^2(3x-x^2)$
c) $x^2(4-x)+9x-36=0$
d) $4x^2(3-2x)+4x^2=6x$
e) $(x-1)^2-2x(x-1)=1-x$
f) $9x^2(x+2)+6x(x+2)=-x-2$

8.144. Rozwiąż równanie:

a) $x^5-x^3-x^2+1=0$
b) $8x^5-32x^3-x^2+4=0$
c) $2x^5+3x^3-16x^2-24=0$
d) $x^5-x^3-125x^2+125=0$
e) $8x^5-128x^3+x^2-16=0$
f) $-27x^5+54x^3-x^2+2=0$

8.145. Rozwiąż równanie:

a) $x^4-3x^3+4x^2=12x$
b) $3x^5-2x^4+2-3x=0$
c) $3x^3-7x^2-7x+3=0$
d) $x^4+4x^3=5x^2+20x$
e) $x^3-8=(x-2)(x+6)$
f) $x^5-2x^3=(2-x^2)x^2$

8.146. Rozwiąż równanie:

a) $x^4 - 12 = x^2$
b) $(x^2 + 1)(x^2 + 5) = 2x^2 + 2$
c) $x^3(x^3 - 7) = 8$
d) $x^4 + 8 = 9x^2$
e) $(x^3 + 1)^2 = 81x^6$
f) $10x^6 - 7x^3 + 1 = 0$

8.147. Rozwiąż równanie:

a) $4x(x^2 - 1) + (x + 1) = 0$
b) $x - 3 + 2x(x^2 - 9) = 0$
c) $x^3 - 13x - 12 = 0$
d) $x^3 - 5x + 12 = 0$
e) $4x^3 - 1 = 3x$
f) $x^3 - 5x + 2 = 0$

8.148. Rozwiąż równanie:

a) $x^3 + 12x^2 + 44x + 48 = 0$
b) $x^3 - 9x^2 + 23x = 15$
c) $7(x^2 - x^3) = 9 - 5x^3$
d) $x(x^2 + 1) - 2(2x^2 - 3) = 0$
e) $4(3x^2 + 5x + 6) = x^2(x^2 - 3x - 2)$
f) $2(3x^3 + 5) = 7x(4x + 1) + x^2$

8.149. Rozwiąż równanie:

a) $(x^2 - 3)^2 = 4x^2$
b) $(x^3 - 2)^2 = 36$
c) $x^3 - 8(x - 1)^3 = 0$
d) $x^4 - (3x^2 + 2)^2 = 0$
e) $64x^3 + (x + 5)^3 = 0$
f) $125x^3 = (x + 1)^3$

8.150. Rozwiąż równanie:

a) $x^3(x^2 - 25) = 200x - 8x^3$
b) $2(x^4 + 3) = 13x^2$
c) $x^6 - 26x^3 = 27$
d) $(x + 1)(x - 4) = x^3 + 1$
e) $(2x - 1)(x^2 - 1) = 5{,}5(x + 1)$
f) $x^3 - 21x + 20 = 0$

8.151. Rozwiąż równanie:

a) $8\sqrt{3}x^3 - 20x^2 = 2\sqrt{3}x - 5$
b) $x^7 - 5x^5 + 4x^3 = 0$
c) $(4x - 3)(x^2 - 4) = (3x^2 - 12)(3 + 2x)$
d) $x^2(2x - 1) = (6x - 3)(1 - 2x)$
e) $7x^2 = 2x^3 + 9$
f) $3x^3 + 5x^2 - 12x - 20 = 0$

8.152. Rozwiąż równanie:

a) $5x^5 + 4x^4 = 5x + 4$
b) $2(x^3 + 1) + 7x^2 + 7x = 0$
c) $x^7 - x^5 = 16x^5 - 16x^3$
d) $(3x + 1)(x^2 - 9) = 4(3 - x)$
e) $x^8 + x^4 = 2$
f) $x^6 = 40 - 3x^3$

8.153. Rozwiąż równanie:

a) $3x(x+3) = 2(x^3+5)$
b) $6x^3 - 13x^2 = 2 - 9x$
c) $2x^2(x^2 - x - 20)(x^3 - 125) = 0$
d) $4x^3 - 13x^2 - 13x + 4 = 0$
e) $(5x-7)x^2 + 4(5x-7) = 20x^2 - 28x$
f) $6x^3 - 11x^2 - 12x + 5 = 0$

Zadania prowadzące do równań wielomianowych

8.154. Liczba 1 jest pierwiastkiem wielomianu $W(x) = x^3 + (a^3-1)x^2 + (2a^2+4a+23)x - 15$.

a) Oblicz a.

b) Rozłóż wielomian $W(x)$ na czynniki możliwie najniższego stopnia.

8.155. Liczba -2 jest pierwiastkiem wielomianu $W(x) = x^4 + 8x^3 + (4a^2+8)x^2 + a^4 - a^2$.

a) Oblicz a.

b) Wyznacz pozostałe pierwiastki wielomianu $W(x)$ i podaj krotność wszystkich pierwiastków.

D 8.156. Wykaż, że jeśli suma współczynników wielomianu $W(x) = x^3 + (2a^3 - 6a^2)x^2 + 9a - 28$ jest równa 0, to wielomian $W(x)$ przyjmuje wartość 0 tylko wtedy, gdy $x = 1$.

8.157. Wielomian $W(x) = x^3 + 4a^2(a-1)x + 3ax - 4$ jest podzielny przez dwumian $(x-1)$.

a) Oblicz a.

b) Wyznacz iloraz z dzielenia wielomianu $W(x)$ przez dwumian $(x-1)$.

D 8.158. Wykaż, że istnieją trzy wartości parametru a, dla których reszta z dzielenia wielomianu $W(x) = x^3 + x^2 + (a^3 - a^2)x + 6a$ przez dwumian $(x+3)$ jest równa -12.

8.159. Iloczyn kwadratu pewnej liczby i kwadratu liczby o 3 od niej większej jest równy 324. Wyznacz te liczby.

8.160. Iloczyn trzech liczb całkowitych, z których druga jest o 3 większa od pierwszej, a trzecia o 1 mniejsza od drugiej, jest równy -30. Wyznacz te liczby.

8.161. Uczniowie pewnej klasy podzielili się na trzy wieloosobowe grupy. W drugiej grupie jest o 6 osób więcej niż w pierwszej, a w trzeciej grupie jest o 10 osób więcej niż w pierwszej. Iloczyn liczby uczniów grupy drugiej i trzeciej jest o 76 większy od sześcianu liczby uczniów pierwszej grupy. Ilu uczniów liczy ta klasa?

8.162. Cyfra dziesiątek pewnej naturalnej liczby trzycyfrowej jest dwa razy większa od cyfry setek, a cyfra jedności tej liczby jest o 1 mniejsza od cyfry setek. Wyznacz tę liczbę trzycyfrową wiedząc, że różnica sześcianu cyfry setek i iloczynu pozostałych cyfr jest równa 4.

8.163. Suma objętości trzech sześcianów jest równa 73 cm^3. Krawędź drugiego sześcianu jest o 2 cm dłuższa od krawędzi pierwszego sześcianu, a krawędź trzeciego sześcianu jest o 1 cm krótsza od krawędzi pierwszego sześcianu. Oblicz długości krawędzi tych sześcianów.

8.164. Śmietana pakowana jest w prostopadłościenne pudełka o pojemności 0,4 l. Podstawa pudełka jest kwadratem. Wysokość pudełka jest o 6 cm krótsza od krawędzi podstawy. Wyznacz wymiary pudełka.

8.165. Z prostokątnego kawałka blachy o wymiarach 0,5 m $\times$ 0,4 m należy wyciąć we wszystkich rogach jednakowe kwadraty tak, żeby po zgięciu odpowiednich krawędzi otrzymać otwarty, prostopadłościenny pojemnik. Jakiej wymiary powinny mieć wycięte kwadraty, aby objętość pojemnika była równa 6 litrów?

8.166. Akwarium ma kształt prostopadłościanu. Krawędzie jednego akwarium wychodzące z wierzchołka przy podstawie mają długość 3 m, 5 m, 2 m. Krawędzie drugiego akwarium są odpowiednio dłuższe o stały odcinek od krawędzi pierwszego akwarium. Wyznacz wymiary większego akwarium wiedząc, że jego pojemność jest o 110 m^3 większa od pojemności pierwszego akwarium.

8.167. Iloczyn trzech kolejnych liczb parzystych jest równy 192. Jakie to liczby?

8.168. Iloczyn trzech kolejnych liczb nieparzystych jest o 65 większy od różnicy kwadratów największej i najmniejszej z nich. Znajdź te liczby.

Test sprawdzający do rozdziału 8.

1. Wyrażenie $(-1-2x)(4x^2+1-2x)$ jest równe:

A. $1+8x^3$ B. $-8x^3-1$ C. $8x^3-1$ D. $1-8x^3$

2. Wielomian $W(x)=x^3+a^2x^2+4ax+5$ dla $x=-1$ przyjmuje wartość 0. Wobec tego:

A. $a=-2$ B. $a=-1$ C. $a=1$ D. $a=2$

3. Suma wszystkich współczynników wielomianu $W(x)=(3x^2-2x^3+1)^7$ jest równa:

A. -2 B. 2 C. $=128$ D. -128

4. Jeśli $P(x)=x+3$, gdzie $x\in\boldsymbol{R}$, to wielomian $W(x)=P(x)\cdot(x^2-x-6)$ ma trzy pierwiastki:

A. $-3,-1,6$ B. $-3,-2,3$ C. $-6,-3,1$ D. $-3,2,3$

5. Jeśli wielomiany $W(x)=(x-a)(2x^2+3)$ oraz $P(x)=2x^3+4x^2+3x+b$ są równe, to:

A. $a+b=-1$ B. $a+b=0$ C. $a+b=2$ D. $a+b=4$

6. Sześcian liczby $\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}$ jest równy:

A. 6

B. $\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)^2$

C. $6+\sqrt[3]{16}$

D. $6\left(1+\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)$

7. Jeśli $P(x)=(-x-3)^3$ oraz $Q(x)=(x^2-3x+9)(x+3)+9x^2$, to stopień wielomianu $P(x)+Q(x)$ jest równy:

A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

8. Wielomian $W(x)=x^5-3x^3-8$ jest podzielny przez dwumian:

A. $x-8$ B. $x+2$ C. $x-2$ D. $x+4$

9. Wielomian $W(x)=(2x-1)(3-x)(2x+1)$ nie jest podzielny przez wielomian:

A. $3+5x-2x^2$ B. $1-4x^2$ C. $-2x^2+7x-3$ D. $4x^2-4x+1$

10. Reszta z dzielenia wielomianu $W(x) = 2(x^2 - 3x + 1)^2 - (5 - 2x)^2$ przez dwumian $x + 1$ jest równa:

A. 1 B. –7 C. 6 D. –5

11. Ilorazem z podzielenia wielomianu $2x^3 - 3x^2 - 4$ przez dwumian $x - 2$ jest wielomian:

A. $2x^2 + x - 2$ B. $2x^2 + x + 2$ C. $2x^2 + 2$ D. $2x^2 - x + 2$

12. Wyrażenie $5x^5 - 5x^2$ po rozłożeniu na czynniki przyjmuje postać:

A. $5(x^2 \cdot x^3 - x \cdot x)$ B. $5x \cdot (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$

C. $x^2 \cdot (x - 1)(5x^2 + 5x + 5)$ D. $5 \cdot x^2(x - 1)(x + 1)^2$

13. Liczba pierwiastków wielomianu $(3x^2 - 4)(2x^2 + x + 1)(8x^3 + 125)$ jest równa:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 7

14. Iloczyn rozwiązań równania $2x(x - 4) = (x - 4)(x^2 - 3)$ wynosi:

A. 0 B. –3 C. 12 D. –12

15. Które z podanych równań jest sprzeczne?

A. $(x - 3)^3 = 5 \cdot (x - 3)^3$ B. $x^4 + 3 = -4x^2$

C. $(2x - 1)^4 - 1 = 0$ D. $(x^3 - 1)^3 = -27$

Zadania powtórzeniowe do rozdziału 8.

16. Dane są wielomiany $W(x) = (x^2 + 2x + 4)(2 - x)$ oraz $G(x) = (x - 1)^3$. Zapisz wielomian $F(x) = W(x) \cdot (x - 4) - (1 - x) \cdot G(x)$ w postaci uporządkowanej. Ile pierwiastków ma wielomian $F(x)$?

17. Sprawdź, czy istnieją liczby a i b, dla których wielomiany $W(x) = x^3 + a^2x^2 - 3x + a$ oraz $F(x) = x^3 + 4x^2 + (a + b)x + b - 1$ są równe.

18. Usuń niewymierność z mianownika ułamka:

a) $\frac{1}{2\sqrt[3]{5} - 1}$ b) $\frac{1}{\sqrt[3]{4} - 3\sqrt[3]{2} + 9}$

19. Wielomian $W(x)$ rozłóż na czynniki możliwie najniższego stopnia. Następnie podaj jego pierwiastki.

a) $W(x) = -x^5 + 25x^3 + x^2 - 25$ b) $W(x) = x^4 - 31x^2 + 30x$

20. Wielomian $W(x) = a(x^2 - 1)(x + 3)$, gdzie $a \neq 0$, dla liczby 3 przyjmuje wartość 96.

a) Oblicz a.

b) Wyznacz pierwiastki wielomianu $F(x) = W(x) - 10(x + 1)$.

21. Reszta z dzielenia wielomianu $W(x) = x^3 + (a^3 - 2)x^2 + 2a^2x - a + 5$ przez dwumian $x - 1$ jest równa 6. Oblicz a.

22. Wielomian $W(x) = 2x^3 + (b - a)x^2 - (3a - b)x + a + 2b$ jest podzielny przez dwumian $x - 3$, natomiast reszta z dzielenia wielomianu $W(x)$ przez dwumian $x + 1$ jest równa 12.

a) Oblicz a i b.

b) Wyznacz całkowite pierwiastki wielomianu $W(x)$.

23. Rozwiąż równanie:

a) $(2x - 5)^3 - 8 = 0$

b) $4x^4 + 35x^2 - 9 = 0$

c) $x^4 + 3x^3 - 2x - 6 = 0$

d) $3x^3 - 10x^2 + 9x = 2$.

24. W trzycyfrowej liczbie nieparzystej podzielnej przez 5, cyfra dziesiątek jest o 2 mniejsza od cyfry setek. Wyznacz tę liczbę wiedząc, że sześcian cyfry dziesiątek jest o 12 mniejszy od iloczynu pozostałych cyfr.

25. Wielomian $W(x)$ jest trzeciego stopnia i ma trzy całkowite pierwiastki, z których jeden jest równy -2, a drugi 4. Reszta z dzielenia tego wielomianu przez dwumian $x + 1$ jest równa -10. Wiedząc, że suma wszystkich współczynników tego wielomianu wynosi 0, wyznacz wzór wielomianu $W(x)$:

a) w postaci iloczynu dwumianów stopnia pierwszego,

b) w postaci uporządkowanej malejąco.

D 26. Wykaż, że wielomian $W(x) = (2x^{10} + 3x)^{15} + 1$ jest podzielny przez dwumian $(x + 1)$ i nie jest podzielny przez dwumian $(x - 1)$.

D 27. Wykaż, że jeśli $x - y = 5$ oraz $x \cdot y = 1$, to $x^3 - y^3 = 140$.

D 28. Wykaż, że liczba:

a) $5^{18} - 7^{12}$ jest podzielna przez 19

b) $5^{51} - 3^{17}$ jest podzielna przez 61.

D 29. Wykaż, że dla dowolnej liczby całkowitej nieparzystej x liczba $3x^3 + 9x^2 - x - 3$ jest podzielna przez 4.

D 30. Wykaż, że suma sześcianów trzech kolejnych liczb naturalnych niepodzielnych przez 4 jest podzielna przez 4.

D 31. Wykaż, że $a^4 \leq \frac{1+4a^8}{4}$.

D 32. Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej a różnej od zera, wartość wyrażenia $(a-1)^2(a+1)^2 - a(1-2a)^3 - 12a^3 - a$ jest ujemna.

D 33. Wykaż, że $(x+3)^3 - (x-1)^3 \geq 16$ dla dowolnej liczby rzeczywistej x.

Odpowiedzi do zadań

1. Przekształcenia wykresów funkcji

Wektor w układzie współrzędnych – podstawowe informacje

1.2. $\vec{u} = [3, 0]$, $\vec{v} = [-4, 0]$, $\vec{r} = [0, 5]$, $\vec{p} = [0, -4]$, $\vec{k} = [4, 2]$, $\vec{l} = [-4, 3]$, $\vec{m} = [-4, -2]$, $\vec{s} = [3, -5]$

1.3. a) $\overrightarrow{AB} = [6, -3]$ b) $\overrightarrow{AB} = \left[2, 3\sqrt{3}\right]$ c) $\overrightarrow{AB} = \left[\frac{1}{2}, 2\frac{2}{3}\right]$ d) $\overrightarrow{AB} = \left[9\frac{1}{2}, -14\right]$

1.4. $\overrightarrow{AB} = [3, -1]$, $\overrightarrow{CA} = [2, -8]$, $\overrightarrow{BC} = [-5, 9]$, $\overrightarrow{BA} = [-3, 1]$, $\overrightarrow{AC} = [-2, 8]$, $\overrightarrow{CB} = [5, -9]$

1.5. a) 13 b) $7\frac{1}{2}$ c) 61 d) 3

1.6. a) $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \sqrt{13}$ b) $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \sqrt{5}$ c) $\left|\overrightarrow{AB}\right| = 25$ d) $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \frac{3\sqrt{13}}{4}$

1.7. a) $B(-3, 9)$ b) $B(-1, 13)$ c) $B(4, -9)$ d) $B\left(4\sqrt{2}, \sqrt{2}\right)$

1.8. a) $A(-5, 7)$ b) $A(5, -11)$ c) $A\left(\frac{1}{4}, 4\frac{1}{6}\right)$ d) $A\left(-\sqrt{3}, -5\right)$

1.9. wektory równe: $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{CE}$; pary wektorów przeciwnych: $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{CE}$ i $\overrightarrow{AD}$ oraz $\overrightarrow{AE}$ i $\overrightarrow{CD}$

1.10. a) $P(1, 4)$ b) $P\left(-1\frac{1}{2}, 2\frac{1}{2}\right)$

1.11. a) $S(-2, 1)$ b) $S(1, 1)$ c) $S(-1, 8)$ d) $S\left(-3\frac{1}{2}, -3\frac{1}{2}\right)$

1.12. a) $B(4, -1)$ b) $B(12, -4)$ c) $B(0, -2)$ d) $B(-8, -3)$

1.13. a) $A(-7, 5)$ b) $A(4, 6)$

1.14. Wektory $\overrightarrow{CA}$ i $\overrightarrow{BD}$ są przeciwne; *wskazówka:* wykaż, że trójkąty ACB i CDB są przystające.

1.15. a) $\overrightarrow{FS}$, $\overrightarrow{SC}$, $\overrightarrow{ED}$

1.16. $|AB| = \sqrt{82}$; $|AC| = 5\sqrt{2}$; $|BC| = 4\sqrt{2}$; trójkąt jest prostokątny

1.17. a) $\sqrt{58} + \sqrt{5} + \sqrt{37}$ b) $\frac{\sqrt{89}}{2}$

1.18. a) tak; $8\sqrt{5}$ b) nie; $12\sqrt{2} + 2\sqrt{17}$

1.19. a) $D(-2, 2)$ b) $S(-0{,}5; 2)$ c) $|AC| = \sqrt{61}$, $|BD| = 3$

1.20. $C(2, 2)$, $D(0, 7)$, $|AB| = |CD| = \sqrt{29}$, $|BC| = |AD| = 5$

1.21. $B(3, -4)$, $|AB| = 10$

Przesunięcie równoległe. Przesunięcie równoległe wzdłuż osi *OX*

1.22. a) $A_1(1, 2)$ b) $A_1(3, 5)$ c) $A_1(5, 10)$

1.23. a) $B(6, 2)$ b) $B(10, -3)$ c) $B(1, -5)$

1.24 a) $h(x) = f(x - 3)$

x	1	2	3	4	5	6
$h(x)$	0	1	2	0	1	2

b) $h(x) = f(x + 2)$

x	−4	−3	−2	−1	0	1
$h(x)$	0	1	2	0	1	2

1.25. a)

x	7	8	9	10	11
$g(x)$	−10	−5	0	5	10

1.26. a) o 4 jednostki w prawo; $\vec{u} = [4, 0]$ b) o 6 jednostek w lewo; $\vec{u} = [-6, 0]$

c) o 5 jednostek w lewo; $\vec{u} = [-5, 0]$ d) o 10 jednostek w prawo; $\vec{u} = [10, 0]$

1.27. $D_f = \langle -6, 3 \rangle$ $D_g = \langle -2, 7 \rangle$ $D_h = \langle -7, 2 \rangle$

1.28. miejsca zerowe: funkcji f: −3 oraz 2; funkcji g: −6 oraz −1; funkcji h: −1 oraz 4

1.29. a) 2 b) −6

1.30. a) $g(x) = \sqrt{x+3}$, $\vec{u} = [-3, 0]$



b) $g(x) = (x - 2)^2$, $\vec{u} = [2, 0]$



c) $g(x) = -\frac{1}{2}(x-5) = -\frac{1}{2}x + 2{,}5$, $\vec{u} = [5, 0]$ d) $g(x) = |x+1|$, $\vec{u} = [-1, 0]$





e) $g(x) = (x+1)^3$, $\vec{u} = [-1, 0]$



f) $g(x) = \frac{1}{x-3}$, $\vec{u} = [3, 0]$



1.31. a) $\vec{u} = [5, 0]$ b) $\vec{u} = [-10, 0]$ c) $\vec{u} = [3, 0]$ d) $\vec{u} = [-8, 0]$ e) $\vec{u} = [1, 0]$ f) $\vec{u} = [4, 0]$

1.32. a) $g(1) = 4$ b) funkcja g jest malejąca w przedziale $(-\infty, 3\rangle$ i rosnąca w przedziale $\langle 3, +\infty)$

1.33. a) $D = \langle -2, +\infty)$ b) -2

1.34. a) $D_g = \mathbf{R} - \{1\}$ b) $(0, -1)$ c) $(-\infty, 1), (1, +\infty)$

1.35. a) $g(x) = (x + 2)^3$

1.36. a) $D_g = (-1, 7\rangle$ b) funkcja g jest malejąca w przedziale $(-1, 4\rangle$ i rosnąca w przedziale $\langle 4, 7\rangle$

1.37. d) $D_g = \langle -2017, -2002\rangle$

1.38. miejsca zerowe: $-12, -8, -2$; zbiór wartości: $\langle -3, 5)$

1.39. c) $(5, 10), (10, 11), (11, 5)$

1.40. a) $g(x) = x^2 - 10x + 26$ b) $g(x) = 2x + 5$
c) $f(x) = x^2 - x - 2$ d) $g(x) = (x - 3)(x - 9)$

Przesunięcie równoległe wzdłuż osi *OY*

1.42. a) $h(x) = f(x) + 2$ b) $h(x) = f(x) - 7$

x	-2	-1	0	1	2	3
$h(x)$	6	5	4	2	3	4

x	-2	-1	0	1	2	3
$h(x)$	-3	-4	-5	-7	-6	-5

1.44. a) $\vec{u} = [0, 1]$ b) $\vec{u} = [0, -2]$ c) $\vec{u} = [0, -6]$ d) $\vec{u} = [0, 3]$

1.45. a) o 4 jednostki do dołu; $\vec{u} = [0, -4]$ b) o 2 jednostki do góry; $\vec{u} = [0, 2]$
c) o 8 jednostek do góry; $\vec{u} = [0, 8]$ d) o 3 jednostki do dołu; $\vec{u} = [0, -3]$

1.46. -45

1.47. 8

1.48. dla funkcji f: $(0, 2)$; miejsce zerowe: 3 dla funkcji g: $(0, 4)$; brak miejsc zerowych dla funkcji h: $(0, -3)$; brak miejsc zerowych

1.49. a) $g(x) = -2x + 6$, $\vec{u} = [0, 5]$ b) $g(x) = \sqrt{x} - 3$, $\vec{u} = [0, -3]$

c) $g(x) = 3x^2 - 7$, $\vec{u} = [0, -7]$ d) $g(x) = |x| + 4$, $\vec{u} = [0, 4]$

e) $g(x) = \frac{4}{x} - 2$, $\vec{u} = [0, -2]$ f) $g(x) = \frac{1}{5}x^3 + 3$, $\vec{u} = [0, 3]$

1.51. a) $-0,5$ b) $ZW_g = \boldsymbol{R} - \{2\}$ c) funkcja jest malejąca w przedziałach: $(-\infty, 0)$, $(0, \infty)$

1.52. a) $-1, 1$ b) $ZW_g = \langle -1, +\infty)$ c) $(-\infty, 0\rangle$

1.53. a) 4 b) 6 c) $\langle 3, 5)$

1.54. a) $g(x) = |x| - 4$ c) najmniejsza wartość funkcji f: 0; najmniejsza wartość funkcji g: -4

1.55. a) $D_g = \langle -1, 2\rangle$, $ZW_g = \langle -2, 7\rangle$ b) $(0, -1)$

1.56. a) $\langle -16, -6)$ d) $\langle 2341, 2351)$

1.57. c) $(-3, -9)$, $(2, -9)$

1.58. c) $g(x) = x^2 + 2x + 3$

1.59. a) $\vec{v} = [0, 6]$ b) nie

1.60. $\vec{v} = [-4, 0]$

1.61. a)

x	-3	-2	1	6	13	41	101
$g(x)$	-5	-3	0	6	7	30	405

1.62. a) $\vec{u} = [2, 4]$ b) $\vec{u} = [-1, 5]$ c) $\vec{u} = [-5, -3]$ d) $\vec{u} = [7, -2]$ e) $\vec{u} = [\sqrt{3}, 10]$ f) $\vec{u} = [-4, -\sqrt{2}]$

1.63. a) $g(x) = \sqrt{x-1} + 2$ b) $g(x) = (x+2)^2 + 3$ c) $g(x) = |x-4| - 5$ d) $g(x) = \frac{1}{x-1} - 3$

1.64. a) $\vec{u} = [1, 8]$ b) $\vec{u} = [-20, -4]$ c) $\vec{u} = [-3, -1]$ d) $\vec{u} = [1, 4]$ e) $\vec{u} = [-2, 6]$ f) $\vec{u} = [5, -7]$

1.65.

a)



b)



c)



d)



e)



f)



1.66. a) funkcja g jest rosnąca w przedziałach: $\langle -9, -5\rangle$, $\langle -2, 3\rangle$ i malejąca w przedziale $\langle -5, -2\rangle$ b) dla $x = -5$ funkcja g przyjmuje wartość największą, równą 7; dla $x = -2$ funkcja g przyjmuje wartość najmniejszą, równą 1 c) 24

1.67. a) $D_g = (-\infty, -2\rangle, ZW_g = (-2, 3\rangle$ b) $D_g = \langle 5, 15\rangle, ZW_g = \langle -9, -1\rangle$ c) $D_g = \boldsymbol{R} - \{-1\}$, $ZW_g = (-7, +\infty)$ d) $D_g = (-5, 4), ZW_g = (-\infty, 10\rangle$

1.68. a) $g(x) = x^2 + 7x + 10$ b) $g(x) = \dfrac{x-3}{x-1} + 1$ c) $g(x) = -3x^2 - 6x + 4$

d) $g(x) = 2x^2 + 8x + 13$

Symetria osiowa. Symetria osiowa względem osi *OX* i *OY*

1.70. 1) a) dwie b) trzy c) jedną d) cztery e) pięć f) nieskończenie wiele

1.72. a) $D_g = (-6, 5\rangle, ZW_g = \langle -2, 4\rangle$ b) $D_g = (-7, 4), ZW_g = (-3, 3\rangle$

c) $D_g = \langle -3, 6\rangle, ZW_g = \langle -4, 0\rangle$ d) $D_g = \langle -5, 5\rangle, ZW_g = \langle -4, -1) \cup \langle 2, 5\rangle$

1.73. a) $g(x) = -3x + 2$ b) $g(x) = 5x - 8$ c) $g(x) = -x^3 - 8$ d) $g(x) = x^2 - 1$

e) $g(x) = -|x| + 15$ f) $g(x) = -\sqrt{x} - 7$

1.74. a) $g(x) = 4$ b) $g(x) = -x + 3$ c) $g(x) = -x^2$ d) $g(x) = -x^3$ e) $g(x) = -\sqrt{x+2}$

f) $g(x) = -x^2 + 1$

1.75. a) $D_g = \langle -4, 3), ZW_g = \langle -5, 1)$ b) $D_g = \boldsymbol{R} - \{3\}, ZW_f = (-\infty, 4\rangle$

1.76. a)

x	−7	−2	−1	3	4	6	10
$g(x)$	13	5	2	0	−1	−4	−5

1.77. a) $D_g = \langle -4, 3), ZW_g = \langle -2, 4)$ b) $D_g = \langle -3, -1\rangle \cup (0, 5\rangle, ZW_g = \langle -2, 5\rangle$

c) $D_g = \langle -4, 3\rangle, ZW_g = \langle 0, 4\rangle$ d) $D_g = (-3, 6\rangle, ZW_g = \langle -3, 4)$

1.78. a) $h(x) = -x + 2$, gdzie $x \in \langle -2, 4 \rangle$



d) $h(x) = -x^3 - 2$, gdzie $x \in \langle -2, 1 \rangle$



f) $h(x) = (1-x)^2$, gdzie $x \in (-1, 3\rangle$



1.79. a) $g(x) = -5x - 4$, $D_g = \mathbf{R}$ b) $g(x) = \sqrt{-x} + 2$, $D_g = (-\infty, 0\rangle$ c) $g(x) = |3 - x|$, $D_g = \mathbf{R}$

d) $g(x) = \dfrac{1}{6-x}$, $D_g = \mathbf{R} - \{6\}$ e) $g(x) = \sqrt{-x-4}$, $D_g = (-\infty, -4\rangle$

f) $g(x) = \dfrac{-2x}{1+x}$, $D_g = \mathbf{R} - \{-1\}$

1.80. a) $D_g = (-3, 4\rangle$, $ZW_g = (-1, 5\rangle$ b) $D_g = \mathbf{R} - \{-3\}$, $ZW_g = \langle -4, +\infty)$

1.81.

a)



b)



c)



d)



e)



f)



1.82. a) $g(x) < 0 \Leftrightarrow x \in \langle -5, 4)$, $h(x) < 0 \Leftrightarrow x \in \langle -6, -4)$ b) g rosnąca w przedziałach: $\langle -5, 0\rangle$, $\langle 2, 6\rangle$; h rosnąca w przedziałach: $\langle -6, -2\rangle$, $\langle 0, 5\rangle$

1.83. a) $-6, -1, 5; (0, 4)$ b) $-5, 1, 6; (0, -4)$ c) $-8, -2, 3; (0, 2)$

1.85. a) $y = \frac{x-3}{2x}$ b) $y = -\frac{x+3}{2x}$

Symetria środkowa. Symetria środkowa względem punktu (0, 0)

1.88. a)

x	−45	−30	−11	−8	0	3	4
$g(x)$	−80	−31	−5	−2	6	8	20

1.89. a) $D_g = \langle -5, 2\rangle$, $ZW_g = \{-2\}$ b) $D_g = (-5, 4\rangle$, $ZW_g = (-5, -1\rangle$
c) $D_g = (-3, 4\rangle$, $ZW_g = \langle -2, 3\rangle$ d) $D_g = \langle -5, 5)$, $ZW_g = (-3, -1) \cup \langle 1, 3\rangle$

1.90. a) $g(x) = x - 4$; $D_g = (0, 3\rangle$ b) $g(x) = -\sqrt{-x}$; $D_g = (-4, 0\rangle$





d) $g(x) = \frac{1}{x}$; $D_g = \langle -4, -1\rangle$



1.91. a) $ZW_g = \langle -4, 2\rangle$ b) -4 c) 12 d) $\langle -5, -3\rangle$, $\langle 1, 3\rangle$

1.92. a) $D_g = (-7, 3\rangle$, $ZW_g = \langle -4, 0)$ b) $D_g = (-5, 1)$, $ZW_g = \langle -2, 6\rangle$
c) $D_g = \langle -9, +\infty)$, $ZW_g = \boldsymbol{R} - \{8\}$ d) $D_g = \left(-\sqrt{2}, 4\right)$, $ZW_g = (-\infty, 1\rangle$

1.93. a) $g(x) = -4x - 7$; $\frac{-7}{4}$; $(0, -7)$ e) $g(x) = 1 - \sqrt{-x}$; -1, $(0, 1)$

f) $g(x) = 3(x + 2)(1 - x)$; -2, 1; $(0, 6)$

Zastosowanie wykresów funkcji do rozwiązywania równań i nierówności

1.94. $x \in \{-1, -3\}$

1.95. $x = -4$

1.96. $x \in \{1, 3\}$

1.97. a) $x \in \langle 0, +\infty)$ b) $x = 4$ c) $x = -4$

1.98. a) $x \in \{-2, 1\}$ b) $x \in \{2, 5\}$ c) $x \in \{-1, 1\}$

1.99. a) $x = 1$ b) $x \in \{-1, 1\}$ c) $x = 7$

1.100. $(-\infty, -3) \cup (-2, +\infty)$

1.101. $\langle 1, 5)$

1.102. $(-\infty, 0\rangle \cup \langle 4, +\infty)$

1.103. a) $x = -1$ b) $x \in (-1, 0\rangle$

1.104. a) $x \in (-1, 0) \cup (1, +\infty)$ b) $x \in \langle 2, 6\rangle$ c) $x \in (-\infty, -1\rangle$

1.105. a) $x \in (-\infty, -6) \cup (2, +\infty)$ b) $x \in \langle -2, -1)$ c) $x \in (-\infty, 3) \cup (4, 5) \cup (5, +\infty)$

Test sprawdzający do rozdziału 1.

Nr zadania	1	2	3	4	5	6	7	8
Odpowiedź	**D**	**D**	**B**	**B**	**D**	**A**	**C**	**A**
Nr zadania	9	10	11	12	13	14	15	
Odpowiedź	**B**	**D**	**B**	**C**	**B**	**C**	**C**	

Zadania powtórzeniowe do rozdziału 1.

16. a) $A(6, -8)$ b) $C(12, -23)$

17. $D(-4, 2)$, $|AC| = 6\sqrt{2}$

18. $D(-7, 11)$

19. *wskazówka:* Wykaż, że $\overrightarrow{DC} = 2\overrightarrow{AB}$

20. a) $g(x) = -x^2 - 6x + 1$ b) a = 9

21. a) $g(x) = 3x - 1$ b) $\vec{u} = [0, 6]$

23. a) $g(x) = 2x - 3$ b) $h(x) = 2x + 3$ c) $k(x) = -2x - 3$

24. a)



b) $x \in \langle -4, -1\rangle$

25. a)



b) $\langle -3, -2\rangle, \langle 2, 3\rangle$

26. a)



b) $x \in (-3, 1) \cup (1, 5)$

27. a) $D = \langle -8, 4\rangle$, $ZW = \langle -1, +\infty)$ b) $D = \langle -4, 8\rangle$, $ZW = (-\infty, 1\rangle$
c) $D = \langle -7, 5\rangle$, $ZW = \langle -5, +\infty)$

28. a) $g(x) = \frac{x}{2} - 1$ b) $x \in \langle -2, 0)$

29. a) $x = -4$ b) $x \in \{1, 3\}$ c) $x \in \{-2, 2\}$

30. a) $x \in (-\infty, -1\rangle \cup \{0\}$ b) $x \in (-2, 1)$ c) $x \in \langle -5, -2\rangle \cup (-1, +\infty)$

31. b) przesunięcie równoległe o wektor $\vec{u} = [-7, 0]$, $f_1(x) = \sqrt{x+7}$, a następnie symetria względem osi OY, $h(x) = \sqrt{-x+7}$

32. b) $D_g = \langle -7, 5\rangle$ c) $ZW_g = \langle -2, 4\rangle$ d) 20

2. Równania i nierówności z wartością bezwzględną

Wartość bezwzględna liczby rzeczywistej

2.1. a) 4 b) 1 c) $-0{,}7$ d) $3-\sqrt{2}$ e) $\sqrt{5}-2$ f) 0

2.2. a) 3 b) $4\pi - 7$ c) $1{,}7 - 2\sqrt{2}$ d) $\sqrt{2}$ e) 0 f) $2\sqrt{3} - 2$

2.3. a) -3 b) $2 - \sqrt{2}$ c) $-1{,}2$ d) $-\pi^2$

2.4. a) -11 b) -11 c) 17 d) $345 - 140\sqrt{5}$

2.5. a) 8 b) 1 c) -6 d) $2\frac{1}{4}$

2.6. a) -56 b) -3

2.7. a) 5 b) -1

2.8. a) 110 b) 50

2.9. a) $a-2$ b) $-3-a$ c) $3a-2$ d) $8a-4$

2.10. a) $2a^2-2a$ b) $-5a-1$ c) $a+3$ d) $1-a$

2.11. a) $f(x)=\begin{cases}2x, \text{ jeśli } x<0\\ 0, \text{ jeśli } x\geq 0\end{cases}$ b) $f(x)=\begin{cases}-2x-6, \text{ jeśli } x<-3\\ 2x+6, \text{ jeśli } x\geq -3\end{cases}$

c) $f(x)=\begin{cases}3x, \text{ jeśli } x<1\\ -3x+6, \text{ jeśli } x\geq 1\end{cases}$ d) $f(x)=\begin{cases}1+\frac{1}{3}x, \text{ jeśli } x<3\\ 3-\frac{1}{3}x, \text{ jeśli } x\geq 3\end{cases}$

2.12. a) $f(x)=\begin{cases}-x^2, \text{ jeśli } x<0\\ x^2, \text{ jeśli } x\geq 0\end{cases}$ b) $f(x)=\begin{cases}-1, \text{ jeśli } x<0\\ 3, \text{ jeśli } x>0\end{cases}$

c) $f(x)=\begin{cases}0{,}5x+1, \text{ jeśli } x<2\\ 1{,}5x-1, \text{ jeśli } x\geq 2\end{cases}$ d) $f(x)=\begin{cases}2x+4, \text{ jeśli } x<-4\\ -4, \text{ jeśli } x\geq -4\end{cases}$

2.13. a) 1 b) 6 c) –7 d) 4

2.17. a) –90 b) –23 c) 11 d) 20

Odległość między liczbami na osi liczbowej.
Geometryczna interpretacja wartości bezwzględnej na osi liczbowej

2.18. a) $c=1, d=3$ b) $c=1\frac{1}{2}, d=3\frac{1}{2}$ c) $c=-3{,}45; d=4{,}95$

d) $c=45\frac{7}{12}, d=42\frac{1}{4}$ e) $c=-16\sqrt{7}, d=13\sqrt{7}$ f) $c=-2+\sqrt{5}, d=7-3\sqrt{5}$

2.19. a) –1 i 5 b) –7 i 3 c) –33 i 19

d) $\sqrt{2}-3$ i $\sqrt{2}+3$ e) $-4-\pi$ i $\pi-2$ f) $-3+2\sqrt{3}$ i 5

2.20. a) $\langle -4, 6\rangle$ b) $(-1, 7)$ c) $(-\infty, -5\rangle \cup \langle 1, +\infty)$

d) $(-\infty, -7) \cup (-3, +\infty)$ e) $(-\infty, 5\rangle \cup \langle 7, +\infty)$ f) $\langle -9, 1\rangle$

2.21 a) 24 b) $31\frac{1}{3}$ c) $2\sqrt{3}-\pi$ d) $6\sqrt{2}+3$ e) 8 f) $3+4\sqrt{3}$

2.22. a) $|x|=8$ b) $|y-5|=1$ c) $|-3-a|=4$ d) $|z-8|<3$

e) $|p+2|>7$ f) $|k+1|\leq 5$ g) $|7-m|\geq 2$

2.23. a) $16-8m$ b) $6m-15$ c) $m+15$ d) m^2+33

Proste równania z wartością bezwzględną

2.24. a) –3, 3 b) 4, –10 c) żadna d) –5

2.25. a) $x\in\left\{-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}\right\}$ b) równanie sprzeczne c) $x\in\left\{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\right\}$

d) równanie sprzeczne e) $x=0$ f) $x\in\{-3, 3\}$

2.26. a) $x\in\{-1, 5\}$ b) $x\in\{-5, 3\}$ c) $x=3$

d) $x\in\{-3, -1\}$ e) $x\in\{3, 7\}$ f) $x\in\{-1, 9\}$

2.27. a) $x = -9$ b) $x \in \{-5, 11\}$ c) $x \in \{-11, -21\}$
d) $x \in \{18, 24\}$ e) $x \in \{-8, 6\}$ f) równanie sprzeczne

2.28. a) $|x - 11| = 0$ b) $|x + 19| = 0$ c) np. $|x - 1| = -1$
d) $|x - 0| = 8$ e) $|x - 2| = 5$ f) $|x + 2\pi| = 5\pi$

2.29. a) $|x| = \sqrt{6}$ b) $|x-2| = \sqrt{3}$ c) $\left|x+3\sqrt{5}\right| = 0$ d) $|x-11| = 6$
e) $|x+2{,}5| = 6$ f) $\left|x-1\frac{2}{3}\right| = 4$

2.30. a) $x \in \{-1, 3\}$ b) $x = 4$ c) $x \in \{-5, 3\}$ d) $x \in \{-5, 1\}$
e) równanie sprzeczne f) $x \in \{-6, -4\}$

2.31. a) $x \in \{-5{,}6; 8\}$ b) $x \in \{2{,}8; 4\}$ c) $x = -2{,}5$ d) równanie sprzeczne
e) $x \in \{-1, 3\}$ f) $x \in \{-13, 7\}$

2.32. a) $x \in \{0, 4\}$ b) $x \in \{-4{,}2; -0{,}6\}$ c) $x \in \{-3{,}24; -2{,}76\}$
d) równanie sprzeczne e) $x \in \{-18{,}3; 24{,}3\}$ f) $x \in \{-10, 8\}$

2.33. a) równanie sprzeczne b) $x \in \left\{-7+5\sqrt{5},\ 7-\sqrt{5}\right\}$ c) $x \in \left\{5\sqrt{3}-7,\ 7-\sqrt{3}\right\}$
d) $x \in \left\{-10\sqrt{2}-1,\ 1\right\}$ e) $x \in \left\{2\sqrt{2}-3,\ 3\right\}$ f) $x \in \left\{-6\sqrt{3}-2,\ 2\sqrt{3}+2\right\}$

2.34. a) $x \in \left\{-3,\ -1\frac{2}{3}\right\}$ b) $x \in \left\{-4\frac{19}{25}, 5\right\}$ c) $x \in \left\{-3, 7\frac{1}{2}\right\}$
d) $x \in \{-6, 7\}$ e) $x \in \left\{-\frac{3}{4}, 2\right\}$ f) $x \in \left\{-3\frac{3}{5}, 2\frac{4}{5}\right\}$

2.35. a) $x \in \{-2, -6\}$ b) $x \in \{2, 4\}$ c) $x \in \{-5, 3\}$ d) równanie sprzeczne
e) $x = 3$ f) $x \in \{-6, 2\}$

2.36. a) $A = \{1, 3\}$, $B = \{-5\}$, $C = \{-5, 3\}$
b) $(B \cup C) \cap A = \{3\}$, $(A - C) \cup B = \{-5, 1\}$, $C - A - B = \varnothing$

Proste nierówności z wartością bezwzględną

2.37. a) 3, 6, 7 b) −9, 6 c) $-2, 3\frac{1}{2}, 5$ d) −2

2.38. a) $x = 0$ b) $\boldsymbol{R} - \{-1\}$ c) $\boldsymbol{R}$ d) $\varnothing$

2.40. a) $x \in (-4, 4)$ b) $x \in (-\infty, -6\rangle \cup \langle 6, +\infty)$ c) $x \in (-\infty, -9) \cup (9, +\infty)$
d) $x \in \langle -2, 2\rangle$ e) $x \in \langle -8, 8\rangle$ f) $x \in \left(-\infty, -\sqrt{3}\right) \cup \left(\sqrt{3}, +\infty\right)$

2.41. a) $x \in (1, 7)$ b) $x \in \langle -3, 1\rangle$ c) $x \in \boldsymbol{R} - \{2\}$ d) $x \in \langle -3, 5\rangle$
e) $x \in \langle 2, 4\rangle$ f) $x \in (-\infty, -7) \cup (-3, +\infty)$

2.42. a) $x \in (-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$ b) $x \in (-\infty, 0\rangle \cup \langle 2, +\infty)$ c) $x \in (-2, 2)$
d) $x \in (0, 8)$ e) $x \in \langle 6, 12\rangle$ f) $x \in (-\infty, -7) \cup (-5, +\infty)$

2.43. a) np. $|x| < 9$ b) np. $|x| > \sqrt{3}$ c) np. $|x - 4| < 8$ d) np. $|x + 1| \geq 3$
e) np. $|x - 6| > 1$ f) np. $|x - 5| \leq 5$ g) np. $|x + 2| \leq 7$
h) np. $|x - 2| < \sqrt{3}$ i) np. $|x - \pi| < 3\pi$

2.44. a) $x \in (-\infty, 4) \cup (6, +\infty)$ b) $x \in \langle -5, -1 \rangle$ c) $x \in (-\infty, -7\rangle \cup \langle -1, +\infty)$

2.45. a) $x \in \langle -9{,}8;\ 7\rangle$ b) $x \in (-\infty;\ 1{,}2) \cup (4, +\infty)$ c) $x \in (-\infty;\ -1{,}5\rangle \cup \langle 1, +\infty)$

d) $x \in (-0{,}5;\ 3{,}1)$ e) $x = -\frac{10}{3}$ f) $x \in (-1{,}2;\ 1{,}8)$

2.46. a) $x \in \left(\sqrt{2}-1,\ \sqrt{2}+1\right)$ b) $x \in \left(-\infty,\ -3\sqrt{3}\right\rangle \cup \left\langle \sqrt{3},\ +\infty\right)$ c) $-\sqrt{5}$

d) nierówność sprzeczna e) $x \in \left(-\infty,\ \sqrt{2}-2\right) \cup \left(\sqrt{2},\ +\infty\right)$ f) $x \in \left(-\sqrt{3}-9,\ -\sqrt{3}-1\right)$

2.47. a) $x \in \left\langle -37\frac{2}{3}, 29\right\rangle$ b) $x \in \left(-4, 4\frac{1}{3}\right\rangle$ c) $x \in \left(-\infty, -1\frac{4}{5}\right) \cup \left(3\frac{2}{5}, +\infty\right)$

d) $x \in (-\infty, 2\rangle \cup \left\langle 3\frac{2}{3}, +\infty\right)$ e) $x \in (-\infty, 3\rangle \cup \langle 4, +\infty)$ f) $x \in \left(-\frac{1}{5}, 1\right\rangle$

2.48. a) $x \in \boldsymbol{R} - \left\{\frac{1}{10}\right\}$ b) nierówność sprzeczna c) $x \in (13, 17)$

d) $x \in \boldsymbol{R}$ e) $x = \frac{8}{9}$ f) $x \in \left(-\infty, 1-\sqrt{5}\right\rangle \cup \left\langle 3+\sqrt{5}, +\infty\right)$

2.49. a) $-4, -2$ c) $A \cap B = (-6, -5\rangle \cup \langle -3, 0)$, $B - A = (-\infty, -6\rangle \cup \langle 0, +\infty)$

2.50. a) $A = (-2, 2)$, $B = \langle -3, 1\rangle$ b) $0, 1$ d) $A' \cap B' = (-\infty, -3) \cup \langle 2, +\infty)$

2.51. a) $0, 1, 2$ b) $3, 4, 5$ c) $-2, -1, 0, 1, 2$ d) 0

2.52. a) $x \in (3, 5)$ b) $x \in \left\langle -3, -1\frac{2}{3}\right\rangle \cup \left\langle -\frac{1}{3}, 1\right\rangle$

Test sprawdzający do rozdziału 2.

Nr zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Odpowiedź	**D**	**C**	**A**	**D**	**B**	**D**	**B**	**A**	**D**	**B**

Zadania powtórzeniowe do rozdziału 2.

11. a) $a = 3\frac{1}{3}$; wartość wyrażenia: 2 b) $b = 55$; wartość wyrażenia: -335

12. 1

14. a) $1 - x$ b) $-3a - 3b$

15. a) $x \in \{-1, 9\}$ b) równanie sprzeczne c) $x = -3$

16. a) $x \in \{-10, -4\}$ b) $x \in \{-13, 5\}$

17. a) $x \in (-\infty, -5\rangle \cup \langle 11, +\infty)$ b) $x \in (-18, -8)$

18. a) $x \in \{-8, -2\}$ b) $x \in \langle -7, 3\rangle$

19. a) $x \in (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$ b) $x = -5$ c) $x \in \boldsymbol{R} - \{-1\}$ d) $x \in \boldsymbol{R}$

20. a) $x \in (-\infty, 2\rangle \cup \langle 4, 6\rangle$ b) $x \in \langle -10, -5) \cup (-3, 2\rangle$

21. $A \cup B = \boldsymbol{R}$, $A \cap B = (-7, -1\rangle$, $A - B = (-1, 3)$, $B - A = (-\infty, -7\rangle \cup \langle 3, +\infty)$

24. a) $x = 7$ b) $x \in \langle -3, 1\rangle$

3. Funkcja kwadratowa

Przypomnienie wiadomości o funkcji kwadratowej z klasy 1.

3.1. a) $f(x)=2x^2-3x-3$; $a=2$, $b=-3$, $c=-3$ b) $f(x)=-2x^2-16x-27$; $a=-2$, $b=-16$, $c=-27$ c) $f(x)=-6x^2+3x$; $a=-6$, $b=3$, $c=0$ d) $f(x)=4x^2$; $a=4$, $b=0$, $c=0$

3.2. a) $y=\frac{2}{3}x^2$ b) $y=-x^2$ c) $y=2\sqrt{5}x^2$

3.3. a) $b=2$, $c=-15$ b) $b=-5$, $c=0$

3.4. a) $f(x)=\frac{1}{2}x^2-\frac{3}{2}x+4$ b) $f(x)=-3x^2+9$

3.5. a) $y=\frac{1}{3}(x+5)^2$ b) $y=-2(x-3)^2$ c) $y=\frac{2}{5}x^2+4$ d) $y=-x^2-2$

3.6. a) $y=-\frac{1}{4}(x-2)^2-3$ b) $y=-\frac{1}{4}(x+1)^2-5$ c) $y=-\frac{1}{4}(x+3)^2+4$

d) $y=-\frac{1}{4}(x-5)^2+2$

3.7. a) $W(-3, 0)$, $(0, -9)$ b) $W(1, 1)$, $(0, 3)$ c) $W(0, -4)$, $(0, -4)$

d) $W(-3, -2)$, $\left(0, 2\frac{1}{2}\right)$ e) $W(1, 0)$, $\left(0, \frac{1}{4}\right)$ f) $W(2, -1)$, $(0, -2)$

3.8. a) $ZW=(-\infty, 3\rangle$; funkcja jest rosnąca w przedziale $(-\infty, 0\rangle$, malejąca w przedziale $\langle 0, +\infty)$; $x=0$ b) $ZW=\langle -5, +\infty)$; funkcja jest malejąca w przedziale $(-\infty, 0\rangle$, rosnąca w przedziale $\langle 0, +\infty)$; $x=0$ c) $ZW=\langle 0, +\infty)$; funkcja jest malejąca w przedziale $(-\infty, -4\rangle$, rosnąca w przedziale $\langle -4, +\infty)$; $x=-4$ d) $ZW=(-\infty, 7\rangle$; funkcja jest rosnąca w przedziale $(-\infty, 1\rangle$, malejąca w przedziale $\langle 1, +\infty)$; $x=1$ e) $ZW=\langle -3, +\infty)$; funkcja jest malejąca w przedziale $(-\infty, -5\rangle$, rosnąca w przedziale $\langle -5, +\infty)$; $x=-5$ f) $ZW=(-\infty, -4\rangle$; funkcja jest rosnąca w przedziale $(-\infty, 2\rangle$, malejąca w przedziale $\langle 2, +\infty)$; $x=2$

3.9. a) $f(x)=-\frac{1}{3}(x-2)^2$, $f(x)=-\frac{1}{3}x^2+1\frac{1}{3}x-\frac{4}{3}$

b) $f(x)=\frac{1}{4}(x-3)^2+1$, $f(x)=\frac{1}{4}x^2-1\frac{1}{2}x+3\frac{1}{4}$

c) $f(x)=-2(x+1)^2+3$, $f(x)=-2x^2-4x+1$

d) $f(x)=\frac{1}{2}\left(x-2\frac{1}{2}\right)^2-3\frac{1}{8}$, $f(x)=\frac{1}{2}x^2-2\frac{1}{2}x$

e) $f(x)=-\frac{1}{3}(x+1)^2-1$, $f(x)=-\frac{1}{3}x^2-\frac{2}{3}x-1\frac{1}{3}$

f) $f(x)=\frac{1}{5}(x+4)^2$, $f(x)=\frac{1}{5}x^2+1\frac{3}{5}x+3\frac{1}{5}$

3.10. -6 oraz 0

3.11. $f(x)=-\frac{1}{5}(x-3)^2+4$

3.12. $f(x)=2(x+1)^2-2$

3.13. $f(x)=5(x+3)^2+5$

3.14. $f(x)=-\frac{3}{4}(x-2)^2+4$

Związek między wzorem funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, a wzorem funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej

3.16. a) $f(x)=4x^2-24x+16$ b) $f(x)=\frac{1}{2}x^2+4x+2$ c) $f(x)=-5x^2+10x-4$

3.17. a) $f(x)=(x-1)^2-1$ b) $f(x)=-2\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+5\frac{1}{2}$ c) $f(x)=-(x-1)^2+9$

d) $f(x)=3(x-4)^2+2$ e) $f(x)=\frac{1}{2}(x+3)^2-4$ f) $f(x)=-\frac{1}{4}(x-4)^2+6$

3.18. a) $\Delta=0$ b) $\Delta=49$ c) $\Delta=64$ d) $\Delta=-3$ e) $\Delta=0$ f) $\Delta=-15$

3.19. a) $f(x)=2\left(x+\frac{3}{4}\right)^2-1\frac{1}{8}$ b) $f(x)=x^2-4$ c) $f(x)=-(x-5)^2$

d) $f(x)=(x-3)^2-4$ e) $f(x)=4\left(x-\frac{1}{8}\right)^2+\frac{15}{16}$ f) $f(x)=\frac{1}{2}(x+2)^2-5$

3.20. a) $b=0$ b) $b=10$ c) $b=2$ d) $b=-5$

3.21. a) $a=-1, b=8, c=-13$ b) $a=2, b=-2, c=1{,}5$ c) $a=6, b=0, c=-5$
d) $a=-3, b=-6, c=0$ e) $a=-4, b=16, c=-19$ f) $a=5, b=-3, c=0{,}5$

3.22. a) $a=-3, (0,-19)$ b) $a=2\sqrt{3}, \left(0,-\sqrt{3}\right)$ c) $a=\frac{1}{2}, \left(0,9\frac{1}{2}\right)$

d) $a=-1, (0,-18)$ e) $a=\frac{1}{5}, (0,4)$ f) $a=4, (0,-4)$

3.23. a) $f(x)=(x-3)^2-4; (0,5), A(6,5)$ b) $f(x)=-\frac{1}{2}(x+4)^2+1; (0,-7), A(-8,-7)$

c) $f(x)=2(x-2)^2+1; (0,9), A(4,9)$ d) $f(x)=-\frac{1}{3}(x-4)^2-\frac{2}{3}; (0,-6), A(8,-6)$

e) $f(x)=-2\left(x+1\frac{1}{2}\right)^2+4\frac{1}{2}; (0,0), A(-3,0)$ f) $f(x)=\frac{1}{4}(x+4)^2-3; (0,1), A(-8,1)$

3.24. a) $ZW=\langle 0,+\infty)$ b) $ZW=(-\infty,7\rangle$ c) $ZW=(-\infty,6\rangle$ d) $ZW=\left\langle -\frac{1}{4},+\infty\right)$

3.25. a) f jest malejąca w przedziale $(-\infty,3\rangle$, rosnąca w przedziale $\langle 3,+\infty)$
b) f jest rosnąca w przedziale $(-\infty,10\rangle$, malejąca w przedziale $\langle 10,+\infty)$

c) f jest malejąca w przedziale $(-\infty, 6\rangle$, rosnąca w przedziale $\langle 6, +\infty)$

d) f jest rosnąca w przedziale $\left(-\infty, -7\frac{1}{2}\right\rangle$, malejąca w przedziale $\left\langle -7\frac{1}{2}, +\infty\right)$

3.26. a) są dwie takie funkcje: $f(x) = (x+3)^2 - 4$ oraz $g(x) = (x-3)^2 - 4$ c) $x = 0$

Miejsce zerowe funkcji kwadratowej.
Wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej

3.27. a) 0 b) 2 c) 2 d) 0 e) 1 f) 0

3.28. a) $-2\sqrt{2}$, $2\sqrt{2}$ b) 3 c) $-3, 3$ d) $-8, 4$ e) f nie ma miejsc zerowych f) $-3, 1$

3.29. a) $-9, -1$ b) $-\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}$ c) 4, 10 d) $-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ e) -4 f) funkcja f nie ma miejsc zerowych

3.30. a) $-2, 7$ b) $0, 4$ c) -5 d) $-\sqrt{2}, 8$ e) $1, 3$ f) $4+\sqrt{2}$

3.31. a) $0, 2$ b) $-\sqrt{5}, \sqrt{5}$ c) $-24, 0$ d) -5 e) funkcja nie ma miejsc zerowych f) 1

3.32. a) $-\frac{1}{3}$ b) $0, 4$ c) $\frac{4}{5}$ d) funkcja nie ma miejsc zerowych e) -8 f) 2

3.33. a) 2 b) 0 c) 1 d) 1 e) 0 f) 2

3.34. a) $-5, 1$ b) $-1, \frac{1}{3}$ c) -4 d) funkcja nie ma miejsc zerowych e) $-8, 2$ f) $-3, 1$

3.35. a) $\Delta = 9$; m. zerowe: 1, 4 b) $\Delta = 4$; m. zerowe: $0, \frac{2}{3}$ c) $\Delta = -16$; funkcja nie ma miejsc zerowych d) $\Delta = 1$; m. zerowe: $-1\frac{1}{3}, -1$ e) $\Delta = 20$; m. zerowe: $6-2\sqrt{5}$, $6+2\sqrt{5}$ f) $\Delta = 76$; m. zerowe: $\frac{5-\sqrt{19}}{2}, \frac{5+\sqrt{19}}{2}$

3.36. a) $f(x) = -\frac{1}{4}x^2 - 2x + 5$ b) $f(x) = 8x^2 - 96x$ c) $f(x) = \frac{3}{5}x^2 + 6x + 15$
d) $f(x) = -5x^2 + 25x + 120$ e) $f(x) = -2x^2 + 6$ f) $f(x) = -x^2 + 8x - 16$

3.37. a) $y = \sqrt{2}(x+4)\left(x - \frac{1}{2}\right)$ b) $y = -3x(x+2)$ c) $y = \frac{1}{3}(x-7)^2$
d) $y = -\frac{1}{3}(x-4)(x-8)$ e) $y = 7(x+2)^2$ f) $y = \frac{2}{3}\left(x-1+\sqrt{2}\right)\left(x-1-\sqrt{2}\right)$

3.38. a) $f(x) = \frac{1}{2}(x+10)(x+2)$ b) $f(x) = \frac{2}{5}x(x-4)$ c) nie istnieje
d) $f(x) = -4(x-1)(x-9)$ e) $f(x) = \frac{1}{8}(x-4)^2$ f) $f(x) = \frac{5}{7}(x-7)(x+3)$

3.39. a) $W(1, 125)$ b) $W(0, -32)$ c) $W(-5, -100)$ d) $W(6, 3)$

3.40. a) $f(x) = (x+2)^2 - 9$ b) $f(x) = 2\sqrt{3}(x+2)^2 - 8\sqrt{3}$ c) $f(x) = 2\left(x - \sqrt{6}\right)^2$

d) $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 18$ e) $f(x) = \frac{3}{5}(x+2)^2 - 5\frac{2}{5}$ f) $f(x) = -\frac{2}{3}\left(x - 3\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{6}$

3.41. a) $f(x) = (x-3)(x+1)$ b) $f(x) = -1 \cdot (x+6)x$ c) $f(x) = 4(x-7)(x-3)$

d) $f(x) = -9(x+4)x$ e) nie istnieje f) nie istnieje

3.42.

Wzór funkcji kwadratowej f w postaci:		
iloczynowej	ogólnej	kanonicznej
a) $f(x) = -\frac{1}{4}(x+4)(x-1)$	$f(x) = -\frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{4}x + 1$	$f(x) = -\frac{1}{4}\left(x + 1\frac{1}{2}\right)^2 + 1\frac{9}{16}$
b) $f(x) = \frac{2}{5}(x-5)(x-2)$	$f(x) = \frac{2}{5}x^2 - \frac{14}{5}x + 4$	$f(x) = \frac{2}{5}\left(x - 3\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{10}$
c) $f(x) = -\frac{1}{5}x(x-3)$	$f(x) = -\frac{1}{5}x^2 + \frac{3}{5}x$	$f(x) = -\frac{1}{5}\left(x - 1\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{9}{20}$
d) $f(x) = \frac{1}{3}(x+3)(x-2)$	$f(x) = \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{3}x - 2$	$f(x) = \frac{1}{3}\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - 2\frac{1}{12}$

3.44. *wskazówka:* Oblicz $f(1)$.

3.45. $\Delta = 4$

Szkicowanie wykresów funkcji kwadratowych. Odczytywanie własności funkcji kwadratowej na podstawie wykresu

3.46.

a)



b)



c)



d)



e)



f)



3.47. a)



b)



c)



d)



e)



f)



3.48.

a)



$x \in \{-3, -1\}$

b)



$x \in \{-1, 3\}$

c)



$x \in \{-2, 2\}$

d)



$x \in \{-2, 2\}$

3.49. a) $x \in \langle -5, -2 \rangle$



b) $x \in (-\infty, -6) \cup (-2, +\infty)$

c) $x \in (1, 8)$

3.50. a) $x \in (-\infty, -2\rangle \cup \langle -1, +\infty)$



b) $x \in \boldsymbol{R} - \{-2\}$

c) $x \in (-\infty, 0\rangle$

3.51. a) $a > 0, b < 0, c > 0$ b) $a < 0, b > 0, c < 0$ c) $a < 0, b < 0, c < 0$

d) $a > 0, b > 0, c > 0$

3.52. a) $(-\infty, 1\rangle, \langle 3, +\infty)$ b) 0, 2, 6 c) $f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (0, 2) \cup (6, +\infty)$

3.53. b) $ZW = (-\infty, 2\rangle$ c) -6 d) $x \in \langle -3, -1 \rangle$

3.54.

a)



b)



c)



d)



3.55. a)



b) $ZW = \langle -5, +\infty)$ c) funkcja f jest malejąca w przedziałach: $(-\infty, -4\rangle$, $\langle -2, 2\rangle$, rosnąca w przedziałach: $\langle -4, -2\rangle$, $\langle 2, +\infty)$ d) $f(-2\pi) \cdot f\left(\sqrt{2}+1\right) < 0$

Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej na podstawie jej własności

3.56. $b = 1$, $c = -1$

3.57. $b = -1$, $c = -18$

3.58. $b = 4$, $c = 5$

3.59. $(b = -4, c = -8)$ lub $(b = 4, c = -8)$

3.60. $b = 12, c = 8$

3.61. $f(x) = -0{,}25x^2 - 2{,}5x - 4$

3.62. $f(x) = -2x^2 + 2x + 12$

3.63. $f(x) = -3x^2 - 12x - 8$

3.64. $f(x)=\frac{1}{2}x^2-3x+2\frac{1}{2}$

3.65. $f(x)=-\frac{1}{5}x^2+2x-5$

3.66. $f(x)=\frac{1}{2}x^2-8x+30$

3.67. $f(x) = -2x^2 + 24x + 90$

3.68. $f(x)=\frac{1}{2}x^2+13x-60$

3.69. $f(x)=\frac{1}{2}x^2+2x+2$

3.70. $f(x) = -2(x-4)(x+10)$

3.71. $f(x)=\frac{1}{3}(x-6)(x+3)$

3.72. $f(x)=-\frac{2}{3}x^2+4x+18$

3.73. $a=\frac{1}{2}, b=-3$

3.74. $a = -4, b = 24$

3.75. $a = -2, b = 10, c = -12$

Najmniejsza oraz największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym

3.76.

	a)	b)	c)	d)
wartość najmniejsza	1	−6	−2	−9
wartość największa	5	−2	0	−5

3.77.

	a)	b)	c)	d)
wartość najmniejsza	2	2	0	−4
wartość największa	6	4	2	0

3.78.

	a)	b)	c)	d)	e)	f)
wartość najmniejsza	−1	$4\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{3}$	$-24\sqrt{3}$	$-6\frac{1}{4}$	$10\frac{4}{5}$
wartość największa	2	5	$1\frac{2}{3}$	$-9\sqrt{3}$	$-5\frac{3}{4}$	$11\frac{9}{20}$

3.79. a) największa wartość: 108, dla argumentu –2 c) w przedziale $\langle -4, 3\rangle$ najmniejsza wartość: 96, największa wartość: 105

3.80. a) funkcja przyjmuje wartość największą, dla argumentu 2 b) w przedziale $\langle 5, 7\rangle$ wartość największa: 3, wartość najmniejsza: 0

3.81. $f(x)=\frac{3}{4}x^2-4\frac{1}{2}x+8\frac{3}{4}$

3.82. $f(x)=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}x-2$

3.83. $f(x)=-\frac{1}{2}x^2-3x+1\frac{1}{2}$

3.84. $f(x) = 2x^2 + 4x - 6$

3.85. $f(x)=-\frac{1}{2}x^2+6x-18$

3.86. $f(x)=\frac{1}{4}x^2-\frac{5}{2}x+4$

3.87. $f(x)=-\frac{3}{4}x^2-3x+1$

3.88. $f(x) = -2x^2 - 4x + 2$

3.89. $f(x)=\frac{1}{3}x^2+\frac{4}{3}x+\frac{4}{3}$

Badanie funkcji kwadratowej – zadania optymalizacyjne

3.90. 4 m

3.91. o 10^{00}.

3.92. a) 44 m b) 11 m/s

3.93. 5 m

3.94. $100 = 50 + 50$

3.95. $30 = 15 - (-15)$

3.96. $18 = 9 + 9$

3.97. 16 uczniów.

3.98. a) $P(x) = -x^2 + 3x + 40$; $D_p = (0, 8)$ b) $x = 1{,}5$ cm; $P = 42{,}25$ cm^2

3.99. a) $P(x) = -8x^2 + 100x$; $D_p = (0, 10)$ b) $x = 6{,}25$ cm; $P = 312{,}5$ cm^2

3.100. 15 cm

3.101. wymiary placu: 21 m × 21 m; $P = 4{,}41\ a$

3.102. 3 m × 6 m; $P = 18$ m^2

3.103. 17,5 cm × 16,5 cm

3.104. 1 m × 0,75 m

3.105. 1,5 m × 2 m

3.106. a) $P(x) = 2x^2 - 8x + 16$; $D_p = (0, 4)$ b) K, L, M, N – środki boków kwadratu

3.107. 1700 zł

3.108. wysokość czynszu: 1320 zł; miesięczny zysk: 217 800 zł

3.109. a) 55 b) 52

3.110. $\frac{6}{7}$ m, $\frac{8}{7}$ m

Równania kwadratowe

3.111. a) $x = -2$ b) $x \in \left\{0, 1\frac{3}{4}\right\}$ c) równanie sprzeczne d) $x = 1\frac{1}{2}$

e) $x \in \left\{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\right\}$ f) $x \in \{-3, 7\}$

3.112. a) $x \in \left\{-\frac{5}{9}, \frac{5}{9}\right\}$ b) $x \in \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$ c) $x \in \left\{-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}\right\}$ d) $x \in \{-2, 8\}$

e) $x \in \{-4, 2\}$ f) równanie sprzeczne

3.113. a) $x \in \left\{-4, 1\frac{1}{2}\right\}$ b) $x \in \left\{-1\frac{2}{3}, 4\right\}$ c) $x = \frac{2}{3}$ d) równanie sprzeczne

e) $x \in \left\{0, \frac{4}{49}\right\}$ f) $x = 1\frac{1}{4}$

3.114. a) $x \in \left\{-2, \frac{1}{3}\right\}$ b) $x \in \left\{1, 1\frac{1}{2}\right\}$ c) równanie sprzeczne d) $x \in \left\{-\frac{2}{3}, 0\right\}$

e) $x \in \left\{-2, \frac{1}{5}\right\}$ f) $x = -\frac{1}{2}$

3.115. a) $x \in \{-3, 5\}$ b) $x \in \left\{-1\frac{2}{5}, 0\right\}$ c) $x \in \{-3, 1\}$ d) $x \in \{-11, 9\}$

e) $x \in \{-5, -1\}$ f) $x \in \{-2, 1\}$

3.116. a) $x \in \{1, -5\}$ b) $x \in \{-1, 0\}$ c) $x \in \left\{-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}\right\}$ d) $x \in \left\{-\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right\}$

e) $x \in \left\{-5\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right\}$ f) $x \in \left\{-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\}$

3.117. a) $x \in \{-1, 1\}$ b) równanie sprzeczne c) $x \in \left\{1\frac{1}{2}, \frac{1}{12}\right\}$ d) $x \in \left\{-3, 1\frac{1}{3}\right\}$

e) $x \in \left\{\frac{1}{3}, 1\right\}$ f) $x = 5$

3.118. a) $x \in \left\{-7, \frac{3}{4}\right\}$ b) $x \in \left\{-5, \frac{1}{2}\right\}$ c) równanie sprzeczne d) $x \in \left\{-4, \frac{1}{3}\right\}$

e) $x \in \{-5, 0\}$ f) $x = -1$

3.119. a) $x \in \left\{5, -1\frac{2}{3}\right\}$ b) równanie sprzeczne c) $x \in \left\{\frac{-2-\sqrt{6}}{2}, \frac{-2+\sqrt{6}}{2}\right\}$

d) $x \in \left\{\frac{3}{5}, 4\right\}$ e) $x \in \left\{\frac{1}{3}, 1\right\}$ f) $x \in \left\{-1\frac{1}{3}, 1\right\}$

3.120. a) $x \in \left\{\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right\}$ b) $x \in \left\{-4\frac{1}{2}, 7\right\}$ c) $x \in \left\{\frac{1}{5}, 1\right\}$ d) $x \in \left\{-6\frac{1}{2}, 0\right\}$

e) $x \in \left\{\frac{-3-\sqrt{21}}{2}, \frac{-3+\sqrt{21}}{2}\right\}$ f) $x \in \left\{-2, 1\frac{1}{2}\right\}$

3.121. a) równanie sprzeczne b) $x \in \left\{\frac{2}{3}, 1\right\}$ c) $x \in \left\{2\frac{1}{2}, \frac{3}{10}\right\}$ d) $x \in \{-12, 0\}$

e) $x = -\frac{1}{3}$ f) równanie sprzeczne

3.122. a) $x \in \{0, 1\}$ b) $x \in \left\{-1, \frac{2}{3}\right\}$ c) $x \in \left\{-6-\sqrt{5}, -6+\sqrt{5}\right\}$ d) $x = 3$

3.123. a) $a = -1$ lub $a = 1$ b) $a = -3$ lub $a = 1$

3.124 a) $x \in \{-3, 2\}$ b) $x \in \{1, 4\}$ c) $x \in \{0, 2\}$ d) $x \in \{-4, -1\}$

Równania prowadzące do równań kwadratowych

3.125. a) $x \in \{-4, 0, 4\}$ b) $x \in \left\{-\sqrt{5}, \sqrt{5}\right\}$ c) $x \in \{-1, 1\}$ d) równanie sprzeczne

e) $x \in \left\{-3, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 3\right\}$ f) $x \in \{-2, 2\}$

3.126. a) $x \in \{-2, -1, 1, 2\}$ b) $x \in \left\{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\right\}$ c) $x \in \{-4, -3, 3, 4\}$

d) $x \in \{-5, 0, 5\}$ e) równanie sprzeczne f) $x \in \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$

3.127. a) $x \in \left\{-\sqrt{3}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \sqrt{3}\right\}$ b) $x \in \left\{-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$ c) $x \in \left\{-\frac{\sqrt{5}}{5}, \frac{\sqrt{5}}{5}\right\}$

d) $x = 0$ e) $x \in \left\{-\sqrt{5}, -\sqrt{3}, \sqrt{3}, \sqrt{5}\right\}$ f) $x \in \{-2, -1, 1, 2\}$

3.128. a) $x \in \{-1, 1\}$ b) $x \in \left\{-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$ c) równanie sprzeczne d) $x \in \left\{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\right\}$

e) $x \in \{-1, 1\}$ f) $x \in \{-2, 0, 2\}$

3.129. a) $x \in \left\{-\sqrt{13}, -2, 2, \sqrt{13}\right\}$ b) $x \in \{-1, 1\}$ c) $x \in \{-3, 1\}$ d) równanie sprzeczne e) $x \in \{-4, 0, 1, 5\}$ f) $x \in \{-2, -1\}$

Nierówności kwadratowe

3.130. a) $x \in \boldsymbol{R}$ b) $x = 0$ c) $x \in \left\langle 0, \frac{2}{3} \right\rangle$ d) $x \in (-\infty, -5) \cup (5, +\infty)$ e) nierówność sprzeczna f) $x \in (-\infty, 0\rangle \cup \langle 1, +\infty)$

3.131. a) $x \in (-4, 2)$ b) $x \in \boldsymbol{R} - \left\{\frac{1}{3}\right\}$ c) $x \in (-\infty, 0) \cup \left(\frac{1}{6}, +\infty\right)$ d) $x \in \boldsymbol{R}$ e) $x \in \boldsymbol{R}$, f) $x \in \langle -2, 5\rangle$

3.132. a) $x \in (-\infty, 1) \cup (5, +\infty)$ b) $x \in \langle -2, 0\rangle$ c) $x \in (-\infty, -1\rangle \cup \left\langle 1\frac{1}{2}, +\infty\right)$

d) $x \in \boldsymbol{R}$ e) nierówność sprzeczna f) $x = \frac{1}{2}$

3.133. a) $x \in \boldsymbol{R}$ b) $x \in \langle 0, 5\rangle$ c) $x = 3\frac{1}{2}$ d) $x \in (-2, 1)$ e) $x \in \boldsymbol{R}$ f) nierówność sprzeczna

3.134. a) $x \in \left(-\infty, 1-\sqrt{3}\right\rangle \cup \left\langle 1+\sqrt{3}, +\infty\right)$ b) $x \in \left(-\infty, -1\frac{1}{2}\right) \cup \left(2\frac{1}{2}, +\infty\right)$ c) $x = \frac{3}{5}$

d) nierówność sprzeczna e) $x \in \boldsymbol{R} - \left\{-\frac{2}{3}\right\}$ f) $x \in \langle -1, 2\rangle$

3.135. a) nierówność sprzeczna b) $x \in \boldsymbol{R}$ c) $x \in (-\infty, -3\rangle \cup \langle 2, +\infty)$ d) $x = 2{,}5$

e) $x \in (0, 2)$ f) $x \in \boldsymbol{R} - \left\{\frac{2}{5}\right\}$

3.136. a) $x \in (-\infty, 3\rangle \cup \left\langle 3\frac{1}{2}, +\infty\right)$ b) $x \in \left(0, \frac{1}{4}\right)$ c) $x \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{8}, +\infty\right)$

d) $x \in \left\langle -3, \frac{9}{19}\right\rangle$ e) $x = -5$ f) nierówność sprzeczna

3.137. a) $x = 3$ b) nierówność sprzeczna c) $x \in \boldsymbol{R}$ d) $x \in \langle 0, 10\rangle$ e) $x \in \langle -2, 3\rangle$
f) nierówność sprzeczna

3.138. a) $x \in (-1, 4)$ b) $x \in \left(-\infty, \frac{1}{3}\right) \cup (5, +\infty)$ c) $x \in \left\langle -\frac{2}{3}, 4\right\rangle$ d) $x \in \{-3\}$ e) $x \in \boldsymbol{R}$

f) nierówność sprzeczna

3.139. a) $x \in (-\infty, 2) \cup (11, +\infty)$ b) $x \in \left\langle -3\frac{1}{2}, 1\right\rangle$ c) $x \in (-\infty, -29\rangle \cup \langle 1, +\infty)$

d) $x \in \boldsymbol{R} - \{2\}$

3.140. a) $x \in \langle 1, 4\rangle$ b) $x \in (-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$ c) $x \in (-\infty, -4\rangle \cup \langle 0, +\infty)$ d) $x \in \boldsymbol{R}$
e) $x \in \langle -4, 1\rangle$ f) $x \in \boldsymbol{R} - \{3\}$

3.142. $a = -8$

3.143. $a = -2\frac{2}{5}$

3.144. $a = -1\frac{4}{5}$

3.145. $A = (-\infty, 1\rangle \cup \langle 5, +\infty)$; $B = (-\infty, -4) \cup (1, +\infty)$; $A \cap B = (-\infty, -4) \cup \langle 5, +\infty)$;
$A \cup B = \boldsymbol{R}$; $B - A = (1, 5)$

3.146. $A = \langle 0, 4\rangle$; $B = \{-2, -1, 0, 1\}$; $A \cup B = \{-2, -1\} \cup \langle 0, 4\rangle$; $A \cap B = \{0, 1\}$

3.147. a) $D = \boldsymbol{R}$ b) $D = \langle 0, 2\rangle$ c) $D = (-\infty, -4\rangle \cup \langle 1, +\infty)$ d) $D = \left\{\frac{1}{2}\right\}$

e) $D = (-3, 1)$ f) $D = \boldsymbol{R} - \left\{\frac{4}{5}\right\}$

3.148. a) $m \in (-\infty, -1\rangle \cup \langle 5, +\infty)$ b) $m \in (-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$ c) $m \in (-1, 1) \cup (2, 4)$
d) $m \in \langle -4, -3\rangle \cup \langle -2, -1\rangle$

3.149. a) $m \in \langle -4, 4\rangle$ b) $m = -6$ c) $m \in (-3, 5)$ d) $m \in \left(-\infty, -\frac{2}{3}\right) \cup (2, +\infty)$

Zadania prowadzące do równań i nierówności kwadratowych

3.150. 16 i 12 lub −16 i −12

3.151. −12, −10, −8 lub 8, 10, 12

3.152. −9, −7, −5 lub 5, 7, 9

3.153. 354

3.154. 23 lub 32

3.155. 141.

3.156. 18

3.157. 6

3.158. 5 klas

3.159. 30 m

3.160. 0,54 m^2, 0,96 m^2

3.161. 2,5 cm

3.162. 0,6 km i 0,8 km

3.163. $p = 30$

3.164. 32 cm i 32 cm lub $41\frac{1}{7}$ cm i $22\frac{6}{7}$ cm

3.165. w I beczce: 120 litrów w cenie 20 zł za litr, w II beczce: 80 litrów w cenie 30 zł za litr

3.166. tak, 25 lat

3.167. 5 i 1 lub 6 i 2

3.168. a) $P(a) = \frac{5}{4}a^2 + a$, $a \in (0, +\infty)$ b) $a = 1{,}2$ c) $a \in \langle 4, 6\rangle$

3.169. 63, 54, 45, 36, 27

3.170. sześć

3.171. 1 m

3.172. 3 cm, 4 cm

3.173. $4\frac{8}{13}$

Test sprawdzający do rozdziału 3.

Nr zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Odpowiedź	**D**	**A**	**C**	**C**	**B**	**A**	**A**	**D**	**A**	**A**	**B**	**B**

Zadania powtórzeniowe do rozdziału 3.

13. a) $x=-10$ b) $x\in\left\{-\frac{3}{5},2\right\}$ c) $x\in\left\{-\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right\}$ d) $x\in\{-1,0,3,4\}$

14. a) $x\in\left\langle\frac{1}{2},1\right\rangle$ b) $x=\frac{3\sqrt{2}}{2}$ c) $x\in\left(-\frac{4}{3},\frac{4}{3}\right)$ d) $x\in\boldsymbol{R}$

15. najmniejsza wartość: 3; największa wartość: 21

16. a) $f(x)=-0{,}5(x-1)^2+4\frac{1}{2}$ b) $-2, 4$ c) $x\in\{-2,2\}$

17. a) $a=c=-3$ b) $\langle 8,+\infty)$ c) $x\in\left(-1,-\frac{1}{3}\right)$

18. a) postać iloczynowa: $f(x)=\frac{1}{2}(x+3)(x-1)$; postać kanoniczna: $f(x)=\frac{1}{2}(x+1)^2+2$
b) f rosnąca w przedziale $\langle -1,+\infty)$; f malejąca w przedziale $(-\infty,-1\rangle$ c) 0, 2

19. a) $x=-4$ b) $a=-\frac{1}{4}$, $b=-2$, $c=-3$ c) $g(x)=-\frac{1}{4}x^2-3\frac{1}{2}x-7\frac{1}{4}$

20. ojciec ma 64 lata, córka 36 lat.

21. 125.

22. co najmniej 11 osób

23. $2\sqrt{34}$ cm

24. a) $Z(x)=86\cdot x-K(x)$, skąd $Z(x)=-4x^2+88x-84$, gdzie $x\in\{1,2,\ldots,18\}$; co najmniej 2 koszulki b) 11 koszulek; dzienny zysk wyniesie wówczas 400 zł

25. $\frac{50}{49}$ m, $\frac{48}{49}$ m

4. Geometria płaska – okręgi i koła

Powtórzenie wiadomości z geometrii z klasy 1.

4.1. $36°, 144°$

4.2. a) $245°$ b) $220°$

4.3. $|\sphericalangle ACB|=94°$

4.4. $\beta=143°$

4.5. a) $35°, 67°, 78°$ b) $52°, 75°, 53°$

4.6. $51°$

4.8. b) *wskazówka:* Poprowadź prostą AB i oblicz miarę kąta przyległego do kąta CBA.

4.9. a) $x=2{,}4$ b) $x=9$ c) $x=4{,}5$ d) $x=4{,}5$ e) $x=12$ f) $x=10\frac{5}{7}$

4.10. a) $2\frac{2}{3}$ cm b) 8,4 dm c) 7 dm d) 9 cm

4.11. a) tak b) tak c) nie d) nie

4.12. a) $a \in (2, 6)$ b) $a \in (3, +\infty)$ c) $a \in \left(1\frac{1}{3}, 6\right)$

4.13. $c \in \{7, 11\}$

4.14. a) 9 b) 9

4.15. 6 cm, 9 cm, 12 cm

4.16. 7, 14, 21, $|AB| = 28$

4.17. 28°, 28°, 124°

4.19. a) $8+4\sqrt{3}$ b) $12+6\sqrt{3}$

4.20. a) $2\sqrt{2}$ cm, $2\sqrt{2}$ cm, 4 cm b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ cm, $\frac{3}{\sqrt{2}}$ cm

4.21. b) 18,9 cm

4.22. b) 37,6 cm

4.23. a) 9 cm, 12 cm, 15 cm b) 7,5 cm

4.24. a) rozwartokątny b) 8 cm, $9\frac{15}{17}$ cm, 16,8 cm

4.25. a) 12 cm b) $\frac{3\sqrt{97}}{2}$ cm c) 7,5 cm

4.26. a) $\sqrt{3}$, $2\sqrt{3}$ b) $0{,}5\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$

4.27. a) 3 cm, 4 cm; *wskazówka:* Zauważ, że trójkąt jest prostokątny. Poprowadź ze środka przeciwprostokątnej odcinki prostopadłe do przyprostokątnych, wyznacz ich długość i skorzystaj z wniosku z twierdzenia Talesa b) 5 cm, $2\sqrt{13}$ cm, $\sqrt{73}$ cm

4.28. 15 cm, $\frac{3\sqrt{89}}{2}$ cm, $\frac{3\sqrt{89}}{2}$ cm

4.29. *wskazówka:* Poprowadź przez punkt D prostą, równoległą do półprostej $\overrightarrow{CE}$.

4.30. *wskazówka:* Wykaż, że $|\sphericalangle ADC| = 90°$. Następnie uzasadnij, że $\triangle ADC \equiv \triangle ADB$.

4.31. *wskazówka:* Wykaż, że $\triangle PDC \equiv \triangle ADB$.

4.32. 10 cm

4.33. o 20%

4.34. b) $\frac{5}{3}$

4.35. 60 cm

4.36. (2,5 cm, 7,5 cm) oraz (2 cm, 6 cm)

4.37. a) 6 cm; 3,6 cm; 3,6 cm b) 7,2 cm

4.38. 40 cm

4.39. 7,5 cm, 10 cm

4.40. b) nie

Okrąg. Położenie prostej i okręgu

4.41. a) 3 cięciwy, 6 łuków b) 6 cięciw, 12 łuków

4.42. 3,5 cm

4.43. 7 cm

4.44. 30 cm

4.45. 26π cm

4.46. a) 10π cm b) 6 cm

4.47. a) 17% b) 64% c) 50% d) 12% e) 100% f) 28%

4.48. a) prosta k jest rozłączna z okręgiem o b) prosta k jest sieczną okręgu o c) prosta k jest sieczną okręgu o d) prosta k jest styczna do okręgu o

4.50. 34 cm

4.51. $|FC| = 12$ cm

4.52. a) 135° b) 120° c) 80° d) 39°

4.53. 2 cm

4.55. 20 cm; *wskazówka:* Skorzystaj dwukrotnie z twierdzenia Talesa.

4.56. a) $a \in \langle 3, +\infty)$; jeśli $a \in \langle 3, 7)$, to prosta jest sieczną okręgu; jeśli $a = 7$, to prosta jest styczna do okręgu; jeśli $a \in (7, +\infty)$, to prosta jest rozłączna z okręgiem

b) $a \in (0, 8\rangle$; jeśli $a \in (0, 4)$, to k jest rozłączna z okręgiem, jeśli $a = 4$, to prosta jest styczna do okręgu, jeśli $a \in (4, 8\rangle$, to prosta jest sieczną okręgu c) $a \in \langle -6, 0)$; jeśli $a \in \langle -6, -3)$, to prosta jest sieczną okręgu, jeśli $a = -3$, to prosta jest styczna do okręgu; jeśli $a \in (-3, 0)$, to prosta jest rozłączna z okręgiem

d) $a \in (1, +\infty)$; prosta jest rozłączna z okręgiem

Wzajemne położenie dwóch okręgów

4.57. a) okręgi styczne wewnętrznie b) okręgi styczne zewnętrznie c) okręgi się przecinają d) okręgi styczne wewnętrznie e) okręgi rozłączne wewnętrznie f) okręgi rozłączne zewnętrznie

4.58. a) 5 cm, 7 cm b) 3 cm, 9 cm

4.59. a) 3 cm, 6 cm b) 7 cm, 10 cm

4.60. 6 cm, 9 cm

4.61. trójkąt równoboczny o boku r

4.62. 12,5 cm

4.63. *wskazówka:* $R - r = 9$ oraz $15^2 = R^2 - r^2 = (R - r)(R + r) = 9 \cdot (R + r)$, teraz wystarczy rozwiązać układ równań $(R - r = 9 \wedge R + r = 25)$

4.64. a) $k \in \langle 0, +\infty)$; jeśli $k \in \langle 0, 1)$, to okręgi rozłączne wewnętrznie; jeśli $k = 1$, to okręgi styczne wewnętrznie; jeśli $k \in (1, 5)$, to okręgi się przecinają; jeśli $k = 5$, to okręgi styczne zewnętrznie; jeśli $k \in (5, +\infty)$, to okręgi rozłączne zewnętrznie

b) $k \in (1, +\infty)$; jeśli $k \in (1, 3)$, to okręgi rozłączne zewnętrznie; jeśli $k = 3$, to okręgi styczne zewnętrznie; jeśli $k \in (3, +\infty)$, to okręgi się przecinają c) $k \in (0, +\infty)$; jeśli $k \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, to okręgi rozłączne zewnętrznie; jeśli $k = \frac{1}{2}$, to okręgi styczne zewnętrznie; jeśli $k \in \left(\frac{1}{2}, 3\frac{1}{2}\right)$, to okręgi się przecinają; jeśli $k = 3\frac{1}{2}$, to okręgi styczne wewnętrznie; jeśli $k \in \left(3\frac{1}{2}, +\infty\right)$, to okręgi rozłączne wewnętrznie

d) $k \in (-1, 5)$; jeśli $k \in \{1, 3\}$, to okręgi styczne wewnętrznie; jeśli $k \in (-1, 1) \cup (3, 5)$, to okręgi rozłączne wewnętrznie; jeśli $k \in (1, 3)$, to okręgi się przecinają

4.65. a) $m \in \{8, 14\}$ b) $m \in (8, 14)$

4.66. $a \in \left\langle 4, 4\frac{2}{3} \right\rangle$

Koła i kąty

4.67. a) $\alpha = 107°$ b) $\alpha = 61°$ c) $\alpha = 160°$ d) $\alpha = 76°$ e) $\alpha = 47°$ f) $\alpha = 34°$

4.68. a) $\alpha = 65°$ b) $\alpha = 105°$ c) 69° d) 77°

4.69. a) 60°, 65°, 55° b) 35°, 15°, 130° c) 40°, 70°, 70°

4.70. a) 40° b) 100° c) 55°

4.71. a) 90° b) 120° c) 225° d) 108° e) ok. 57° f) ok. 286°

4.72. a) 6π b) 12π c) 3π d) $\frac{14\pi}{3}$ e) $19{,}5\pi$

4.73. a) 20° b) 80° c) 120° d) 140°

4.74. $\frac{2}{3}$

4.75. $\overset{\frown}{BC} : \overset{\frown}{AC} : \overset{\frown}{AB} = 2 : 3 : 7$

4.76. 50°, 60°, 70°

4.80. *wskazówka:* Zauważ, że $|\sphericalangle ABC| = |\sphericalangle ADC|$. Następnie zapisz kąt ACD jako sumę kątów ACB, BCD i skorzystaj z twierdzenia o dwóch prostych równoległych przeciętych trzecią prostą.

4.81. *wskazówka:* Oblicz $|\sphericalangle ABO|$ i skorzystaj z twierdzenia odwrotnego do twierdzenia o dwóch prostych równoległych przeciętych trzecią prostą.

Twierdzenie o stycznej i siecznej

4.82. 3 cm

4.83. 12 cm

4.84. 7 cm

4.85. $|CP| = 16$ cm

4.86. $|CD| = 10$ cm

4.87. a) $r = 7$ b) $|PE| = 16\sqrt{3}$

4.89. *wskazówka:* Niech $|PA| = 3x$, oraz $|PB| = y$; wówczas $|PC| = 5x$. Wyraź y w zależności od x.

4.90. $|AB| = |AC| = 6\sqrt{5}$ cm, $|AB| = 12$ cm; *wskazówka:* Niech $|CE| = |EB| = x$; wówczas $x \cdot x = 12 \cdot 3$

4.91. a) $r = 3$ b) $|CE| = 4$ cm, $|EB| = 6$ cm; *wskazówka:* Poprowadź promień OE i oblicz CE. Następnie zauważ, że $\triangle DBC \sim \triangle EOC$.

Symetralne boków trójkąta. Okrąg opisany na trójkącie

4.92. 3,15 cm

4.93. a) 9 cm b) $\left(31+\sqrt{97}\right)$ cm c) 12 cm d) $\frac{36\sqrt{97}}{97}$ cm

4.94. 24 cm

4.95. 5 : 4

4.96. 168 cm

4.97. 4 cm, 4 cm, $4\sqrt{3}$ cm

4.98. a) *wskazówka:* Niech środek S okręgu opisanego na trójkącie ABC należy do wysokości CD. Ponieważ przez punkt S można poprowadzić tylko jedną prostą prostopadłą do boku AB, więc wysokość CD zawiera się w symetralnej boku AB. Zatem symetralna boku AB przechodzi przez punkt C. Następnie wykaż, że $\triangle ADC \equiv \triangle BDC$

b) *wskazówka:* Niech $|AB| = 2a$, $|CD| = 3x$. Wówczas $|CS| = |SB| = 2x$. Zastosuj twierdzenie Pitagorasa kolejno do trójkątów DBS i DBC.

4.90. a) środek okręgu jest środkiem najdłuższego boku b) na zewnątrz trójkąta c) na zewnątrz trójkąta d) wewnątrz trójkąta

4.100. $2\sqrt{3}$ cm

4.101. $6\sqrt{3}$ cm

4.102. a) $\sqrt{2}$ cm b) 12,5 cm c) 30,5 cm

4.103. 4 cm

4.104. 84,5 cm

4.105. a) $4\frac{1}{6}$ cm b) $8\frac{1}{3}$ cm, $6\frac{2}{3}$ cm, 5 cm

4.106. $8\sqrt{5}$, $4\sqrt{5}$, 20

4.107. $|AB| : |BC| : |AC| = 2 : \sqrt{3} : 1$ b) $|AB| : |BC| : |AC| = 1 : \sqrt{2} : 1$

4.108. b) 6 cm

4.109. 12 cm, $9\frac{3}{8}$ cm

4.110. $8\frac{1}{3}$ cm

4.111. a) $13\frac{1}{48}$ cm b) $169\frac{3}{22}$ cm

4.112. $|AB| = 8$

4.113. 24 cm, 15 cm, 15 cm; *wskazówka:* Najpierw skorzystaj z twierdzenia Pitagorasa do wyznaczenia długości ramienia. Następnie skorzystaj z podobieństwa odpowiednich trójkątów do obliczenia wysokości trójkąta poprowadzonej na podstawę.

Dwusieczne kątów trójkąta. Okrąg wpisany w trójkąt

4.114. $(40°, 40°, 100°)$ lub $(80°, 80°, 20°)$

4.115. 63°, 9°

4.116. I. 10°, 40°, 130° II. 50°, 50°, 80° III. 50°, 60°, 70° IV. 30°, 40°, 110° V. 30°, 70°, 80° VI. 10°, 60°, 110°

4.117. 50°, 50°, 80° lub 80°, 80°, 20°

4.118. 55°, 65°, 60°

4.119. 80°, 60°, 40°

4.120. 24 cm

4.121. 6 cm, 10 cm

4.122. a) $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ b) 2,5 cm

4.123. $24\sqrt{3}$ cm

4.124. a) $r = 3\sqrt{2} - 3$ b) $r = 1$

4.125. 1 cm, 2 cm; 1 cm, 3 cm; 2 cm, 3 cm

4.126. a) 2 cm b) 3 cm c) 2 cm d) $\left(\sqrt{5} - 1\right)$ cm

4.127. a) $2\sqrt{2} - 2$ b) $\sqrt{2} + 1$

4.129. 2 cm; *wskazówka:* Skorzystaj z własności opisanej w poprzednim zadaniu.

4.130. $R = 12{,}5$ cm, $r = 3$ cm

4.131. a) 1,5 cm b) 2,4 cm

4.132. a) $1\frac{1}{3}$ cm b) 5,25 cm

4.133. $|AB| = 48$ cm, $|AC| = |BC| = 30$ cm.

4.134. 10 cm; *wskazówka:* Niech O oznacza środek okręgu, D – punkt styczności okręgu z podstawą AB, E – punkt styczności z ramieniem BC. Zauważ, że trójkąt DBC jest podobny do trójkąta OEC w skali 2. Jeśli $|OC| = x$, to $|BC| = 2x$.

4.135. $2\frac{2}{3}$ cm, $3\frac{1}{3}$ cm

4.136. 9 cm, 3 cm

4.137. $6\frac{2}{3}$ cm lub 15 cm

4.138. a) $|AB| = 6$ b) $|AE| = 4\frac{5}{7}$, $|BE| = 1\frac{2}{7}$

4.139. a) 6 cm, 4 cm b) $5\frac{5}{11}$ cm, $4\frac{6}{11}$ cm

4.140. a) $8\frac{4}{7}$ cm, $6\frac{3}{7}$ cm b) 9 cm, 6 cm

4.141. a) $|CD| = 2\sqrt{3}$ b) $R = 3$ c) $r = \frac{3\sqrt{3}-3}{2}$

4.142. a) $\frac{60\sqrt{2}}{7}$ b) $\frac{20\sqrt{10}}{3}$ *wskazówka:* Zauważ, że trójkąt jest prostokątny.

4.143. a) 4,2 cm, 5,6 cm b) $2{,}4\sqrt{2}$ cm

4.144. a) $|AD| = \frac{48\sqrt{5}}{11}$ b) $|CE| = 8$

Test sprawdzający do rozdziału 4.

Nr zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Odpowiedź	**B**	**D**	**C**	**B**	**A**	**D**	**D**	**B**	**D**	**C**	**A**	**B**	**D**	**C**	**C**

Zadania powtórzeniowe do rozdziału 4.

16. 6 cm

17. a) $\alpha = 39°$ b) $\alpha = 50°$

18. $\left(\frac{540}{7}\right)^\circ \approx 77°$

19. b) $|\sphericalangle A| = 39°$, $|\sphericalangle B| = 25°$, $|\sphericalangle C| = 116°$

21. a) $r = 3$ cm, $R = 7$ cm b) $|AB| = 4{,}5$ cm

22. Okręgi istnieją, jeśli $m \in \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ a) okręgi są styczne zewnętrznie, jeśli $m = 3$; promienie okręgów: 5 i 9, okręgi są styczne wewnętrznie, jeśli $m = 13$; promienie okręgów: 25 i 39 b) $m \in (3, 13)$

23. 18 cm

25. 1 : 3

26. a) $|DE| = 3{,}75$ cm b) $|CF| = 3\sqrt{5}$ cm

27. a) 12 cm, 8 cm; *wskazówka:* Wykaż, że trójkąt ABC jest prostokątny.

b) $11\frac{3}{7}$ cm, $8\frac{4}{7}$ cm

28. a) 10 b) $R=7\frac{1}{24}$ c) $r=3\frac{1}{3}$

29. a) 30 cm, 40 cm, 50 cm b) 10 cm

30. a) $31\frac{7}{8}$, $36\frac{1}{8}$ b) $R=18\frac{1}{16}$ c) $r=6\frac{3}{8}$

5. Trygonometria

Trygonometria kąta ostrego – powtórzenie wiadomości z klasy 1.

5.1. a) 33,5 cm b) 38,5 cm c) 27 cm d) 45,5 cm e) 23,5 cm f) 27,5 cm

5.2. a) 3 b) $\frac{\sqrt{10}}{10}$

5.3. a) $\frac{1}{4}$ b) $-2\sqrt{3}$ c) $-30+5\sqrt{6}$

5.4. a) $\sqrt{3}$ cm b) $\sqrt{2}$ cm c) 1 cm

5.5. e) 60° f) 45° g) 30° h) 45°

5.6. a) $|\sphericalangle A|=45°$, $|\sphericalangle B|=30°$, $|\sphericalangle C|=105°$ b) $|\sphericalangle A|=60°$, $|\sphericalangle B|=30°$, $|\sphericalangle C|=90°$

5.8. a) $\cos\alpha=\frac{24}{25}$, $\operatorname{tg}\alpha=\frac{7}{24}$, $\operatorname{ctg}\alpha=3\frac{3}{7}$ b) $\sin\alpha=\frac{11}{61}$, $\operatorname{tg}\alpha=\frac{11}{60}$, $\operatorname{ctg}\alpha=5\frac{5}{11}$

c) $\sin\alpha=\frac{12}{13}$, $\cos\alpha=\frac{5}{13}$, $\operatorname{ctg}\alpha=\frac{5}{12}$ d) $\sin\alpha=\frac{3\sqrt{10}}{10}$, $\cos\alpha=\frac{\sqrt{10}}{10}$, $\operatorname{tg}\alpha=3$

5.9. *wskazówka:* Wykaż, że $\alpha=60°$, $\beta=30°$.

Sinus, cosinus, tangens i cotangens dowolnego kąta płaskiego

5.13. a) $\sin\alpha=\frac{5}{13}$, $\cos\alpha=\frac{12}{13}$, $\operatorname{tg}\alpha=\frac{5}{12}$, $\operatorname{ctg}\alpha=2\frac{2}{5}$

b) $\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos\alpha=-\frac{1}{2}$, $\operatorname{tg}\alpha=-\sqrt{3}$, $\operatorname{ctg}\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{3}$

c) $\sin\alpha=-\frac{\sqrt{6}}{3}$, $\cos\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{3}$, $\operatorname{tg}\alpha=\sqrt{2}$, $\operatorname{ctg}\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}$

d) $\sin\alpha=-\frac{8}{17}$, $\cos\alpha=\frac{15}{17}$, $\operatorname{tg}\alpha=-\frac{8}{15}$, $\operatorname{ctg}\alpha=-1\frac{7}{8}$

e) $\sin\alpha=-1$, $\cos\alpha=0$, $\operatorname{tg}\alpha$ – nie istnieje, $\operatorname{ctg}\alpha=0$

f) $\sin\alpha=0$, $\cos\alpha=-1$, $\operatorname{tg}\alpha=0$, $\operatorname{ctg}\alpha$ – nie istnieje

5.14. a) $y=-4$ b) $x=-3$ c) $x=7{,}5$ d) $y=-1$

5.15. a) $P\left(3\sqrt{2}, 3\sqrt{2}\right)$ b) $P\left(-6, 3\sqrt{5}\right)$ c) $P(-6, -8)$ d) $P\left(3, -\sqrt{3}\right)$

5.16. a) $P(-2,-4)$ b) $P(-1,3)$ c) $P(12,-9)$ d) $P\left(\sqrt{5},2\sqrt{5}\right)$

5.17. a) $\alpha=90^\circ$ b) $\alpha=0^\circ$ lub $\alpha=180^\circ$ c) $\alpha=90^\circ$ lub $\alpha=270^\circ$

5.18. a) $\sin 210^\circ=\frac{-1}{2}$, $\cos 210^\circ=\frac{-\sqrt{3}}{2}$, $\operatorname{tg}210^\circ=\frac{\sqrt{3}}{3}$, $\operatorname{ctg}210^\circ=\sqrt{3}$

b) $\sin 240^\circ=\frac{-\sqrt{3}}{2}$, $\cos 240^\circ=\frac{-1}{2}$, $\operatorname{tg}240^\circ=\sqrt{3}$, $\operatorname{ctg}240^\circ=\frac{\sqrt{3}}{3}$

c) $\sin 135^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos 135^\circ=\frac{-\sqrt{2}}{2}$, $\operatorname{tg}135^\circ=-1$, $\operatorname{ctg}135^\circ=-1$

d) $\sin 330^\circ=\frac{-1}{2}$, $\cos 330^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\operatorname{tg}330^\circ=\frac{-\sqrt{3}}{3}$, $\operatorname{ctg}330^\circ=-\sqrt{3}$

5.19. a) III ćw. b) IV ćw. c) I ćw. lub III ćw. d) II ćw. e) IV ćw. f) IV ćw.

5.20. a) wartość ujemną b) wartość dodatnią c) wartość ujemną d) wartość dodatnią

5.21. a) $P(-3,-2)$ b) $P\left(\frac{-3\sqrt{10}}{2},\frac{\sqrt{10}}{2}\right)$ c) $P\left(1,-\frac{2}{5}\right)$ d) $P\left(1\frac{2}{3},1\frac{1}{3}\right)$

5.22. a) *wskazówka:* Skorzystaj z definicji funkcji trygonometrycznych i ustal, że końcowe ramię kąta α zawiera się w prostej $y=x$.

Podstawowe tożsamości trygonometryczne

5.25. a) $\cos\alpha=-0{,}6$, $\operatorname{tg}\alpha=-\frac{4}{3}$, $\operatorname{ctg}\alpha=-\frac{3}{4}$ b) $\sin\alpha=\frac{\sqrt{15}}{4}$, $\operatorname{tg}\alpha=-\sqrt{15}$, $\operatorname{ctg}\alpha=-\frac{\sqrt{15}}{15}$

c) $\sin\alpha=\frac{\sqrt{10}}{10}$, $\cos\alpha=\frac{-3\sqrt{10}}{10}$, $\operatorname{ctg}\alpha=-3$

d) $\sin\alpha=\frac{\sqrt{2}}{10}$, $\cos\alpha=-\frac{7\sqrt{2}}{10}$, $\operatorname{tg}\alpha=-\frac{1}{7}$

5.26. a) $\sin\alpha=\frac{\sqrt{5}}{5}$, $\cos\alpha=\frac{2\sqrt{5}}{5}$, $\operatorname{ctg}\alpha=2$ b) $\sin\alpha=\frac{7}{25}$, $\operatorname{tg}\alpha=-\frac{7}{24}$, $\operatorname{ctg}\alpha=-3\frac{3}{7}$

c) $\left(\cos\alpha=\frac{2}{3},\ \operatorname{tg}\alpha=\frac{\sqrt{5}}{2},\ \operatorname{ctg}\alpha=\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$ lub $\left(\cos\alpha=-\frac{2}{3},\ \operatorname{tg}\alpha=-\frac{\sqrt{5}}{2},\ \operatorname{ctg}\alpha=-\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$

d) $\sin\alpha=\frac{60}{61}$ $\cos\alpha=-\frac{11}{61}$ $\operatorname{tg}\alpha=-5\frac{5}{11}$

5.27. a) $\cos\alpha=-\frac{12}{13}$, $\operatorname{tg}\alpha=\frac{5}{12}$, $\operatorname{ctg}\alpha=\frac{12}{5}$ b) $\cos\alpha=-\frac{8}{17}$, $\sin\alpha=-\frac{15}{17}$, $\operatorname{tg}\alpha=\frac{15}{8}$

c) $\sin\alpha=-\frac{12}{13}$, $\cos\alpha=\frac{5}{13}$, $\operatorname{ctg}\alpha=-\frac{5}{12}$ d) $\sin\alpha=-\frac{\sqrt{5}}{3}$, $\operatorname{tg}\alpha=-\frac{\sqrt{5}}{2}$, $\operatorname{ctg}\alpha=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$

5.28. a) $\left(\sin\alpha=\frac{12}{13},\ \operatorname{tg}\alpha=\frac{12}{5},\ \operatorname{ctg}\alpha=\frac{5}{12}\right)$ lub $\left(\sin\alpha=-\frac{12}{13},\ \operatorname{tg}\alpha=-\frac{12}{5},\ \operatorname{ctg}\alpha=-\frac{5}{12}\right)$

b) $\left(\cos\alpha=-\frac{11}{61},\ \operatorname{tg}\alpha=\frac{60}{11},\ \operatorname{ctg}\alpha=\frac{11}{60}\right)$ lub $\left(\cos\alpha=\frac{11}{61},\ \operatorname{tg}\alpha=-\frac{60}{11},\ \operatorname{ctg}\alpha=-\frac{11}{60}\right)$

c) $\left(\sin\alpha=\frac{\sqrt{10}}{10},\ \cos\alpha=\frac{3\sqrt{10}}{10},\ \operatorname{tg}\alpha=\frac{1}{3}\right)$ lub $\left(\sin\alpha=-\frac{\sqrt{10}}{10},\ \cos\alpha=-\frac{3\sqrt{10}}{10},\ \operatorname{tg}\alpha=\frac{1}{3}\right)$

d) $\left(\cos\alpha=\frac{45}{53},\ \sin\alpha=\frac{28}{53},\ \operatorname{tg}\alpha=\frac{28}{45}\right)$ lub $\left(\cos\alpha=-\frac{45}{53},\ \sin\alpha=-\frac{28}{53},\ \operatorname{tg}\alpha=\frac{28}{45}\right)$

5.29. a) $\frac{15}{16}$ b) 6

5.30. a) $-1{,}09$ b) $0{,}5-\sqrt{3}$ c) $-11\frac{1}{2}$ d) $-1\frac{16}{21}$

5.31. a) $\operatorname{tg}\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$ b) $\operatorname{ctg}\alpha=-\frac{\sqrt{10}}{5}$ c) $\operatorname{tg}\alpha=1$ d) $\operatorname{ctg}\alpha=-2$

5.34. a) $-\frac{60}{169}$ b) $\frac{17}{13}$ c) $\sin\alpha=\frac{12}{13}$, $\cos\alpha=-\frac{5}{13}$

5.35. a) $-\frac{1}{4}$ b) $\frac{3}{2}$ c) $\frac{7}{8}$

5.36. a) 14 b) 194 c) 12

5.39. a) nie b) tak, do IV ćw. c) tak, do II ćw. d) nie

5.40. a) nie b) tak c) tak d) nie

5.41. a) nie b) tak c) tak d) tak

Wybrane wzory redukcyjne

5.42. a) $-1\frac{3}{4}$ b) $-2\frac{1}{2}$ c) $\frac{7-4\sqrt{3}}{12}$ d) $2\frac{1}{2}$

5.43. $a=-2$, $b=\frac{11+4\sqrt{6}}{12}$, $c=-\frac{1}{4}$, $d=\frac{1}{2}$. Liczby wymierne to: a, c, d.

5.44. a) $x>y$ b) $x=y$ c) $x<y$ d) $x<y$

5.45. a) 3 b) 1 c) 0 d) 2 e) 3

5.46. a) 1 b) 2 c) -2 d) $1\frac{1}{4}$ e) -2

5.47. a) -1 b) 0 c) 1 d) 2

5.48. a) $\alpha+\beta=120°$; $\sin(\alpha+\beta)=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos(\alpha+\beta)=\frac{-1}{2}$, $\operatorname{tg}(\alpha+\beta)=-\sqrt{3}$,

$\operatorname{ctg}(\alpha+\beta)=\frac{-\sqrt{3}}{3}$ c) *wskazówka:* $\gamma=150°$, więc $\alpha+\beta=30°$ d) *wskazówka:* $\gamma=135°$

5.49. a) 210° b) 180° c) 135° d) 330° e) 315° f) 120°

Test sprawdzający do rozdziału 5.

Nr zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Odpowiedź	A	C	D	D	A	D	B	B	A	B

Zadania powtórzeniowe do rozdziału 5.

11. $\sin\alpha = \frac{8}{17}$, $\cos\alpha = -\frac{15}{17}$, $\operatorname{tg}\alpha = \frac{-8}{15}$, $\operatorname{ctg}\alpha = -1\frac{7}{8}$

15. $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $b = \frac{1}{2}$, zatem $a > b$

16. a) $\alpha = 300^\circ$ b) $\alpha = 150^\circ$

17. a) $4\frac{1}{4}$ b) $16\frac{1}{16}$

18. a) $\frac{\sqrt{14}}{3}$; *wskazówka:* Oblicz $(\sin\alpha - \cos\alpha)^2$ i uzasadnij, że $\sin\alpha - \cos\alpha > 0$. b) $\frac{137}{162}$

19. a) -1 b) $-\sqrt{3}$

21. *wskazówka:* Wykaż, że $\operatorname{tg}\alpha = 1$.

6. Geometria analityczna

Odcinek w układzie współrzędnych

6.1. a) 11 b) 9 c) 17 d) $6\sqrt{2}$ e) $\sqrt{10}+\sqrt{2}$ f) $3\frac{1}{3}$

6.2. a) $(-1, 2)$ b) $(0, 3)$ c) $(-3, 4)$ d) $\left(\sqrt{2}, 2\right)$

6.3. a) $C(9, -3)$, $D(8, 3)$ b) $A(-4, -3)$, $D(-6, 6)$

6.4. a) $D(-6, -2)$, $P(-2, 2)$ b) $C(6, 8)$, $P\left(\frac{1}{2}, 3\right)$

6.5. a) $|AC| = 2\sqrt{17}$, $|DB| = 8\sqrt{5}$ b) $|DB| = 10$, $|AC| = 10\sqrt{2}$

6.6. a) $|AB| = |DC| = 5$, $|AD| = |BC| = \sqrt{65}$ b) $|AB| = |DC| = 8$, $|AD| = |BC| = 2\sqrt{17}$

6.7. a) $\sqrt{113}$ b) $\sqrt{26}$ c) $\sqrt{53}$

6.8. a) $S_1(-3, -4)$, $S_2(-1, -1)$, $S_3(1, 2)$
b) $S_1(-2, -1)$, $S_2(-6, 1)$
c) $S_1(0, 5)$, $S_2(1, 7)$, $S_3(2, 9)$, $S_4(3,11)$, $S_5(4, 13)$

6.9. a) $S(3, 2)$ b) $S(-2, -1)$ c) $S(1, 3)$ d) $S(1, -4)$

6.10. $D(-1, 0)$, $E(5, 5)$, $F(-1, 4)$

6.13. *wskazówka:* Wykaż, że wszystkie boki czworokąta mają jednakową długość.

6.14. *wskazówka:* Wykaż, że odpowiednie wektory są równe.

6.15. *wskazówka:* Wykaż, że odpowiednie wektory są równoległe.

Równanie kierunkowe prostej

6.16. a) 2,5 b) 1 c) 18 d) –16

6.17. a) $y = -3x + 21$ b) $y = 2x + 32$ c) $y = \frac{1}{3}x - 8\frac{2}{3}$ d) $y = -\frac{3}{4}x - 18$

6.18. a) $y = -3x + 28$ b) $y = 10x - 15$ c) $y = -\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$ d) $y = \frac{1}{5}x - \frac{4}{5}$

6.19. a) 45° b) 60° c) 120° d) 135° e) 150° f) 30°

6.20. a) ok. 50° b) ok. 112° c) ok. 108° d) ok. 79°

6.21. a) $k: y = -x$ b) $k: y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 6$ c) $k: y = -\sqrt{3}x + 4\sqrt{3}$

d) $k: y = x - 7$ e) $k: y = \sqrt{3}x + 11$ f) $k: y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + 3\sqrt{2}$

6.22. a) pr. AD: $y = -0{,}5x + 1$, pr. BE: $y = \frac{-7}{2}x + 9$, pr. CF: $y = \frac{1}{4}x - 1$ b) $\left(2\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$

6.23. a) $a = -0{,}5$ b) $a = -1$ c) $a = 2$ d) $a = 10$

6.24. a) $k: y = -2x + 3$

6.25. a) $y = -5$ b) $y = \frac{3}{4}x + 9$ c) $y = -2x + 3$ d) $y = 0{,}125x + 18$

6.26. a) $m = -\frac{1}{3}$ b) $m = 13$ c) $m = 1\frac{1}{4}$ d) $m = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

6.27. a) $k: y = -\frac{1}{2}x + 3$ b) $(2, 2)$

6.28. a) $y = 1{,}5x + 7$ b) $y = x - 3\sqrt{3}$ c) $y = -0{,}25x + 9{,}5$ d) $y = -1\frac{1}{3}x + 4$

6.29. a) pr. AB: $y = \frac{x}{8} - \frac{3}{2}$, pr. BC: $y = -\frac{1}{2}x + 1$, pr. AC: $y = 2x + 6$

6.30. a) $y = 4x - 2$ b) $y = -x - 1$ c) $y = \frac{1}{2}x - 2$ d) $y = -\frac{3}{2}x + 5$

6.31. *wskazówka:* Wykaż, że środek odcinka AB należy do prostej k oraz $k \perp AB$.

6.32. *wskazówka:* Wykaż, że punkt C należy do prostej k oraz $k \perp AB$.

6.33. *wskazówka:* Wyznacz współczynniki kierunkowe prostych AB, BC, DC, AC.

6.34. *wskazówka:* Wyznacz współczynniki kierunkowe prostych AB, BC, DC, AC.

6.35. *wskazówka:* Wystarczy pokazać, że: I. odpowiednie boki są do siebie prostopadłe i mają taką samą długość; albo II. przekątne czworokąta są do siebie prostopadłe, a punkt przecięcia się przekątnych leży w jednakowej odległości od wszystkich wierzchołków czworokąta.

Równanie ogólne prostej

6.36. a) np. $x - 6 = 0$ b) np. $x + 4y - 5 = 0$ c) np. $x + 6y - 7 = 0$

6.37. a) $2x + y - 8 = 0$ b) $y + 4 = 0$ c) $x - y + 5 = 0$ d) $3x + y = 0$

6.38. a) $-5x + 3y + 12 = 0$ b) $x - \sqrt{5} = 0$ c) $-2x + 3y - 2 = 0$ d) $-2x + y + 5 = 0$

6.39. a) 135° b) 60° c) 120° d) 30° e) 90° f) 0°

6.40. a) tak b) nie c) nie d) tak

6.41. a) $m: 3x - 2y + 5 = 0$ b) $m: 4x + 9y - 45 = 0$ c) $m: x + 4 = 0$ d) $m: y - \sqrt{2} = 0$

6.42. a) tak b) tak c) nie d) tak

6.43. a) $m: x + 5y - 9 = 0$ b) $m: x + \sqrt{7} = 0$ c) $m: y - 8 = 0$ d) $m: 2x + 3y + 6 = 0$

6.44. a) $A = \frac{-5}{7}$, $C = 5$ b) $B = -1\frac{1}{3}$, $C = -5$ c) $B = 4$, $C = 0$ d) $A = -2$, $C = -6$

6.45. a) $5x - 2y + 1 = 0$ b) $y - 2 = 0$ c) $x + y - 1 = 0$ d) $x + 3 = 0$

Równanie okręgu

6.46. a) $x^2 + y^2 = 9$ b) $x^2 + (y + 2)^2 = 5$ c) $(x - 4)^2 + y^2 = 6{,}25$

d) $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 2$ e) $(x-3)^2 + (y+2)^2 = \frac{1}{9}$ f) $\left(x+\sqrt{3}\right)^2 + \left(y+\sqrt{2}\right)^2 = 16$

6.47. a) $S(0, 0)$, $r = 1$ b) $S(1, 0)$, $r = 1{,}5$ c) $S(-1, 2)$, $r = 5$ d) $S(-3, -1)$, $r = 9$

6.48. a) $S(1, 2)$, $r = 3$ b) $S(-3, -5)$, $r = 1$ c) $S(4, 0)$, $r = 3$

d) $S\left(0, \sqrt{3}\right)$, $r = 3$ e) $S(1, 3)$, $r = 1$ f) $S(0, -2)$, $r = 3$

6.49. a) $S\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$, $r = 2$ b) $S\left(0, \sqrt{2}\right)$, $r = 2\sqrt{2}$

c) $S\left(\frac{-1}{2}, \frac{1}{4}\right)$, $r = 1$ d) $S(1{,}5; -0{,}5)$, $r = 2$

6.50. Nie; tylko punkt $(3, -1)$ spełnia to równanie.

6.51. a) tylko punkty A, B b) tylko punkty A, C

6.52. a) $x^2 + y^2 = 25$ b) $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$

c) $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 100$ d) $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 72$

6.53.

a)



b)



c)



d)



6.54. a) $(x+3)^2+(y-4)^2=100$ b) $(x-3)^2+y^2=25$
c) $x^2+(y-4)^2=25$ d) $(x-1)^2+(y+4)^2=100$

6.55. a) $(x-3)^2+(y+3)^2=25$ b) $(x-3)^2+(y-2)^2=5$
c) $(x-4)^2+(y-1)^2=100$ d) $(x+2)^2+(y-4)^2=169$

6.56. $S\left(\frac{a}{2},-b\right)$, $r=|a-b|$

Wyznaczanie w układzie współrzędnych punktów wspólnych prostych, okręgów i parabol

6.57. a) (2, 1), (5, 4) b) (2, 4), (−1, −2) c) (−4, 3) d) (2, 3), (4, 8)

6.58. a) (3, 1) b) (3, 3), (7, −1) c) (−7, 3), (−4, −2) d) układ sprzeczny

6.59. a) (−5, 2), (−4, −1) b) (1, 1), (4, 0) c) (2, −1), $\left(3\frac{3}{5},2\frac{1}{5}\right)$ d) (−6, −2)

6.60. a) $(3, 0)$, $\left(-2\frac{2}{5}, -1\frac{4}{5}\right)$; prosta jest sieczną okręgu

b) $(-5, 1)$; prosta jest styczna do okręgu

c) $(-4, -4)$, $(-6, -2)$; prosta jest sieczną okręgu

d) prosta jest rozłączna z okręgiem

6.61. a) $(-2, 2)$, $(1, -1)$ b) nie istnieją punkty wspólne c) $(-3, 2)$, $\left(2,4\frac{1}{2}\right)$ d) $(4, -3)$

6.62. a) $o: (x+3)^2 + y^2 = 10$, $k: x - 3y = -13$, $(-4, 3)$

b) $o: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 13$, $k: y = x - 1$, $\left(\frac{4-\sqrt{22}}{2}, \frac{2-\sqrt{22}}{2}\right)$, $\left(\frac{4+\sqrt{22}}{2}, \frac{2+\sqrt{22}}{2}\right)$

c) $p: y = 2x^2 - 16x + 29$, $k: x + y - 2 = 0$, $(3, -1)$, $\left(4\frac{1}{2}, -2\frac{1}{2}\right)$

d) $p: y = -\frac{1}{2}x^2 - 4x - 5$, $k: 2x + y + 3 = 0$, $(-2, 1)$

Zastosowanie układów równań do rozwiazywania zadań z geometrii analitycznej

6.63. $C(-2, 1)$, *wskazówka:* Punkt C jest punktem wspólnym prostej k i symetralnej odcinka AB.

6.64. a) $y = 4 - x$, $y = 2x - 5$ b) $(3, 1)$ c) $\sqrt{10}$

6.65. b) $(-5, 0)$, $(3, -4)$, $(1, 2)$

6.66. $\left(-\frac{3}{5}, \frac{7}{5}\right)$

6.67. a) $A(4, -4)$, $B(1, 5)$ b) $|AB| = 3\sqrt{10}$

6.68. $A(-4, -3)$, $B(2, 3)$, $o: (x+1)^2 + y^2 = 18$

6.69. a) $D(-2, 1)$ b) $|CD| = 3\sqrt{5}$

6.70. a) $y = 3$, $y = 2x + 1$ b) $(1, 3)$

6.71. a) *wskazówka:* Wykaż, że okrąg i prosta mają tylko jeden punkt wspólny.

b) *wskazówka:* Zauważ, że szukane punkty prostej należą również do okręgu o promieniu 5, współśrodkowego z okręgiem o.

6.72. a) $A(-2, 1)$, $B(3, 6)$ b) $C(-3, 6)$, $D(1, -2)$

6.73. b) $k: y = \sqrt{3}x + 6$ c) $B\left(-\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}\right)$ d) $C\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}\right)$

6.74. $(4, 0)$, $\left(\frac{12+4\sqrt{3}}{3}, 1\frac{1}{3}\right)$, $\left(\frac{12-4\sqrt{3}}{3}, 1\frac{1}{3}\right)$

Test sprawdzający do rozdziału 6.

Nr zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Odpowiedź	B	B	C	A	D	B	A	D	B	C

Nr zadania	11	12	13	14	15
Odpowiedź	A	C	D	A	B

Zadania powtórzeniowe do rozdziału 6.

16. $C(4, -3)$

20. a) $2x - 3y + 40 = 0$ b) $5x + y + 4 = 0$

21. a) $y = \frac{1}{\sqrt{3}}x - 2$ b) $y = -\sqrt{3}x - \sqrt{2}$ c) $y = -x + 8$

22. a) $2x + y - 4 = 0$ b) $x + 3 = 0$

23. $y = -3x + 9$

24. a) $a \in \{-4, 4\}$, jeśli $a = -4$, to k: $y = 2x + 2$, m: $y = 2x - 3$;
jeśli $a = 4$, to k: $y = -2x + 2$, m: $y = -2x + 3$
b) $a = 0$; wówczas k: $y = 2$, m: $2x - 3 = 0$; Nie istnieje postać kierunkowa prostej m.

25. $\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 = 9$; $S\left(\frac{-3}{2}, \frac{5}{2}\right)$, $r = 3$

26. *wskazówka:* I sposób. Zapisz równanie okręgu o danym środku i promieniu. Następnie sprawdź, że punkty A, B, C należą do tego okręgu. II sposób. Wyznacz punkt wspólny symetralnych dwóch dowolnych boków; następnie oblicz promień okręgu.

27. $C(1, 5)$

28. $A(-6, 1)$, $B(-1, 2)$; *wskazówka:* Punkty A i B należą do okręgu o środku w punkcie C i promieniu $\sqrt{13}$.

29. $C(0, 2)$ lub $C(0, 4)$

30. a) $A(-6, 9)$, $B(-1, 4)$

31. a) $(4, -1)$ b) $(1, -2)$, $(5, 6)$

7. Geometria płaska – rozwiązywanie trójkątów, pole trójkąta, pole koła

Twierdzenie sinusów

7.1. a) $\sqrt{3}$ b) 4 c) 2 d) 13

7.2. a) $|AB| = 8\sqrt{3}$ cm b) $|AC| \approx 10{,}6$ cm

7.3. a) $|AC| \approx 5{,}9$ cm b) $|AB| \approx 5{,}3$ cm

7.4. a) $b = 32$ cm b) $c \approx 13{,}9$ cm

7.5. a) 6 cm b) 9 cm c) $10\frac{5}{6}$ cm d) 8,5 cm

7.6. a) $R = 5$ cm b) $a = 24$ cm c) $c \approx 5$ cm d) $b \approx 14{,}14$ cm

7.7. $(|\sphericalangle B| = 60°, |\sphericalangle C| = 90°)$ lub $(|\sphericalangle B| = 120°, |\sphericalangle C| = 30°)$

7.8. $(|\sphericalangle B| = 105°, |\sphericalangle C| = 45°)$ lub $(|\sphericalangle B| = 15°, |\sphericalangle C| = 135°)$

7.9. a) 120°, 30°, 30° b) $6 + 4\sqrt{3}$

7.10. a) 120° b) $R = \sqrt{6}$

Twierdzenie cosinusów

7.12. a) $3\sqrt{13}$ b) $2\sqrt{5}$

7.13. $\cos\alpha = \frac{53}{80}$, $\cos\beta = \frac{25}{32}$, $\cos\gamma = -\frac{1}{20}$; trójkąt rozwartokątny

7.14. a) trójkąt ostrokątny; $\alpha \approx 86°$ b) trójkąt rozwartokątny; $\gamma \approx 110°$ c) trójkąt prostokątny; $\beta = 90°$

7.15. 60°

7.16. 120°

7.17. a) $\sqrt{10}$ cm, $\sqrt{58}$ cm b) $\sqrt{34 + 15\sqrt{3}}$ cm, $\sqrt{34 - 15\sqrt{3}}$ cm

7.18. $|AC| = 3$ cm lub $|AC| = 5$ cm

7.19. a) $|BC| = 4$ cm b) $|BC| = 2\sqrt{6}$ cm

7.20. Jeśli $|\sphericalangle ACB| < 90°$, to obwód jest równy 16 cm. Jeśli $|\sphericalangle ACB| > 90°$, to obwód jest równy $2\left(5 + \sqrt{17}\right)$ cm

7.21. 9

7.22. $6{,}5\sqrt{2}$ cm

7.23. $|CD| = 7$ cm, $|BE| = 2\sqrt{19}$ cm

7.24. a) $|CD| = \frac{3\sqrt{46}}{2}$ cm b) $R = \frac{12\sqrt{322}}{35}$ cm

7.25. $|CD| = 7$ cm; *wskazówka:* Niech punkt D będzie środkiem odcinka CE. Oblicz długość przekątnej CE w równoległoboku $AEBC$.

Zastosowanie twierdzenia sinusów i twierdzenia cosinusów do rozwiązywania zadań

7.26. $(|AC| = |BC| \approx 16{,}17, |\sphericalangle A| = |\sphericalangle B| \approx 72°, |\sphericalangle C| \approx 36°)$ lub $(|AC| = |BC| \approx 5{,}25, |\sphericalangle A| = |\sphericalangle B| \approx 18°, |\sphericalangle C| \approx 144°)$

7.27. a) $|AB| \approx 96$, $|\sphericalangle B| \approx 48°$, $|\sphericalangle C| \approx 83°$

b) $(|AB| \approx 91{,}34, |\sphericalangle B| \approx 51°, |\sphericalangle C| \approx 80°)$ lub $(|AB| \approx 3{,}24, |\sphericalangle B| \approx 129°, |\sphericalangle C| \approx 2°)$

7.28. a) $|AB| \approx 89\sqrt{3}$, $|\sphericalangle A| = 90°$, $|\sphericalangle C| = 60°$

b) $(|AB| \approx 177{,}57, |\sphericalangle A| \approx 64°, |\sphericalangle C| \approx 86°)$ lub $(|AB| \approx 99{,}54, |\sphericalangle A| \approx 116°, |\sphericalangle C| \approx 34°)$

7.30. a) $(\alpha = 60°,\ \gamma = 75°,\ c = \sqrt{3}+1)$ lub $(\alpha = 120°,\ \gamma = 15°,\ c = \sqrt{3}-1)$ b) $\beta = 30°$, $\gamma = 105°$, $c = \sqrt{3}+1$ c) $\gamma = 30°$, $\beta = 90°$, $a = 5\sqrt{3}$, $b = 10$ d) $\alpha = 120°$, $\gamma = 15°$, $b = 3\sqrt{2}$, $c = \frac{3\sqrt{6}-3\sqrt{2}}{2}$

7.31. 41; *wskazówka:* Wykaż, że $|\sphericalangle ADC| = 60°$. Następnie zastosuj twierdzenie cosinusów do wyznaczenia długości boków trójkąta ABC i trójkąta ACD.

7.32. $|AD| = |EB| = \sqrt{3}-1$, $|DE| = 4-2\sqrt{3}$, *wskazówka:* Oznacz $|AD| = x$, $|DC| = y$. Skorzystaj z twierdzenia sinusów w trójkącie ADC i wykaż, że $y = x\sqrt{2}$. Następnie skorzystaj z twierdzenia cosinusów do kąta DAC.

7.34. *wskazówka:* Oznacz: $a = 4x$, $b = 5x$, $c = 6x$, $x > 0$. Następnie oblicz $\cos\beta$ i $\cos\gamma$, korzystając z twierdzenia cosinusów.

7.35. *wskazówka:* Zastosuj twierdzenie cosinusów do trójkąta ADC i do trójkąta DBC.

Pole figury płaskiej

7.36. a) 20,5 b) 15,5 c) 32 d) 20

7.37. a) $s - w + 4t$ b) $\frac{3}{2}w + \frac{1}{2}s + t$ c) $2s + \frac{1}{2}w$ d) $\frac{5}{6}w$

Pole trójkąta, cz. 1

7.38. 3 cm

7.39. a) 12 cm b) $48\sqrt{3}$ cm^2

7.40. $14\frac{14}{29}$ cm

7.41. 156 cm^2

7.42. 6,5 cm, 42 cm, 42,5 cm

7.43. 120 cm^2

7.44. 294 cm^2

7.45. $14\frac{2}{17}$ cm

7.46. a) $|AB| = 20$, $|AC| = |BC| = 5\sqrt{5}$; *wskazówka:* Poprowadź wysokość CD i oznacz $|AB| = 4x$; wówczas $|BC| = \sqrt{5}x$ oraz $|CD| = x$ b) $h_A = 4\sqrt{5}$

7.47. a) *wskazówka:* Wykaż, że $a : b : c = 3 : 4 : 5$, korzystając ze wzoru na pole trójkąta. b) 2,4

7.48. $7\sqrt{3}$ cm^2

7.49. 84 cm^2

7.50. a) 35 cm^2 b) $35\sqrt{3}$ cm^2 c) $35\sqrt{2}$ cm^2

7.51. 30° lub 150°

7.52. a) 150° b) $6\sqrt{10+3\sqrt{3}}$ cm

7.53. a) 7 cm b) $\frac{20\sqrt{3}}{7}$ cm

7.54. a) 5 cm, 5 cm, $3\sqrt{10}$ cm b) $\frac{1}{\sqrt{10}}$

7.55. 8 cm, 10 cm

7.60. a) 30 cm^2 b) 40 cm^2

7.61. 16 cm^2

7.62. a) 5 : 2 oraz 5 : 3 b) 18

7.64. $34\frac{2}{3}$

7.65. $|AB| = 8$ cm

7.67. $84\sqrt{2}$ cm^2

7.68. a) $\frac{24\sqrt{2}}{7}$ b) $\frac{20\sqrt{3}}{9}$

7.69. a) $3-\sqrt{3}$; *wskazówka:* Oznacz $|CD| = x$. Zapisz sumę pól trójkątów ADC i CDB na dwa sposoby. b) $P_{ADC} = 3\sqrt{3}-3$, $P_{CDB} = 9-3\sqrt{3}$

7.70. a) $3\sqrt{3}$ b) *wskazówka:* I sposób: Zauważ, że $P_{ADC} = P_{CDB}$. II sposób: Utwórz równoległobok $AEBC$ i skorzystaj z twierdzenia cosinusów.

Pole trójkąta, cz. 2

7.71. $r = 9$ cm

7.72. 42 cm

7.73. a) $4{,}5\left(1+\sqrt{3}\right)$ cm^2 b) $r = \frac{3\left(1+\sqrt{3}\right)}{3+\sqrt{2}+\sqrt{3}}$ cm $\approx 1{,}3$ cm

7.74. a) 32 cm b) $r = 3$ cm

7.75. a) 14 cm, 25 cm, 25 cm b) kąt α jest ostry (dlaczego?); $\sin\alpha = \frac{336}{625}$, więc $\frac{1}{2} < \sin\alpha < \frac{\sqrt{2}}{2}$ stąd $30° < \alpha < 45°$

7.76. 11,2 cm

7.77. a) 17 cm b) $R = 9\frac{19}{30}$ cm

7.78. a) 192 cm^2; *wskazówka:* Oznacz długość ramienia przez $5x$; wówczas podstawa ma długość $2 \cdot 4x$, stąd $8x = 32$ c) $R = 16\frac{2}{3}$ cm

7.79. a) 24 cm b) $r = 4$ cm

7.80. a) 34 cm b) $r = 7$ cm

7.81. a) $\frac{84}{85}$ b) 28 cm; *wskazówka:* Oblicz cosinus kąta między ramionami i skorzystaj z twierdzenia cosinusów c) $R = 14\frac{1}{6}$ cm

7.82. a) 60° b) 7 c) $R=\frac{7\sqrt{3}}{3}$ d) $r=\frac{2\sqrt{3}}{3}$

7.83. $25\left(2+\sqrt{3}\right)$; *wskazówka:* Oblicz najpierw długość najdłuższego boku, korzystając z twierdzenia sinusów. Następnie skorzystaj z twierdzenia cosinusów do wyznaczenia kwadratu długości ramienia.

7.84. $\frac{75\sqrt{3}}{4}$

7.85. a) $84\ \text{cm}^2$ b) $r=3{,}5\ \text{cm}$ c) $R=10\frac{5}{8}\ \text{cm}$

7.86. a) 33,6 cm; 15 cm; $21\frac{7}{13}\ \text{cm}$ b) $\frac{5}{13}$ c) $R=32{,}5\ \text{cm}$

7.87. a) $32\sqrt{2}\ \text{cm}^2$ b) $r=2\sqrt{2}\ \text{cm}$; *wskazówka:* Skorzystaj z twierdzenia o odcinkach stycznych.

7.88. a) $P_1=14{,}4\ \text{cm}^2$, $P_2=9{,}6\ \text{cm}^2$ *wskazówka:* Oblicz długości odcinków, na jakie prosta podzieliła przeciwprostokątną b) $r_1:r_2=3:2$

Pola trójkątów podobnych

7.89. $6\ \text{cm}^2$

7.90. 11 cm

7.91. a) 25 : 64 b) 1 : 4 c) 4 : 25 d) 1 : 9

7.92. a) 4 : 25 : 36 b) 4 : 21 : 11

7.93. 1 : 3 : 5

7.94. $|A_1B_1|=14\ \text{cm}$, $|AB|=21\ \text{cm}$

7.95. 1 : 3 : 4

7.96. 24; *wskazówka:* Poprowadź wysokość CD i oblicz pola trójkątów ADC oraz DBC.

7.97. a) $12\ \text{cm}^2$ b) $288\ \text{cm}^2$

7.98. $11\frac{23}{27}\ \text{cm}^2$

7.99. $21\frac{1}{3}\ \text{cm}^2$

7.100. $|DB|=5\ \text{cm}$, $|BE|=4\ \text{cm}$, $|DE|=3\ \text{cm}$

7.101. 36%

7.102. 5 : 4

7.103. $300\ \text{cm}^2$

7.104. $6\ \text{cm}^2$

7.105. a) 25 cm b) $P_{AEC}=250\ \text{cm}^2$, $P_{EDB}=40\ \text{cm}^2$ c) 30°

Pole koła, pole wycinka koła

7.106. a) $\frac{5}{8}$ b) $\frac{3}{4}$

7.108. $4{,}5\pi\ \text{cm}^2$ b) $60\pi\ \text{cm}^2$ c) $3{,}75\pi\ \text{cm}^2$

7.109. a) 8 cm b) 5 cm c) 30 cm

7.110. a) $\pi - 2$ b) $3\pi - 2{,}25\sqrt{3}$ c) $15\pi - 9$

7.111. 36 cm

7.112. $\frac{2-\sqrt{3}}{2}$

7.113. 9π cm^2

7.114. a) $\left(3+2\sqrt{2}\right)\pi$ cm^2 b) $\left(7+4\sqrt{3}\right)\pi$ cm^2

7.115. 6π cm^2; *wskazówka:* Wykaż, że $\frac{\alpha}{2}=30°$.

7.116. $2\left(3\sqrt{3}+2\pi\right)$ cm^2

7.117. $\frac{\left(4-3\sqrt{3}\right)r^2}{6}$; *wskazówka:* Niech O_1 i O_2 będą środkami kół; A – jednym z punktów przecięcia się okręgów. Zauważ, że trójkąt O_1O_2A jest równoboczny.

7.118. $\frac{5\pi-3\sqrt{3}}{\pi+3\sqrt{3}}$

7.119. 45

Zastosowanie pojęcia pola w dowodzeniu twierdzeń

7.120. *wskazówka:* Przedstaw pole trójkąta ABC na dwa sposoby: $P = \frac{|AB|\cdot|AC|}{2}$ oraz $P = P_{ABM} + P_{CAM}$.

7.121. Rozpatrz dwa przypadki: krótszy bok zawiera się w boku długości b albo w boku długości a. Przedstaw pole trójkąta jako sumę pól odpowiednich trójkątów. $\frac{ab}{2a+b} < \frac{ab}{a+2b}$, więc $\frac{ab}{2a+b}\cdot\frac{2ab}{2a+b} < \frac{ab}{a+2b}\cdot\frac{2ab}{a+2b}$

7.122. *wskazówka:* Przedstaw pole trójkąta ABC jako sumę pól trójkątów AMC i MBC.

7.123. *wskazówka:* Wykorzystaj zależności: $a=\frac{2P}{h_a}$, $b=\frac{2P}{h_b}$, $c=\frac{2P}{h_c}$

7.124. *wskazówka:* Wykorzystaj własność: środkowa w trójkącie dzieli trójkąt na dwa trójkąty o równych polach. Następnie skorzystaj ze wzoru na pole trójkąta: w punkcie a) do trójkątów ABC i ADC, w punkcie b) do trójkątów ADC i DBC.

7.126. *wskazówka:* Przedstaw iloraz pól trójkątów ADC i DBC na dwa sposoby.

Test sprawdzający do rozdziału 7.

Nr zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Odpowiedź	**B**	**C**	**C**	**A**	**B**	**D**	**C**	**B**	**C**	**D**	**C**	**B**	**D**	**A**	**A**

Zadania powtórzeniowe do rozdziału 7.

16. $\alpha = 45°, \beta = 120°, \gamma = 15°$

17. a) $(\alpha = 60°, \gamma = 75°, c = \sqrt{3}+1)$ lub $(\alpha = 120°, \gamma = 15°, c = \sqrt{3}-1)$ b) $\beta = 30°$, $\gamma = 105°$, $c = \sqrt{3}+1$ c) $\gamma = 30°, \beta = 90°, a = 5\sqrt{3}, b = 10$ d) $\alpha = 120°, \gamma = 15°$, $b = 3\sqrt{2}$, $c = \frac{3\sqrt{6}-3\sqrt{2}}{2}$

18. $10, 10, 10\sqrt{2-\sqrt{2}}$

19. a) 30°, 30° b) 8 cm c) $8\sqrt{7}$ cm

20. 12 cm

21. $r = 6$ cm

22. a) 126 cm^2 b) $\frac{63}{65}$ c) $r = 4\frac{2}{3}$ cm d) $R = 10\frac{5}{6}$ cm

23. a) 7 b) $h = \frac{20\sqrt{3}}{7}$ c) $d = \frac{40\sqrt{3}}{13}$ d) $s = \frac{\sqrt{129}}{2}$

24. a) 17 cm b) $r = 6$ cm

25. a) $c = 9$ cm b) $\sin\alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}$, $\sin\beta = \frac{8\sqrt{5}}{21}$, $\sin\gamma = \frac{3\sqrt{5}}{7}$

28. $10\sqrt{5-2\sqrt{3}}$

29. $12\sqrt{3}$ cm^2

30. 60 cm^2

31. $\frac{25}{64}$

32. 4 cm; *wskazówka:* Wykaż, korzystając z własności kątów wpisanych w koło, że trójkąt EBD jest podobny do trójkąta ACE. Skala tego podobieństwa jest równa 3, więc $|EB| = 3 \cdot |CE|$.

33. a) $r = 8$ cm b) 225°

34. a) $|DB| = 4{,}5$ cm b) $\frac{9}{16}(4-3\sqrt{3})$ cm^2

8. Wielomiany

Wielomiany jednej zmiennej rzeczywistej

8.1. Wielomiany są w przykładach: a, b, e, g, h, i.

8.2. a) 8 b) 17 c) 48 d) 21

8.3. a) 3 b) 6 c) 5 d) 3

8.4. a) $F(x) = 10 - x^2 + 8x^4$; st. $F(x) = 4$; $a_0 = 10$, $a_1 = 0$, $a_2 = -1$, $a_3 = 0$, $a_4 = 8$
d) $W(x) = x^2$, st. $W(x) = 2$; $a_0 = 0$, $a_1 = 0$, $a_2 = 1$

8.5. a) $F(x) = -5x^4 + 5x^2 - 4x - 3$; st. $F(x) = 4$; $a_4 = -5$, $a_3 = 0$, $a_2 = 5$, $a_1 = -4$, $a_0 = -3$
b) $G(x) = 8$; st. $W(x) = 0$; $a_0 = 8$

8.7. a) $W(-3) = 56$, $W(-1) = -2$, $W(4) = -7$, $W(5) = -32$
b) $W(\sqrt{2}+1) = 3\sqrt{2}+5$, $W(\sqrt{3}-\sqrt{2}) = 2\sqrt{6}+9\sqrt{3}-11\sqrt{2}-4$

8.8. a) np. $W(x) = 3x^5 + x^2 + 8$ b) np. $W(x) = x^4 + \sqrt{2}\,x^3$

8.9. a) 0 b) -1 c) 1 d) -32

8.10. $a = 2$

8.11. $a = 4$, $b = 1$

8.12. $a = -3$, $b = -5$

8.13. $b = 4$

8.14. $a = 0$

8.15. $a = 7$, $b = -3$

8.16. $a = -2$ lub $a = 1\frac{1}{2}$

8.17. $(a = 4 \text{ i } b = 12)$ lub $(a = -3 \text{ i } b = 12)$

Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów

8.18. a) $-x^5 + 2x^3 + x^2 - 2$ b) $12x^5 + x^4 - 4x^3 - x + 1$ c) $-4x^2 + 2x + 3$ d) $-2x^3$

8.19. a) $-x^6 + 6$ b) $8x^3 + 0{,}1x$ c) $-2x^6 + \sqrt{2}x^5 + 2\sqrt{2}x^3 + 4x + 1$
d) $(\sqrt{2}-1)x^4 + (1-3\sqrt{3})x^3 + (4-\sqrt{3})x^2 + 1 + \sqrt{2}$

8.20. a) $3x^6 + x^4 - 2x^2 - 2x + 1$ b) $-4x - 14$ c) $-3x^2 + 2x + 6$ d) $4x^7 - 6x^3$

8.21. d) $F(x) = -3x^4 + 7x^3 - 2x^2 - 3x + 1$ e) $F(x) = -3x^5 - 5x^4 + 14x^3 + 5x^2 - 3x$
f) $F(x) = -6x^5 + 8x^4 + 13x^3 - 14x^2 - 6x + 3$

8.22. a) $2x^4 - 4x^3 + 10x^2 + 3x - 14$ b) $6x^3 + 2x^2 - x + 2$
c) $x^4 - 5x^3 + 4x^2 + 2x - 8$ d) $x^4 - 5x^3 - 4x - 8$

8.23. a) $3x^5 + 4x^3 - 3x^2 - 4x + 2$ b) $4x^5 - 3x^4 + 9x^3 - 10x^2 + 5x - 1$
c) $36x^6 - 27x^5 - 39x^4 + 36x^3 + 4x^2 - 12x + 4$
d) $3x^8 + 10x^6 - 6x^5 + 4x^4 - 8x^3 - 5x^2 + 8x - 2$

8.24. a) $x^{12} - x^{11} - x^9 + x^8$ b) $x^{16} + x^{15} - x^4 - x^3$
c) $x^{12} - x^{11} + x^{10} - x^9 - x^5 - x^3$ d) $x^9 - x^8 - x^7 + x^4 - x^3 - x^2$

8.25. a) $9x^4 - 16x^2$ b) $25x^6 - 60x^4 + 36x^2$ c) $9x^{14} + 12x^8 + 4x^2$ d) $81x^{14} - x^6$

8.26. a) $-4x^3 - 4x$ b) $-12x^3 - 8x$ c) $10x^4 + 2x^3 + 7x^2 + 1$ d) $5x^4 - 4x^3 + 25x^2$

8.27. a) $x^7 - x^5 + 3x^4 + x^3 - 5x^2 - 6x + 1$ b) $3x^7 + 6x^5 - x^4 - 3x^3 - 12x^2 + 17x + 5$
c) $x^5 + 12x^4 + 24x^3 + 6x + 2$ d) $9x^3 + 6x^2 + 2x - 5$

8.28. a) st. $W(x) = 13$; $a_0 = -125$, $a_{13} = -24$ b) st. $W(x) = 10$; $a_0 = 8$, $a_{10} = 12$
c) st. $W(x) = 6$; $a_0 = -5$, $a_6 = 18$ d) st. $W(x) = 20$, $a_0 = 0$, $a_{20} = -18$

Równość wielomianów

8.29. Wielomiany są równe w punktach: a), b), d).

8.30. a) $a=-2$ b) nie istnieje c) nie istnieje d) $a=-2$

8.31. a) $a=3$ b) $a=2$ c) $a=-3$ d) $a=1$

8.32. a) $a=1, b=3$ b) nie istnieją; *wskazówka:* $(2ax-b)^3=(2ax-b)^2(2ax-b)$
c) $a=2, b=3$ d) $a=-1, b=2$

8.33. a) $a=-5, b=-5$ b) $a=-3, b=1$

8.34. a) $a=2, b=-3$ b) $a=-1, b=3$

8.35. a) $b=2, c=4$ b) $b=5, c=1$

Wzory skróconego mnożenia stopnia 3. Wzór na a^n-b^n

8.36. a) $y^3+3y^2z+3yz^2+z^3$ b) $8+12a+6a^2+a^3$ c) $1+9x+27x^2+27x^3$
d) $4+3\sqrt[3]{9}+3\sqrt[3]{3}$ e) $125-75b+15b^2-b^3$ f) $x^3-12x^2+48x-64$
g) $8x^3-36x^2+54x-27$ h) $-1-3\sqrt[3]{2}+3\sqrt[3]{4}$

8.37. a) $10-6\sqrt{3}$ b) $44+18\sqrt{6}$ c) $62\sqrt{2}-55$ d) $200\sqrt{2}+102\sqrt{6}$
e) $10+12\sqrt[3]{2}+6\sqrt[3]{4}$ f) $-12-9\sqrt[3]{3}-9\sqrt[3]{9}$ g) $12-24\sqrt[3]{2}+12\sqrt[3]{4}$
h) $205+30\sqrt[3]{5}+60\sqrt[3]{25}$

8.38. a) x^3+a^3 b) $27+x^3$ c) y^3+64 d) $8-y^3$ e) x^3-125 f) $2\sqrt{2}-z^3$

8.39. a) 3 b) 17 c) 5 d) -7

8.40. a) $3x^2-9x+7$ b) $3x^3+18x+6$ c) $3x^2-3x+2$ d) $2x^3-9x^2-27x-51$
e) $2x^3+12x^2+48x$ f) $2x^3$

8.41. a) $x^3+9x-25$ b) $-6x^3-39x^2+38x-25$ c) $7x^3-9x^2+15x-2$
d) $-4x^2$ e) x^6+7x^2 f) $26x^3-39x^2+33x-20$

8.42. a) $x\in\left\{-2\frac{5}{7},2\right\}$ b) $x\in\left\{-1,-\frac{5}{8}\right\}$ c) $x\in\left\{-1,5\frac{1}{9}\right\}$ d) $x\in\{-19,-1\}$

8.43. a) $x\in(-\infty,-5)\cup(5,+\infty)$ b) $x\in(-\infty,-1\rangle\cup\langle-2,+\infty)$
c) $x\in\langle-1,4\rangle$ d) $x\in(-2,8)$

8.44. a) $(x-1)^3$ b) $(x+6)^3$ c) $(3-y)^3$ d) $(2x+3y)^3$ e) $(1+2x)^3$ f) $(1-5y)^3$

8.45 a) $(y+2)(y^2-2y+4)$ b) $(1-x)(1+x+x^2)$ c) $(3z-1)(9z^2+3z+1)$
d) $(2k-5)(4k^2+10k+25)$ e) $(4+3y)(16-12y+9y^2)$
f) $(5a+6)(25a^2-30a+36)$ g) $\left(\sqrt{5}+x\right)\left(5-\sqrt{5}x+x^2\right)$ h) $\left(y-\sqrt{2}\right)\left(y^2+\sqrt{2}y+2\right)$

8.46. a) $\frac{2\sqrt[3]{9}}{3}$ b) $\frac{\sqrt[3]{4}}{6}$ c) $\frac{2\sqrt[3]{25}}{5}$ d) $\frac{4+2\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}}{2}$ e) $\frac{9-3\sqrt[3]{5}+\sqrt[3]{25}}{16}$
f) $\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{3}$ g) $\frac{4-\sqrt[3]{2}}{31}$ h) $\frac{9-9\sqrt[3]{3}+\sqrt[3]{9}}{12}$

Podzielność wielomianów

8.67. *wskazówka:* Skorzystaj z poznanych wzorów skróconego mnożenia.
8.68. *wskazówka:* Przedstaw trójmiany kwadratowe w postaci iloczynowej.
8.70. a) $(x+1)(x-3)$
8.71. np. $6x(4-x)(x+2)$, $x^2(x+2)$, $x^2(4-x)$
8.73. *wskazówka:* Zapisz trójmian kwadratowy $P(x)$ w postaci iloczynowej.
8.74. *wskazówka:* Zapisz trójmian kwadratowy $P(x)$ w postaci iloczynowej.
8.76. *wskazówka:* $P(x) = (x+2)^3$
8.77. a) $P(x) = -3x + 4$ b) $P(x) = 3x + 4$ c) $P(x) = -x + 1$
8.78. $a = -7,\ b = 2$
8.79. $a = 5,\ b = 2$
8.80. $a = 10,\ b = 3$
8.81. $P(x) = 3x - 2$
8.82. $P(x) = 2x - 3$
8.83. $P(x) = 4x^2 - 20x + 21$
8.84. $Q(x) = x^2 - 6x + 36$
8.85. $Q(x) = 6x^2 - 7x - 3$
8.86. a) $Q(x) = x^3 + 1$ b) $Q(x) = x^2 - x + 1$

Dzielenie wielomianu przez dwumian liniowy. Schemat Hornera

8.87. a) $x^2 - 2x + 4$ b) $x^2 - 4x + 7$ c) $x^2 - x + 1$ d) $x^3 + 6x^2 - 6x - 1$
8.88. a) $100x^2 - 80x + 15$ b) $38x^2 - 12x - 2$ c) $16x^3 + 4x^2 - 8x + 4$ d) $2x^4 - 2$
8.89. a) $x^3 - 6x^2 + 3x + 2$ b) $3x^3 + 2x - 1$ c) $x^3 + 8x + 4$ d) $x^3 + 4$
8.90. a) $3x - 8,\ r = 17$ b) $-2x^2 - 2x + 2,\ r = -1$ c) $4x^3 - 4x^2 + 7x - 13,\ r = 16$
d) $-3x^3 - 7x^2 - 21x - 63,\ r = -185$ e) $x^4 - 3x^3 + 13x^2 - 41x + 123,\ r = -368$
f) $x^5 + 2x^4 + x^3 + 2x^2 + 6x + 12,\ r = 25$
8.91. a) $x^2 + 3x + 4$ b) $x^2 + x + 1$ c) $3x^2 + 2x + 3$ d) $2x^2 + x + 5$
8.92. a) $3x^3 + 2x + 1$ b) $2x^3 + 4x^2 + 6$ c) $3x^3 + 6x + 9$ d) $5x^3 + 10x^2 + 5$
8.93. a) $x^2 + x - 2$ b) $2x^2 - 4x + 9$ c) $-x^2 + x + 3$
d) $5x^2 + 10x + 13$ e) $2x^3 + 2x^2 + 2x - 3$ f) $-3x^3 + 3x^2 - x + 1$
8.94. a) $3,\ r = -7$ b) $-4,\ r = -27$ c) $x^2 - 2x + 4,\ r = -9$ d) $3x^3 + 6x^2 + 12x + 22,\ r = 52$
e) $5x^4 + 5x^3 + 7x^2 + 7x + 7,\ r = 14$ f) $-2x^4 + 6x^3 - 14x^2 + 42x - 126,\ r = 384$
8.95. a) $2x^5 + 2x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 5x + 5,\ r = -10$ b) $-3x^3 - 6x^2 - 12x - 22,\ r = -28$
c) $x^4 - x^3 + x^2 - x + 1,\ r = 0$ d) $x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1,\ r = 0$
e) $x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1,\ r = 2$ f) $x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1,\ r = 0$
8.96. a) -9 b) 7 c) 10 d) -17
8.97. a) $r = -18$
8.98. $m = -1$ lub $m = 4$
8.99. $m = -3$ lub $m = -2$
8.100. $a \in (-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$
8.101. $a \in \left(-1, 1\frac{1}{2}\right)$

Pierwiastek wielomianu. Twierdzenie Bezouta

8.102. a) tak b) tak c) nie d) tak

8.103. a) 3 b) $-\sqrt{3}, \sqrt{3}$

8.104. a) st. $W(x) = 6$; pierwiastki: 2, $2\frac{1}{2}$ b) st. $W(x) = 6$; pierwiastki: $-5, -2, -\frac{2}{9}, \frac{2}{9}, 3$

c) st. $W(x) = 7$; pierwiastki: $0, \frac{1}{3}$ d) st. $W(x) = 6$; pierwiastki: $-3, 3$

8.105. b) np. $W(x) = x^2(x^2 - 5)(x^2 - 3)$ d) np. $W(x) = (x + 2)^2(x^4 + 3)$

8.106. a) tak b) tak c) nie d) tak

8.107. a) $k = -2$ b) $k = 1$ c) $k = -\frac{2}{3}$ lub $k = \frac{1}{2}$ d) $k = -2$ lub $k = \frac{1}{3}$.

8.108. a) $-6, -1, \frac{1}{3}$ b) 4 c) $-3, 1, 3\frac{1}{2}$ d) $-1, -\frac{1}{4}, 2$ e) $-2, 3$ f) 1

8.109. a) 5 b) $-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}$ c) $-1, \frac{1}{2}$ d) nie istnieją inne pierwiastki

8.110. a) $-1, 1$ b) nie istnieją inne pierwiastki c) $-3, 1, 3$ d) $-4, 4$

8.111. a) $a = -2$; pozostałe pierwiastki: $-2, -1$ b) $a = 3$; pozostałe pierwiastki: $\frac{2}{3}, 3$

8.112. a) $a = -7$; pierwiastki: $-2, -\frac{1}{4}, 1$ b) $a = 3$; pierwiastki: $-3, -2, \frac{1}{2}$

8.113. a) $a = 2, b = 1; x^3 = -1$ b) $a = 1, b = -4; x^3 = -2$

8.114. a) $a = 0, b = 7$; pierwiastki: $-3, 1, 2$ b) $a = 8, b = 4$; pierwiastki: $-4, \frac{1}{3}, 1$

Pierwiastki wymierne wielomianu

8.117. a) $-3, -2, 1$ b) 2 c) $-1, 1$ d) $-2, -1$ e) $-3, -2, 1, 3$ f) $-4, 1$

8.119. *wskazówka:* Wskaż trzy liczby całkowite, które są pierwiastkami wielomianu $W(x)$ i powołaj się na własność: Wielomian stopnia 3. może mieć co najwyżej trzy pierwiastki.

8.120. a) $-2, 2$; *wskazówka:* Wyznacz pierwiastki wielomianu $Q(x) = 4 \cdot W(x)$ b) $-3, 1, 2$ c) -4 d) $-4, -2, 1, 3$

8.121. a) 2 b) $-2, -1, \frac{1}{3}$ c) $-3, 4$ d) $-4, 2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}$

e) 2 f) 1 g) $-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 2$ h) $-\sqrt{3}, 1, \sqrt{3}$

8.122. pierwiastki całkowite wielomianu $W(x)$: $2, -1$

8.123. *wskazówka:* Liczba 3 to jedyna liczba pierwsza, która jest dzielnikiem liczby -12.

8.124. a) $a = -5, b = 7$

8.125. $a = 5$; pierwiastki: $-1, 1, 5$; *wskazówka:* Pierwiastki całkowite wielomianu $W(x)$ znajdują się wśród liczb: $-1, 1, 5, -5$. Sprawdź, że tylko liczby $-1, 1, 5$ spełniają warunki zadania.

Rozkładanie wielomianów na czynniki

8.126. a) $(5x-1)(5x+1)(25x^2+1)$ b) $(x-1)^2(x+1)^2$ c) $-(5x^2+2)(5x^2+2)$
d) $(3x-2)(3x+2)(9x^2+4)$ e) $-3(x+5)(x-1)$ f) $(x-6)(5x+4)$

8.127. a) $-1(x-1)(x-1)(x-1)$, czyli $-(x-1)^3$ b) $(2x+3)^3$
c) $(1+2x)(1-2x+4x^2)$ d) $(6x-5)(36x^2+30x+25)$
e) $-(x+5)(7x^2-20x+25)$ f) $(x-1)(19x^2+7x+1)$

8.128. a) $x^2(2x-1)^2$ b) $(x^2+2)(7x-3)$ c) $(3x^2+1)(x-4)$
d) $(5x-1)\left(\sqrt{7}-x\right)\left(\sqrt{7}+x\right)$ e) $x(2x-5)(x-3)$ f) $(x-4)(x+3)^2$

8.129. a) $5(x-1)^2(x-0{,}4)$ b) $2(x-2)(x+2)(x-0{,}5)$ c) $-1(4x-1)(x-1)^2$
d) $-(x+5)(x+1)(x-2)$ e) $-x(x+1)^2$ f) $(x-3)(x^2+2x-3)$

8.130. a) $(x+y)(a+b)$ b) $(a+b)(x-y)$ c) $(x-y)(c-a)$
d) $(x-y)(x+a)$ e) $(2x+y)(y-1)$ f) $(3a-b)(c+1)$

8.131. a) $(x+3)(x-2)(x+2)$ b) $(7x+2)\left(x-\sqrt{3}\right)\left(x+\sqrt{3}\right)$ c) $(x-2)(3x^2+4)$
d) $(x-1)(x^2+1)$ e) $(x+1)(2x-1)(2x+1)$ f) $(x+2)(1-3x)(1+3x)$

8.132. a) $(9x-4)\left(x-\sqrt{3}\right)\left(x+\sqrt{3}\right)$ b) $(5x-4)(x-1)(x+1)$
c) $4(x+1)(2x-1)(2x+1)$ d) $9(x-1)(x+1)(2x+1)$
e) $(3x-7)(x-3)(x+3)$ f) $(2x+3)(5x^2+4)$

8.133. a) $(3x+4)(2-x)(2+x)$ b) $(2x-3)(2x+3)(5x+3)$
c) $(1-2x)(2x^2+3)$ d) $(3x+8)\left(1-\sqrt{2}x\right)\left(1+\sqrt{2}x\right)$
e) $x(x-1)(x+1)(2x+3)$ f) $x\left(x-\sqrt{5}\right)\left(x+\sqrt{5}\right)(3x-1)$

8.134. a) $(x+2)(x-1)(x^2+x+1)$ b) $(x+3)(2x+1)(4x^2-2x+1)$
c) $(x-1)(x-3)(x^2+3x+9)$ d) $(x-1)(5x-2)(25x^2+10x+4)$
e) $(x+1)(2x-1)(4x^2+2x+1)$ f) $(3x+2)(x-2)(x^2+2x+4)$

8.135. a) $(x+2)(x-2)$ b) $(x-3)(x-1)$ c) $(x-7)(5x^2+2)$
d) $(3x-4)(x^2-3x+4)$ e) $(2x+3)(7-4x)$ f) $(2+x)(4x+9)$

8.136. a) $(x-1)(x+1)(x^2+2)$ b) $(x+5)^2(3x+14)$ c) $(x+4)^2(x-1)(x+1)$
d) $(x-2)(x+2)(2-x)$ e) $(x-2)(2x^2-x+5)$ f) $(3x+1)(11x^2+3x+6)$

8.137. a) $(x+2)(2x-1)(x-1)$ b) $(x-1)(x^2+x+4)$ c) $(x+1)(x+2)(3x-1)$
d) $(x-1)^2(x-5)$ e) $(2x-3)(x+2)(x-1)$ f) $(x+1)(x+3)(3x-1)$

8.138. a) $(x-1)(x+2)(x+3)$ b) $2x^3(x-1)^2(x+1)^2$ c) $(2-4x)(16x^2+20x+13$
d) $(x+3)^2(x-2)$ e) $x(5x-2)(x+1)^2$ f) $(3\sqrt{2}\,x-1)(x-3)(x+3)$

8.139. a) $(x+3)(x+5)^2$ b) $4(2x-3)(x-2)^2$ c) $8(4x-5)(x-2)(2x-1)$
d) $2(x-2)^2(x-4)$ e) $(x-3)(37x^2+9x+3)$ f) $(2x+3)(2x+1)(2x+5)$

8.140. a) $(x-1)(x+1)(2x^2+1)$ b) $(x+3)(x+1)(1-x)(x-3)$
c) $(x+1)(x-2)(x^2-x+1)(x^2+2x+4)$ d) $x^3(x-6)$
e) $(1-x)(x+1)(x-2)(x+2)$ f) $x(x-1)(x+2)(x+3)$

Równania wielomianowe

8.141. a) $x = 2$ b) $x = -4$ c) $x = -1$ d) $x \in \left\{-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right\}$

e) $x \in \{-2, 2\}$ f) równanie sprzeczne

8.142. a) $x \in \left\{-5, 1\frac{1}{2}, 4\right\}$ b) $x \in \left\{2-\sqrt{3}, 2, 2+\sqrt{3}\right\}$ c) $x \in \left\{-3-\sqrt{7}, -3+\sqrt{7}, 0, \frac{1}{2}\right\}$

d) $x \in \left\{-1\frac{2}{3}, -1\frac{1}{5}, 1\frac{2}{3}\right\}$ e) równanie sprzeczne f) $x \in \left\{-4, -3, -\sqrt{2}, \sqrt{2}, 4\right\}$

8.143. a) $x \in \left\{-2, -\sqrt{3}, \sqrt{3}, 2\right\}$ b) $x \in \left\{-\sqrt{5}, 0, \sqrt{5}, 3\right\}$ c) $x \in \{-3, 3, 4\}$

d) $x \in \left\{0, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right\}$ e) $x \in \{0, 1\}$ f) $x \in \left\{-2, -\frac{1}{3}\right\}$

8.144. a) $x \in \{-1, 1\}$ b) $x \in \left\{-2, \frac{1}{2}, 2\right\}$ c) $x = 2$

d) $x \in \{-1, 1, 5\}$ e) $x \in \left\{-4, \frac{1}{2}, 4\right\}$ f) $x \in \left\{-\sqrt{2}, -\frac{1}{3}, \sqrt{2}\right\}$

8.145. a) $x \in \{0, 3\}$ b) $x \in \left\{-1, \frac{2}{3}, 1\right\}$ c) $x \in \left\{-1, \frac{1}{3}, 3\right\}$

d) $x \in \left\{-4, -\sqrt{5}, 0, \sqrt{5}\right\}$ e) $x \in \{-2, 1, 2\}$ f) $x \in \left\{-\sqrt{2}, -1, 0, \sqrt{2}\right\}$

8.146. a) $x \in \{-2, 2\}$ b) równanie sprzeczne c) $x \in \{-1, 2\}$

d) $x \in \left\{-2\sqrt{2}, -1, 1, 2\sqrt{2}\right\}$ e) $x \in \left\{\frac{-1}{\sqrt[3]{10}}, \frac{1}{2}\right\}$ f) $x \in \left\{\frac{1}{\sqrt[3]{5}}, \frac{1}{\sqrt[3]{2}}\right\}$

8.147. a) $x \in \left\{-1, \frac{1}{2}\right\}$ b) $x \in \left\{\frac{-3-\sqrt{7}}{2}, \frac{-3+\sqrt{7}}{2}, 3\right\}$

c) $x \in \{-3, -1, 4\}$; *wskazówka:* $-13x = -x - 12x$

d) $x = -3$; *wskazówka:* $-5x = -9x + 4x$

e) $x \in \left\{-\frac{1}{2}, 1\right\}$ f) $x \in \left\{-1-\sqrt{2}, -1+\sqrt{2}, 2\right\}$

8.148. a) $x \in \{-6, -4, -2\}$ b) $x \in \{1, 3, 5\}$ c) $x \in \left\{-1, \frac{3}{2}, 3\right\}$

d) $x \in \{-1, 2, 3\}$ e) $x \in \{-2, 6\}$ f) $x \in \left\{-\frac{2}{3}, \frac{1}{2}, 5\right\}$; *wskazówka:* Skorzystaj z twierdzenia o całkowitych pierwiastkach wielomianu.

8.149. a) $x \in \{-3, -1, 1, 3\}$ b) $x \in \left\{-\sqrt[3]{4}, 2\right\}$ c) $x = 2$

d) równanie sprzeczne e) $x = -1$ f) $x = \frac{1}{4}$

8.150. a) $x \in \{-5, 0, 5\}$ b) $x \in \left\{-\sqrt{6}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \sqrt{6}\right\}$ c) $x \in \{-1, 3\}$

d) $x = -1$ e) $x \in \left\{\frac{3-3\sqrt{5}}{4}, -1, \frac{3+3\sqrt{5}}{4}\right\}$ f) $x \in \{-5, 1, 4\}$

8.151. a) $x \in \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{5\sqrt{3}}{6}\right\}$ b) $x \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ c) $x \in \{-6, -2, 2\}$

d) $x \in \left\{-3-2\sqrt{3}, -3+2\sqrt{3}, \frac{1}{2}\right\}$ e) $x \in \left\{-1, 1\frac{1}{2}, 3\right\}$ f) $x \in \left\{-2, -1\frac{2}{3}, 2\right\}$

8.152. a) $x \in \left\{-1, -\frac{4}{5}, 1\right\}$ b) $x \in \left\{-2, -1, -\frac{1}{2}\right\}$ c) $x \in \{-4, -1, 0, 1, 4\}$

d) $x \in \left\{-2\frac{1}{3}, -1, 3\right\}$ e) $x \in \{-1, 1\}$ f) $x \in \left\{-2, \sqrt[3]{5}\right\}$

8.153. a) $x \in \left\{-2, 1, 2\frac{1}{2}\right\}$ b) $x \in \left\{\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, 1\right\}$ c) $x \in \{-4, 0, 5\}$

d) $x \in \left\{-1, \frac{1}{4}, 4\right\}$ e) $x \in \left\{1\frac{2}{5}, 2\right\}$ f) $x \in \left\{-1, \frac{1}{3}, 2\frac{1}{2}\right\}$

Zadania prowadzące do równań wielomianowych

8.154. a) $a = -2$ b) $W(x) = (x-1)(x-3)(x-5)$

8.155. a) $a = -1$ lub $a = 1$ b) -2 i -6 – pierwiastki jednokrotne; 0 – pierwiastek dwukrotny

8.156. *wskazówka:* Suma współczynników jest równa 0 wtedy, gdy $a = 3$. Rozwiąż równanie $W(x) = 0$ w przypadku, gdy $a = 3$.

8.157. a) $a = 1$ b) $Q(x) = x^2 + x + 4$

8.158. $a = 1$ lub $a = \sqrt{2}$ lub $a = -\sqrt{2}$

8.159. $(-6$ i $-3)$ lub $(3$ i $6)$

8.160. $-5, -2, -3$

8.161. 28 uczniów

8.162. 241

8.163. 2 cm, 4 cm, 1 cm

8.164. 10 cm, 10 cm, 4 cm

8.165. 5 cm × 5 cm lub 10 cm × 10 cm

8.166. 7 m, 5 m, 4 m

8.167. 4, 6, 8

8.168. 3, 5, 7

Test sprawdzający do rozdziału 8.

Nr zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Odpowiedź	**B**	**D**	**C**	**B**	**D**	**D**	**C**	**C**	**D**	**A**

Nr zadania	11	12	13	14	15
Odpowiedź	**B**	**C**	**A**	**D**	**B**

Zadania powtórzeniowe do rozdziału 8.

16. $F(x) = 6x^2 + 4x - 31$; wielomian $F(x)$ ma dwa pierwiastki.

17. Istnieją: $a = -2,\ b = -1$

18. a) $\frac{4\sqrt[3]{25} + 2\sqrt[3]{5} + 1}{39}$ b) $\frac{\sqrt[3]{2} + 3}{29}$

19. a) $W(x) = (1 - x)(x - 5)(x + 5)(1 + x + x^2)$; pierwiastki: $-5, 1, 5$
b) $x(x - 1)(x - 5)(x + 6)$; pierwiastki: $-6, 0, 1, 5$

20. a) $a = 2$ b) $-4, -1, 2$

21. $a \in \{-2, -1, 1\}$

22. a) $a = 4,\ b = 1$ b) pierwiastki całkowite: $-2, 3$

23. a) $x = 3\frac{1}{2}$ b) $x \in \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$ c) $x \in \left\{-3, \sqrt[3]{2}\right\}$ d) $x \in \left\{\frac{1}{3}, 1, 2\right\}$

24. 425; *wskazówka:* Przedstaw wyrażenie w postaci $(x + 3)(3x^2 - 1)$ i w miejsce x podstaw $2k + 1$, gdzie $k \in \boldsymbol{Z}$.

25. a) $W(x) = (1 - x)(x - 4)(x + 2)$ b) $W(x) = -x^3 + 3x^2 + 6x - 8$

30. *wskazówka:* Zapisz kolejne liczby naturalne w postaci: $4n + 1$, $4n + 2$, $4n + 3$, gdzie $n \in \boldsymbol{N}$. Następnie doprowadź do najprostszej postaci wyrażenie: $(4n + 1)^3 + (4n + 2)^3 + (4n + 3)^3$.

31. *wskazówka:* Zbadaj różnicę $\frac{1 + 4a^8}{4} - a^4$.

32. *wskazówka:* Doprowadź wyrażenie do postaci: $-7a^4 - 6a^2 - 1$.

33. *wskazówka:* Wykaż, że $(x + 3)^3 - (x - 1)^3 = 12x^2 + 24x + 28$; następnie uzasadnij, że najmniejsza wartość funkcji kwadratowej $f(x) = 12x^2 + 24x + 28$ jest równa 16

Wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych

α	$\sin\alpha$	$\operatorname{tg}\alpha$	$\operatorname{ctg}\alpha$	$\cos\alpha$	
1°	0,017	0,017	57,290	1,000	89°
2°	0,035	0,035	28,636	0,999	88°
3°	0,052	0,052	19,081	0,999	87°
4°	0,070	0,070	14,301	0,998	86°
5°	0,087	0,087	11,430	0,996	85°
6°	0,105	0,105	9,514	0,995	84°
7°	0,122	0,123	8,144	0,993	83°
8°	0,139	0,141	7,115	0,990	82°
9°	0,156	0,158	6,314	0,988	81°
10°	0,174	0,176	5,671	0,985	80°
11°	0,191	0,194	5,145	0,982	79°
12°	0,208	0,213	4,705	0,978	78°
13°	0,225	0,231	4,331	0,974	77°
14°	0,242	0,249	4,011	0,970	76°
15°	0,259	0,268	3,732	0,966	75°
16°	0,276	0,287	3,487	0,961	74°
17°	0,292	0,306	3,271	0,956	73°
18°	0,309	0,325	3,078	0,951	72°
19°	0,326	0,344	2,904	0,946	71°
20°	0,342	0,364	2,747	0,940	70°
21°	0,358	0,384	2,605	0,934	69°
22°	0,375	0,404	2,475	0,927	68°
23°	0,391	0,424	2,356	0,921	67°
24°	0,407	0,445	2,246	0,914	66°
25°	0,423	0,466	2,145	0,906	65°
26°	0,438	0,488	2,050	0,899	64°
27°	0,454	0,510	1,963	0,891	63°
28°	0,469	0,532	1,881	0,883	62°
29°	0,485	0,554	1,804	0,875	61°
30°	0,500	0,577	1,732	0,866	60°
31°	0,515	0,601	1,664	0,857	59°
32°	0,530	0,625	1,600	0,848	58°
33°	0,545	0,649	1,540	0,839	57°
34°	0,559	0,675	1,483	0,829	56°
35°	0,574	0,700	1,428	0,819	55°
36°	0,588	0,727	1,376	0,809	54°
37°	0,602	0,754	1,327	0,799	53°
38°	0,616	0,781	1,280	0,788	52°
39°	0,629	0,810	1,235	0,777	51°
40°	0,643	0,839	1,192	0,766	50°
41°	0,656	0,869	1,150	0,755	49°
42°	0,669	0,900	1,111	0,743	48°
43°	0,682	0,933	1,072	0,731	47°
44°	0,695	0,966	1,036	0,719	46°
45°	0,707	1,000	1,000	0,707	45°
	$\cos\alpha$	$\operatorname{ctg}\alpha$	$\operatorname{tg}\alpha$	$\sin\alpha$	α